

31. E. 6.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK
ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

31. E. 6



Xavier Wulfen's
A b h a n d l u n g

vom

kärnthenschen pfauenschweifigen Helmintholith

oder

dem sogenannten

opalisirenden Muschelmarmor.

Der

königlich preussischen Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin

gewidmet.

E r l a n g e n
bey Johann Jakob Palm.
1 7 9 3.



Den allerverächtlichsten Stein von der Welt; einen Stein, der im eigentlichen Verstande kaum den Namen eines Steines verdient, auch nie (bey Mineras sagen wenigstens) unter den Steinen seinen Platz haben wird; kurz, der kein Kalkstein, kein Kalkpat, weder Thon, noch Kies, nicht Erde, nicht Erz, nicht Versteinerung aus Schaalstieren, sondern ein aus vielen zusammen geleimtes Wesen, (rudis indigestaque moles,) eine unformige so genannte Breccia, ich will sagen, ein unordentlich zusammen gekittetes Gemenge ist, aus Thon, Kalkstein, Schwefelkies, dann allerhand natürlichen, aber durch vieljährigen Druck der last des aufliegenden Gebürge meistens schon zertrümmerten Meermuscheln, oder Schaalstieren; ein Gemenge, das vermuthlich zu der Zeit, als noch weder der Karst, noch das ganze krainerische Gebürg, kein isolir, keine bergige Grenzlinie zwischen Kärnthner und Krain, keine villacher Alpe, nicht einmal der bleybergische Erzberg (lauter Kalkberge, und folglich Töchter der Zeit,) da war, durch die Fluten des adriatischen Meeres, da ohngefähr hin, angespühet, und zusammengeschlemmet worden ist, wo nun der St. Oswalds Stollen im innern Bleyberg, in einer Seigerteuse von 45. Lachtern unter dem Rücken des Gebürges, ebenföhlig in dasselbe auf 126. Lachter eingetrieben ist; diesen Stein? Lumachella? oder Muschelmarmor? sage ich, hat doch seit ein paar Jahren her, der bloße blinde Wahn mancher nach leerem Lande strebender Leute, zum Theil auch die Macht des Vorurtheils bey jeder neuen Erscheinung (a), und die nichts je reif überlegende Einbildungskraft, mehr in der Welt berühmt gemacht, als man, bey so aufgeklärten Zeiten, wie die unserigen sind, vermuthen sollte.

Nicht bewundert allein hat denselben bereits ganz Europa; das Wunder unserer Zeiten scheint er geworden zu seyn; sind wir auch wohl Philosophen? Kaum ein nige Heller werth, ist derselbe um viele Dukaten; um etliche hundert Gulden; ja um mehrere tausend Gulden, gekauft und verkauft worden! Tobacksdosen, Weste, Spieltische, und was nicht noch? hat die künstliche Hand des geschickten Steinschnellers Haupt aus denselben in Menge verfertigt. In Ringen gefaßt prangt er an dem Finger des Verehrers der Eitelkeit; und das schöne Geschlecht, gebohren um zu gefallen

(a) In der That, ist die Erscheinung eben nicht so neu in der Mineralogie. Es verräth Unwissenheit, dieß behaupten wollen. Man hätte aus des verstorbenen unsterblichen Ritters Linné, und des großen Wallerius Schriften wissen sollen, daß des Erstern Helmintholithus Androdamas, oder Penna Pavonis viridi-caeruleus; und des Letztern Conchites musculites. lit. c. eine, und eben dieselbe, oder nicht viel von der bleybergischen unterschiedne Erscheinung sey.



gefallen, und allezeit eifertüchtig um den Vorzug jeder Mode, dünkt sich nicht mehr schön genug zu seyn, wenn seine Gold- und Feuerfarben, an desselben Hals, Armen und Fingern nicht wechselweise spielten. Die prächtigsten Achare; die so schön spielenden Labradorsteine; die eben so kostbaren, als vielfarbigen Opale, was sind sie mit unserm elenden Helmintholith verglichen? Können wir sie auch noch achten, nachdem derselbe den Smaragd, den Topas, den Saphir, Rubin, ja alle bekannte Edelsteine, nur vielleicht den Demant allein ausgenommen, übertroffen hat! Wie? und an was? an innerlichem Werthe? an Feine der Theile? an Festigkeit des Zusammenhangs? an Härte und Dauerhaftigkeit? Nein; bloß an Schönheit der Farben, die eben nicht sehr lange bestehen können; dann an Lebhaftigkeit des Glanzes, der zuletzt in freyer Luft gewiß absterben muß! *Tantum est in rebus inane!*

Zu bin indessen gar nicht gesonnen, dieser zusammengeklitterten, und wenn sie anders fein geschliffen ist, in der That recht sehr prächtig mit ihren hohen goldgrünen, und goldrothen Feuerfarben spielenden Muschelbreitsche nur im mindesten von dem Werthe (den sie doch haben kann) etwas zu benehmen; noch viel weniger denen nachtheilig zu seyn, die daraus einigen, vielleicht auch allzugroßen, und daher schon ungerechten Nutzen schöpfen können. Meine Absicht ist ohne Reid, ohne Galle, ohne Bitterkeit; sie ist unschuldig, und geht bloß dahin, dieselbe mit dem Auge eines Naturforschers zu betrachten; was ich an derselben gesehen habe, getreulich zu berichten; was ich versucht, und mit welchem Erfolge, offenhergig und ohne Rücksicht, zu melden; und davon eine so genaue, und umständliche Beschreibung, als nur immer möglich ist, zu geben.

Bis zur Stunde hat sie doch die europäischen Staaten alle gewiß schon durchwandert; und wo sie nur unterwegs immer hingekommen ist, Aufmerksamkeit, Bewunderung, Nachdenken erregt; und, ich weiß selbst nicht zu welchen, Muthmaßungen Gelegenheit gegeben. Nach Herrn Kenbant Siegfrieds Berichte im dritten Bande der berlinischen Schriften naturforschender Freunde S. 415. sind auch wirklich verschiedene Beschreibungen davon bekannt gemacht worden. Doch welcher Urtheil waren zuletzt die im Grunde davon zu fällen, denen bloß einige, wenige, kleine, und noch über dem benderseits abgeschliffene Plättchen von derselben zu Theile geworden sind? die sie gewiß nicht zerlegt haben werden, um den Bruch, die innere Gestalt, den Zusammenhang, die verschiednen Arten der Schaaltheile u. u. zu sehen, und zu untersuchen; wenigstens nicht, um sich dadurch nicht selbst der so hart wieder zu erlangen, den Stücke zu berauben. Wäre es demnach ein Wunder, wenn ihre Beschreibungen (die mir doch selber nicht zu Gesicht gekommen sind) höchst mangelhafte, und wie Herr Siegfried am besagten Orte bezeugt, unzuverlässig ausgefallen wären?

Kann

Kann man auch von Gegenständen mit Grunde schreiben, die man nie, oder gewiß nie ganz, und vollkommen zu sehen bekommen hat? Der an dem angeschliffenen bleybergischen opalsirenden Helmintholith nichts, als einen, oder etliche flammende Streife gesehen hat; hat gewiß viel zu wenig gesehen, um im Stande zu seyn, darüber zu sprechen. Es hilft hier, meines Erachtens, wenig, oder gar nichts, seine Zuthucht zu dem blättrigen Gefüge der mit Feuerfarben spielenden Muscheln zu nehmen. Schon würde ich nie ohne die äußerste Noth zwey Körper aus zwey verschiedenen Naturreichen, verglichen haben. Labradorstein sowohl, als Opal, und Katzenauge ic. gehören ohnstreitig ins Steinreich; so wie die Muscheln und Schnecken unsers Helmintholiths, die noch zu dem, ganz ohnverändert, in ihrem natürlichen unverwetzten Stande, nach so viel Jahrhunderten, im Schooße der Erde sich befinden, zum Thierreiche gehören. Wenn schon Labradorstein, nach Art aller Feldspate, fliegigen Zusammhangs ist, so zweifle ich doch, ob man das vom Opale, und Katzenauge eben auch (die gewiß Kieselsteine sind) mit Wahrheit behaupten könne? Weicher als andere ihres Geschlechtes, zersplittern sie sich bey harten Hammerschlägen; aber nicht, weil sie blättrig und fleisig; nur weil sie weicher sind. Was folgt jedoch daraus, wenn sie es wirklich seyn sollten? Ist nicht ein jeder Kalk — Gyps — Fluß — Eisen — Blei — und Zinnpat, ist nicht der Granat — Schmelz — Basalt — und Zeolith ic. gleichderbing blättrig? Das schupprichte, fleisige, blättrige Gefüge der Körper kann schon zur Brechung der Lichtstrahlen, und folglich zum schielenden Farbenspiel mehr oder weniger beitragen; wir sehen es bey dem Papilio Iris des Ritters Linneé; bey der Lacerta Chamæleon; bey dem Cyprinus auratus; (b) bey verschiedenen Vögeln, als

U 2

Tau

- (b) Da dieser überaus schöne chinesische Fisch so verschiedentlich von verschiednen Gelehrten beschrieben wird, daß man bald glauben sollte, es gebe ihrer mehrere Arten, nämlich *Pinna caudæ trifida*, et *ex ani gemina*; und *Pinna caudæ bifida*, *ani simplice* &c.; so denke ich den Freunden des Thierreichs keinen geringen Gefallen zu erweisen, wenn ich ihnen hier jene Beschreibung davon mittheile, die ich vor 19. Jahren selbst gemacht habe, als der am florentinischen Hofe angestellte Graf Karl von Goës, Ihrer Excellenz seiner Frau Mutter, einer gebornen Gräfinn von Thürlheim, etlich und zwanzig verglichenen Fische hieher geschickt hatte. Sie ist folgende: Magnitudo ea circiter, quæ Cyprini Rutili. L. minoris, paullo tamen gracilior. Longitudine ab ore ad usque caudæ apicem trium fere pollicum parisiensium, nisi pro ætatis diversitate, major aut minor; obsolet aut gracilior sit. Caput respectivo parvum, et basi crassiusculum, nudum, nullisque squamis imbricatum; dorso lateribusque convexiusculum; ore parvo, obtuse acutiusculo. Dentes nulli. Oculi ori, quam basi capitis propiores; pupilla atra; iride jam ex rubro aurea, jam argentea in aliis. Nares utrinque binæ, paulisper oculis altiores; quarum quæ ori proximior, duplo posteriore minor. Carinulæ ex inter et oculos duæ utrinque non nihil exstantes; inferiore serrata. Membrana branchiofega radiis arcuatis tribus. Opercula branchias occultantia duo, integra; superiore subtriangulari-rotundato; inferiore fere semicirculari, aucto lamella, subtus proficiente. Aculus simplex, oblique ex operculi superioris basi descendens; a cuius apice, linea lateralis exort, per obtusum velut arcum, convexitatem abdomini obvertentem, ad

caudam



Lauben; Colibri; Ispida; Apiaster &c. Um jedoch mit Feuer, oder andern schielenden Farben zu spielen, ist es wohl schlechterdings nöthig vom blättrigen, fleisigen, schuppichten Gefüge zu seyn? Das letzte Paar ringförmige Absätze, oder Binden des Hinterleibes ist bey der *Lampyrus Noctiluca*, und *Splendidula*. L. unterhalb nackend, glatt, gleichförmig eben, pergamenten; und doch spielen dieselben mit den lebhaftesten Feuerfarben; wenigstens so lange das Insekt noch bey'm Leben ist! Sage man ja nicht: diese Erscheinung sey ein bloß natürlicher Phosphorus, oder die in die heftigste Bewegung und Gährung gerathenen Säfte des Thierchens selbst, verbreiten die bald von goldbroth, bald wieder von goldgrün flammenden Farben, womit die besagten glattebenen Theile des Unterleibes im Finstern leuchten; so ohngefähr, als bey hellem Tage der ganze obere Leib eines gewissen Schildkröters (c) glänzet, den ich vor etwa fünfzehn

eandem usque procedit, carinellæ instar prominens; nec, ut in aliis *Cyprinis* fieri assolet, ex foveolis impressis constans. Squamæ corporis imbricatæ rotundatæ. Pinnæ Pectorales pone aperturam branchiarum sitæ, ovato-acute, radiis septemdecim, simplicibus, sensim decretescentibus. Pinnæ Ventris et ipsæ acute, in abdominis medio, a pectoralibus remotæ, radiis simplicibus novem, aut potius, si primus, isque brevissimus reliquis connumeretur, decem. Pinna dorsi unica, officulis sive radiis octodecim; quorum primus brevissimus, simplex; secundus duplo longior, et ipse simplex, sed introrsum nodoso-ferratus; tertius et quartus reliquis longiores una cum reliquis compositi sive radiati. Pinna Ani unica, haud procul cauda, radiis septem ad octo, primo brevissimo simplice; secundo duplo longiore, pariter simplice, sed introrsum nodoso-ferrato. Cauda bifida, officulis viginti septem. Corpus prope caudam compressum, cætera convexiusculum. Colorem quod attinet, extra aquam totus partibus omnibus dilute rubet; intra aquam vero ex fundo rubro auri instar resplendet nitidissimus. Dantur, qui supra lineam lateralem ex rubro aurati sunt, at infra eandem ex albo argentei. Quidam toto corpore argentei. Alii totæ argentei, bali duntaxat et ea dorsi parte, quæ Pinnæ cognomini respondet, aurato-rubris. Nonnulli undique ex rubro aurei, cum macula ovali oblonga atra caput inter, et pinnam dorsi; quæ ipsa interdum apice, una cum extimis pinnæ caudalis auriculis atra esse solet. Vidi et inter plurimos unum, supra lineam lateralem ex viridi nigricantem; subtus ex albo subargenteum. Addam denique: Operculorum superius obtuse triangulo-rotundatum plerumque in omnibus argenteum esse, translucente nescio quo rubore aquoso: Pinnae vero in omnibus semper rubras; nisi in varietate tota argentea albas.

- (c) *Cassida Crælea*: *C. aurata*, elytris linea iridiformi. Pontebæ in alpinis. Corpus supra hemisphærico-ovatum. Clypeus capitis, seu thorax potius caput obtegens, lenticularis, integerrimus, transverse oblongus, nudus, glaber, microscopice undique foveolatus, totus aureus, nitens, desinente animalis vita, dilute, et obsolete flavens, Elytra integra, striis nullis, foveolis tamen microscopice longitudinaliter feriat, vita comite ex auro resplendentia meracissimo; singula linea longitudinali media iridiformi nitidissima ex rubro-viridi, sive rubro-cærulea; at postquam vivere desit animal, jam non nisi dilute flavicant elytra; et linea illa in subrubentem emoriens, parum conspicua. Caput subtus atrum; pectus contra cum abdomine, pedibusque, flavum. Antennæ thoracis fere longitudine, flavæ, moniliformi-subclavatæ, monilibus nempe extimis sensim crassioribus, apice ipso nigricantes.

Define Nestoresm, Chremes, producere vitam;

Et, Cræli quamvis, emoriuntur opes.



funfzehn Jahren, indem ich die pontasser Alpen bestieg, auf dem *Lacerpitio Peucedanoides* L. fand, und seiner reichen Farbe wegen, *Cassidam Cræscam* genannt habe. Mein; denn das Spiel der prächtigen Farben rühre zuletzt her, wo es nur immer her wolle, so ist es doch immer wahr, daß ein glattebner, nicht blättriger; um so viel mehr ein runderhabener, oder rundhohler Körper, mit denselben spielen könne. Eben dieselben Feuerfarben habe ich an den harten Flügeldecken der *Chrysomela speciosa*, nobilis, fastuosa L. des *Curculio betulae*, *populi* L. &c. an dem Rückenschilde, und Hinterleibe der *Chrysis ignita* L. &c. wahrgenommen, wo nirgends ein blättrige Gefüge zu bemerken war. Das Gefüge unserer Riesmuschel, und des Schiffboots ist (wo es wenigstens opalsfirt, und mit Feuerfarben spielt) nicht so wohl blättrig und stiefig, als vielmehr, so wie bey allen andern Schaalchieren, schaalig, und häutig, das ist, aus lauter arten über einander liegenden, aber nicht gestrichen, oder schupplichten, sondern glatten, etwas eingebogenen, gleichförmig an einander hangenden Häuten von unfühbaren Theilschen bestehend. Vom eigenen kalkartigen Safte oder Seescheide, hat sich die Seescheide (*Ascidia*) und der seither noch nicht genau beschriebene Welsfuß (d) ihre jährlichen neuen und neuen, gedrängt auf einander liegenden Häute, und mit denselben, je nach sie sich im Wasser selbst verhärtet hatten, ihr ganzes Haus nach und nach fertiget. Viel an der Zahl sind dieser schaaligen Häute bey denselbigen, so wie überhaupt bey allen Schaalchieren, oder Conchylien; und so viel ihrer sind, so fein, so gart, so dünne sind sie (eine jede für sich) alle; zumal die Innersten; die (indem die Aeußersten, wie etwa bey *Mytilus barbatus* L. oder bey *Nautilus Pompilius* L. lichter oder dunkler kastanienbraun, und von innen der Länge nach fein gestrichen sind) gleichsam mit einem seichren, und nur angefogenen Schmelz von Feuerfarben überzogen, und lackirt, gleichförmig an einander hangend sind, von unfühbaren Theilen; nicht stiefig, nicht blättrig, nicht schupplicht ja nicht einmal fadenhaft, oder gestrich.

Doch ich will mich bey bloßen leeren Worten nicht aufhalten; ich will die schaaligen Häute für Blätter gelten lassen. Was schließen wir daraus? Vielleicht, daß der bleybergische Helmintholith seine Feuerfarben dem häutigen, oder blättrigen Gefüge zu danken habe? Nichts weniger. Wir können vielmehr, denke ich, daraus höchstens schließen: daß bloß in einem Falle diese Blätter oder Häute zum schielenden Farbenspiel (oder wie man sonst die Pracht unserer Goldfeuerfarben nennen will) dienen können; nämlich in jenem Falle, in welchem der Durchschnitt die Riesmuschel,

U 3

das

- (d) Oder ist es vielleicht nur ein Bladfisch gewesen? denn ich kann dieß nicht mit aller Gewißheit sagen; und zwar so wenig, als ob das Schiffboot, dessen Bewohner er war, noch irgend in einem Meere der Welt vorhanden? und nicht schon, wie ihrer mehrere, auf ewig verloren gegangen sey?



das Schiffsboot, oder das Ammonshorn unter einem rechten, oder schiefen Winkel durchkreuzte; denn nur dies ist der Fall, in welchem alle Schaalstiere, wenn sie auch sonst von außen sowohl, als von innen, glatt, unmittelbar an einander hangend, und von unspürbaren Theilchen sind, ein schaaliges, häutiges, blättriges Gefüge dem Auge darstellen. Nun eräugt sich bey der kärnthenschen Muschelbretsche gerade das Widerspiel. Wird sie so geschnitten, und abgeschliffen, daß die Richtungslinie des Durchschnitts mit den innern Seitenwänden des Schaalstiers gleichlaufend ist, so erscheinen an der Oberfläche sogleich die herrlichen goldfeurigen roth, oder grünen Flammen; weil die innern, eben so schon gefärbten, unmittelbar an einander hangenden, Häute selbst in größern oder kleinern Flecken zum Vorschein kommen, dort, wo sie weder blättrig, noch fleutig, sondern von unspürbaren Theilchen sind. Ist hingegen der Durchschnitt des Muschelmarmors schief oder senkrecht auf die hauchigen Theile der darinnen stekenden Schaalstiere geführt worden; so haben wir allemal auf der Fläche des Durchschnitts nichts, als lauter längere, oder kürzere, dickere oder dünnere u. Streife gesehen, die mit dem Vergrößerungsglase untersucht, fadenhaft, gestrichelt; kurz, schaalig oder blättrig, aber auch stets weiß, und matt; nie roth — grün — goldfeurigfärbig; noch viel weniger schielend, und glänzend waren. Irrig ist daher die Vermuthung dererjenigen, die das Farbenspiel des Labradorsteins, des Opals, und unsers pfauenschweifigen Helmintholiths von einer und eben derselben Ursache des blättrigen, fleutigen, oder schuppichten Gefüges herleiten.

Ohne Zweifel wird man nun verlangen meine Meinung in Ansehung der so außerordentlich schönen Farben der kärnthenschen Muschelbretsche zu vernehmen. Was soll ich von der Opalsirung der innersten Häute unsers Helmintholiths sagen? opalsiren sie auch wohl in der That? Sie sind, eine jede für sich, gemeinlich beyderseits, das ist, an der innern etwas eingebogenen, und äußern, auch nur so wenig erhabenen Oberfläche (wenigstens gewiß allezeit an der innern untern) entweder ganz goldgrün, oder ganz goldroth, oder endlich, es verliert sich das goldroth sanft ins goldgrün; und stimmen in allen diesen Fällen stets mit sehr lebhaftem Feuerklang. Aber nicht das ist hauptsächlich die wichtige Frage. Mein. Frangten sie (frage sich vielmehr) allezeit, vom ersten Augenblicke ihrer Entstehung, da sie ihr Stammvater, der Geowurm, gezeuget hat, mit eben denselben Farben? oder sind sie anfänglich, wie es sich bey den meisten zwoschaaligen Muscheln zuträgt, nur weiß? oder dunkel weißblau, wie der *Mytilus edulis* L.? oder von Silberfarbe ins grüne und rosenfärbige schielend u. wie das Meerohr, der *Nautilus Pompilius* L. und der *Mytilus margaritifer* L. gewesen? und daß die hohen Goldfeuerfarben bloß in spätern Jahren entstanden, eine Wirkung der Zeit, oder sonst einer andern noch nicht zu ergründenden Kraft in der Natur sind? Und welche ist diese? oder welche kann sie auch wohl seyn?

Waren

Waren dieselben von je her die, die sie noch heut zu Tage sind; so ist es außer allem Zweifel, daß der säße kalkartige Saft des damals noch lebenden Seewurms, oder doch die demselben beigemischten fremden Theile, das Ihrige dazu beigetragen haben. Warum sind aber in diesem Falle nicht alle innern Häute von einer und eben derselben, entweder nur grünen, oder nur rothen Goldfeuerfarbe? Warum sind die Einen bloß goldbroth, indem die Andern bloß goldgrün sind? Warum liegt bald die Goldgrüne über der Goldbrothen? und umgekehrt? Warum sind bisweilen mehrere Goldbrothe hinter einander, bis wieder eine Goldgrüne darauf folgt? und im Gegentheile? Ein goldgrünes Häutchen schiebt bisweilen, (nicht allezeit,) das ist, verliert sich zuletzt ins Goldbrothe; so wie auch ein Goldbrothes bisweilen, nicht allezeit, ins Goldgrüne spielt; (c) warum wieder dieses? Wenn schon der Seewurm, bey Erbauung seines Hauses, dasselbe sehr oft mit verschiedenen Farben auszumalen pflegt, so werden doch jederzeit gleiche Theile gleich gemalt seyn.

Sind hingegen die prächtigen Feuerfarben dieser Häute eines spätern Alters; sind sie erst nach Jahrhunderten in der Erde entstanden? wer ist ihr Vater? wie heißt ihre Mutter? Der ehemalige Bewohner des Schaalstieres? Ich will sagen, der Seewurm? der, der je darinnen gewohnt, gelebt, sich dasselbe selbst aufgebauet hat? und der gewiß mit sammt seinem Hause, verschüttet, und vergraben worden ist, aber nie mehr darinnen gefunden wird; folglich darinnen abgestorben, verweset ist; und durch seine Verwesung, das ist, durch seine vermodernden, und zusammenfließenden Bestandtheile, diese schönen Farben soll zu Wege haben bringen können? Aber der Bürge dieses Sazes, der Gewährsmann so einer Vermuthung — wo ist er? mit welchen Gründen tritt er auf? können wir ihm auf sein Wort, ohne Beweise, Glauben beymessen? Wir wenigstens wandelt keine Lust dazu an. Und warum hat nicht ebenfalls die Verwesung der übrigen Seewürmer so eine Wirkung bey allen übrigen Schaalstieren gehabt, die gleicherbings mit in unserer Muschelbreitsche, und zwar viel häufiger einbrechen?

Oder soll etwa der mit in derselben einbrechende Schwefelkeis die für sich farblosen, oder weiß, oder anders gefärbten, und matten innern Häute feuerfarbig gemalt,

- (c) Ich muß hier einem Betrüge unserer Augen, oder vielmehr einer irrigen Meynung vorbauen, in die wir uns selbst unbedachtsam stürzen, weil wir unsern nicht genug vorgerichteten Sinnen oft mehr zumuthen, als wir ihnen in diesen und jenen Umständen zumuthen sollten. Wahr ist es, daß bisweilen ein dergleichen goldbrothes Häutchen sich nach und nach bis ins goldgrüne verliert: aber bisweilen kommt es uns nur so vor, als wenn sich ein und eben dasselbe Häutchen von der einen in die andere Farbe verliere; in der That aber, wenn man sich des Vergrößerungsglases bediente, würde man deutlich sehen, daß entweder durch den ungleichen Bruch, oder durch das Anschleifen, und die Bildung, statt eines, zwey sehr feine Häutchen über einander liegen, deren eines roth, das andere grün ist, und das eine unter dem andern hervortragt.



gemalt, und mit dem glimmernden Glanze, mit dem sie so lebhaft spielen, überzogen haben? Dann würden sie ja, denke ich, nicht grün; nicht roth: sie würden nur bleich goldfarbig seyn; man würde bey der Flamme des Löthrobes den bläulichen Rauch des Schwefels wahrnehmen; oder den Schwefelgeruch doch verspüren; oder gewiß eine noch so kleine retraktorische Eisenschlacke nach verfliegenem Schwefel erhalten; es würde ja dann der Schwefelfies selbst eine Stufe, wenigstens die erste Stufe, der Verwitterung erlitten haben; und nicht so, wie er darinnen steet, noch ganz frisch, und unverseht geblieben seyn; und was der Erfahrung, und dem Geständnisse des Steinschneiders meistens widerspricht, gerade wo der Schwefelfies am stärksten einbricht, müßten dann die schönsten, die zahlreichsten, die feurigsten Flammen zum Vorschein kommen; nicht, wie es sich wirklich im Bergtheile erdugnet, alles verkalkt, verwittert, und todt seyn: zu geschweigen, daß eben derselbe Eisen, oder Schwefelfies, der die einen Schaalthiere, von denen hier die Rede ist, so herrlich, so königlich, so majestätisch ausgeschmückt haben soll; auch die Uebrigen, mit darinnen in weit größerer Menge befindlichen, aber von einer andern Art, und Gattung, gleicherbings hätte malen, und aufpuzen können, ja auch sollen, so doch schlechterdings nicht geschehen ist.

Es ist dann nichts anders hievon zu sagen übrig, als daß diese so außerordentlich schönen roth, und grünen Goldfarben, sammt dem flammenden Glanze, da sie doch nicht von je her sind, und folglich nicht von dem Urstoffe des natürlichen Saftes des Seewurms selbst hergeleitet werden können, wie jene der Perlmutter, des Meerohrs, der verschiedenen Purpur, und Flügel-schnecken u. d. daß sie, sage ich, eine Geburt späterer Zeiten seyn müssen. Nun haben wir ferner gesehen, daß es gar nicht wahrscheinlich sey, der mit einbrechende, und noch unverseht bestehende Ries, oder die in Verwesung übergegangene Wesenheit des vormaligen Bewohners hätten dazu den Zeug, sammt dem Nisfel, und der Meißerhand hergelehen. Woher wollen wir sie denn nach mit mehrerm Rechte, oder doch mit mehrerm Scheine einiger Wahrscheinlichkeit, füglich herleiten, als bloß (wie es mit wenigstens ungewißelt zu seyn scheint) von den unterirdischen Wässern? oder von der unterirdischen Luft? vielleicht auch von Beyden zugleich? so, daß zuletzt das ganze geheimnißvolle Räthsel derselben mit einem bloßen Anfluge unterirdischer mineralischer Dünste, sehr natürlich entwickelt und ausgelegt werden könne? Wir zerbrechen uns recht sehr oft ganz vergeblich den Kopf, in Erklärung mancher noch so einfacher, noch so natürlicher Erscheinungen. Eine besondere, oder gewiß selbster noch nicht beobachtete Erscheinung, scheint es uns, müsse allezeit aus besondern, und recht verborgenen, recht künstlich zusammengesetzten Ursachen herrühren; an der doch gemeiniglich die Kunst gar keinen, bloß die Natur allen Theil hat; die wir aber verwirren, weil sie uns (damit ich mich so ausdrücke) zu wenig studirt

stübt ist: und mit dem verfehlen wir richtig das Ziel. Die sinnreichsten, und eben so unwahrscheinlichsten, als sie sinnreich sind — oder soll ich vielleicht gar: ungegründeten, sagen? werden den gemeinen natürlichen vorgezogen, und darauf ein windiges System gebauet, und schön ausgeschmückt, das zuletzt zusammenfallen muß, weil es nur in unserer Einbildungskraft, nicht in der Natur gegründet ist.

Dem sey indessen, wie ihm wolle; so ist diese meine Muthmaßung eben nicht so albern, als sie etwa, dem ersten Ansehen nach, scheinen könnte. Sie enthält gar nichts widersprechendes; und so einfältig, als sie ist, so natürlich, so in der Mineralogie wohlgegründet, so von vielen gleichen Beispielen unterstützt, ist sie in der Natur.

Die so ungemein prächtigen, so schön gefärbten, mit allerhand Goldfarben prangenden, und mit dem lebhaftesten Feuerglanze schimmernden, nadelförmig krystallfürten, bald bündelweise zusammen gebundenen, und aus einem Mittelpunkte sternförmig strahlenden, bald wieder den Spat, oder Quarz durchkreuzenden ungarischen Spiegelscherze, woher haben haben sie zuletzt ihre Pracht, als vom bloßen Anflug unterirdischer Luft, oder unterirdischen Wassers entlehnt? Ich besitze derrer die aller schönsten, die man nur sehen kann. Die krystallfürten Nadeln sind ganz gleichförmigderb, fein geschliffen, von unsfühlbaren Theilchen, weder blättrig, noch fleisig! Und so, wie diese, an ihrer äußern Oberfläche gleichförmigderben, feingeläteterten Spiegelsglasnadeln, ohne blättrigen Gefüges zu seyn, bloß durch den Anflug unterirdischer feuchter Luft (denn woher können sie wohl sonst diese Farben geborgt haben?) mit den herrlichsten Feuerfarben prangen; eben so prächtig spielen auch mit eben denselben grünen — rothen — gelben — blauen — hyazinthenen Goldfarben unsere kärnthenschen, so genannten pfauenschweifigen Glasböpfe von Hüttenberg aus der Groß-Urtich; aus dem Augustins Zubau; von der Kelling; von St. Klenhard im Lavantthal. ic. ic. Der dicke, erdhafte, verhärtete gelbe Blutstein (*Ferrum haematites flavus Wallerii*) theils mit mehr oder weniger schuppichtem Glimmer (*Mica squamosa alba Wall.*) und theils mit flockigem silberichten, oder schon staubigem rufeligen Braunstein (*Magnesia floccosa argentata; et pulverulenta fuliginosa: Wall.*) gemischt, pflegt, wo die besagten Gruben flüßig sind, an seiner Oberfläche mit derbem, glashaftem, kuglicht getraufeltem, schwarzem Glaskopf (*Fer. haemat. nigrescens. Wall.*) überzogen zu seyn; der aus lauter zusammengewachsenen größern oder kleinern Halbkugeln besteht, die im Bruche anfänglich gleichförmigderb von unsfühlbaren Theilchen sind, so fort aber, je nachdem sie mehr oder mehr zerfallen, in lauter zimmerrothe flecke, oder braunrothe biegsame, nach einem Mittelpunkte zusammenlaufende Fäden (*Ochra ferri germinans rufa Linnæi*) zuletzt verwittert. Schöneres in der Natur kan man, glaube ich, nichts sehen, als diese kärnthenschen Glasböpfe! Nun sind sie kohlschwarz mit nackter spiegelnder Oberfläche;



fläche; nun kohlschwarz, aber matt zugleich, als wären sie mit einem schwarzen Sammet (der nichts, als ein weicher staubiger schwarzabfärbender Braumsteinocker ist,) überdeckt; bald wieder mit einer sehr zarten, wasserklaren, und allenthalben, wie ein Stern, strahlenden Haut vom helldurchsichtigen Kalkspat (*Spatum pellucidum* L.); oder mit allerhand weißen halbdurchsichtigen Kalkspatkrystallen; mit krystallfürren Quarzbrusen; mit getrauten Chalcedonen von verschiednen Farben *ic.* überintert; oder mit fließigen, körnigen, nadel förmigen oder anders gebildeten metallischen Braumsteinskrystallen angeworfen; oft mit silberichten, oder mausfarbigen magnesiatischen glänzenden Dendriten bemalt; und was endlich hauptsächlich hieher gehört, mit lauter stimmenden hohen Feuerfarben, als goldgelben, goldgrünen, goldrothen, goldblauen, goldspazinthenen *ic.* wechselseitig angeschmachtet. Wem, als den unterirdischen, immerfort darüber wegträufelnden Wässern, der unterirdischen nassen Luft, und den in denselben schwebenden mineralischen Ausdünstungen, haben sie diese Zierde zu danken?

Das nämliche Farbenspiel, den nämlichen Feuerglanz, die nämliche Lebhaftigkeit, und Verschiedenheit der Goldfarben, habe ich oft an den prächtigen krystallinischen Eisenerzen von der Insel Elba (*Ferrum micaceum cristatum diversicolor* Wall. et *Ferrum griseum inordinate crystallinum subretractorium coloratum* Wall.) so denn an jenen, eben so schönen Sächsischen, die bisweilen zu Eisenstock einbrechen; und wieder an denen von Framont im Elsaß; dann an dem braunen Eisenspat (*Ferrum spatiosum* Linnæi) von St. Gertraud, und St. Lienhard im Lavantthale; an dem pfauenschweifigen gelben Kupfererz (*Cuprum flavum Wallerii*) von Schmölnitz in Unterhungarn, und von der Oberfragant in Oberkärnten; auch an den hölzigen Steinkohlen (*Bitumen Lithanthrax ligneus* Wall.) von Oslawan in Mähren; und damit ich die verschiednen ungarischen und kärnthenschen pfauenschweifigen Rieskrystallen und Riesnieren (*Globuli pyriticosi, et Marchasita* Wall.) verschweige, so gar an den in freier Luft lange gewesenen großen Tafelfenstersteinen bemerkt, betrachtet, bewundert! Ich sann oft recht ernstlich und reiflich nach, nach der Ursache einer solchen Erscheinung. An ein blättriges Gefüge war in den meisten dieser Fälle nicht zu denken. Es findet in denselben keines Statt. Ich muß aufrichtig gestehen: keine wahrscheinlichere, aber auch keine natürlichere Ursache fiel mir je ein, als ein wässriger, nasser, wenigstens feuchter Anflug der Luft; davon diese Körper zu einer feuchtern Zeit angepöht, und angehaucht, dann angelassen worden, und der endlich zu einer andern trocknern Zeit sich an denselben fester und fester angeliebet, und so darauf befestiget hat, daß er nicht so leicht mehr von denselben, wenigstens nicht so geschwinde, wieder wegzubringen war. Doch verschwindet er auch endlich wieder, theils durch stärkeres und länger anhaltendes Reiben; theils durch eben dieselben Ursachen, durch die er entstanden ist, ich will sagen, durch die über ihn mehr und mehr wirken.

wirkenden Abwechslungen der Nässe, und der Trockne; es sey nun daß Wasser, oder wäsrichte Luft, zu stark, und ohne Unterlaß auf ihn wirke.

Wende, Luft und Wasser, so wenigstens, wie sie allein über und unter der Erde unseres Planeten sich befinden, sind gewiß nichts weniger als wahrhaft elementarisch; nichts weniger, als aus bloß gleichartigen Bestandtheilen bestehend; nichts weniger, als rein von allen fremden Unlauterkeiten. Mit alkalischen, thonichten, salinischen, harzigen u. auch so gar metallischen Theilchen geschwängert, sind zumal die unterirdischen Wässer überall; die allenthalben durchdringen, und mit Zurücklassung, oder Absezung fremder Theile, tropfenweise abfließen.

Wenn schon Byllus flos aquæ, Linnæi (so bald über der Oberfläche der Wasser schwimmt, bald wieder darinn zu Boden sinkt) zum Pflanzenreiche gehört; so gehören aber nicht dahin, sondern zum Mineralreiche, die seichten, aber zugleich vielfältigen, und wahrhaft pfauenschweifigen Häutchen, mit denen wir die faul oder ruhig stehenden Wässer der Sümpfe und Moräste überdeckt sehen. Vitriol, Eisen, Alaun, Zink, Kupfer, Schwefel, oder aufgelöste Kiese, vielleicht auch verwitternde Arsenik, erzte? haben ohngezweifelt ihren guten Theil daran. Die unsere Gesundheit, und selbst unser Leben, oft in die äußerste Gefahr setzenden brennbaren, arsenikalischen, mercurialischen u. unterirdischen Wetter zeugen gleichfalls zur Genüge, wie rein die Luft sey, die uns allenthalben umringt; und da es unter den Gelehrten ohnehin eine ausgemachte Sache ist, daß so wie in das Meer alle Flüsse sich zuletzt ergießen, eben so in den Luftkreis die Ausdünstungen aller übrigen Körper (das ist ihre kleinsten Theilchen selbst) sich ausleeren, und die Luft folglich nicht mehr Luft, oder doch nicht mehr Luft allein, sondern ein flüßiges, durchsichtiges, elastisches, schweres, mit tausend fremden wäsrichten, salinischen, öligen, erdhaften u. aber so feinen Theilchen gemischtes Wesen sey, daß sie darinnen unsichtlich, und unmerkbar schwimmen können, so habe ich gar nicht nöthig, es demselben, als ein Geheimniß zu entdecken.

Was gesehe ich nun, zumal zu meinem Vorhaben, aus allem dem für eine Folge? Diese: daß so, wie das Wasser durch Absezung und Präzipitirung fremder kältiger, gypsischer, kieselichter, ihm bennemischer Theilchen, allerhand Stalactiten, Sinter, Steinrinden, verhärtete, versteinerte Moose, Pflanzen, Würmer u. und wie diese Dinge sonst heißen mögen, von allerhand Natur, Gestalt, und Farben bildet; eben so die Luft durch Niederschlagung und Fällung bennemischer Körperchen (die dann auf andere Körper hinfallen, sich mit denselben entweder vermischen, oder ohne Vermischung auf denselben durch die Austrocknung sich fest setzen,) eben denselben Körpern, worauf sie angespüßt worden sind, ein dünnes Häutchen, ein neues, und neu gefärbtes,



wiewohl noch so seltsames Kleid, das man den Anflug nennen kann, überziehen könne, und auch in der That überziehe; (f) denn gewiß, die sonst retraktorischen Eisenerze (nicht alle sind es) von der Insel Elba, so bald sie mit opalsirenden, das ist pfauen-schweifigen Farben spielen, werden nimmermehr, wo sie stark gefärbt sind, vom Magnete gezogen; vermuthlich bloß wegen des anflügligen fremden Kleides.

Ich folgere ferner daraus, daß, weil doch schwerlich die innern Häute unserer Schaalthiere von je her, durch den Saft des ehemaligen dieselben bewohnenden Seewurms, schon so gefärbt, erzeugt worden sind, daß, sage ich, ihre prächtigen, und vermeynten Opalfarben, ohnfehlbar bloß so einem Anfluge unterirdischer Luft, oder dem Absage fremder, den unterirdischen, allenthalben durchdringenden Wässern beygemischter Theilchen zuzuschreiben sind.

Wird man mir hier, weil ich dieses behauptete, nicht etwa in die Rede fallen? und fragen: welche sind denn die vorgegebenen angeflügten, oder abgesetzten Theilchen fremder Körper, die unsere kärnthenschen Schaalthiere an ihren innern Häuten so außerordentlich schön gemalt haben? Sind es Urbestandtheile eines Metalles? und welches Metalles? oder salinische? ölige Körperchen? aus dem Thier, Stiel, oder Pflanzenteile ursprünglich entsprossne Körperchen?

Ohne mich deßhalb zu entfärben, gestehe ichs offenhertzig: Ich weiß es in der That selbst nicht. Meine Kenntniß in der Scheidekunst (die meine Laufbahn nie war) hat sehr enge Gränzen, und reicht lange nicht so weit hin. Wäre jedoch dieselbe gleich noch so groß, und ausgebreitet, so weiß ich eben nicht, ob ich auf eine Untersuchung, an der mir übrigens (vielleicht auch dem Publikum?) sehr wenig liegt, viele Mühe und Rüsse verwenden würde? Denen, in derer Fach dergleichen Versuche näher einschlagen, und die bey tiefern Einsichten, als die meinigen sind, sammt den gehörigen Werkzeugen, und nöthigen Unkosten, Zeit dazu genug haben, überlasse ich gerne ein Feld zu betreten, zu dessen Bearbeitung ich desto weniger Lust spüre, weil ich zuletzt nicht genug einsehe, welchen großen Nutzen die Wissenschaften daraus schöpfen können?

Witriol.

(f) Daher, zum Beispiel, sagt man: anflügliger Bleeglanz, der bisweilen durchsichtig ist; anflügliger Kies, anflügliges Kupfererz ic. wenn die durch die Fällung niedergesetzten Körperchen bloß Kupfer, Kies, Bleitheilchen waren. Freylich hatten sie das Aussehen, und die Gestalt des Bleyes, Kiesel ic. nicht, so lange sie im Wasser, in der Luft ic. herumschwammen, und folglich auch nicht, als sie in erdhafter oder ockerartiger Gestalt abgesetzt worden sind. Die Verwitterung und Auflösung mußte sie ihnen benehmen. Aber wer kann uns hindern zu sagen, daß oft die gefällten Metalle durch hinzugekommene Schwefel, oder Arseniktheilchen wieder vererzt worden, und die Gestalt des Bleyes, Kiesel ic. wieder angenommen haben?



Mitriolsäure, die, zumal in den unterirdischen Berggründen, so häufig, und fast hätte ich gesagt, so allenthalben zu Hause ist, kann unmöglich unmittelbar (g) Theil daran haben; weil doch diese goldbrothen und goldgrünen Häute, so bald nur ein Tropfen Scheidewasser darauf kömmt, sogleich aufbrausen. Freilich verliert sich die so schöne, die so lebhaft und glänzende Feuerfarbe durch einen einzelnen darauf gelegten Tropfen des Salpetergestübes nicht; aber genug, sie brausen so, gleich, auch nur mit einem Tropfen desselben schon auf; und wo ich ein solch beider, stets opalsirendes Häutchen ins Scheidewasser selbst geworfen habe, lösete sich dasselbe, unter einem immer anhaltenden Aufbrausen, in sehr kurzer Zeit in demselben ganz auf; Häutchen, sammt Farbe und Glanz, verschwanden; und die Auflösung blieb farbe- los, und ohne allen zu Boden der Auflösung niedergestürzten Satz.

Ich ward begierig zu wissen, ob nicht etwa Arsenik, oder wenigstens Schwefel, brennend wären? besonders weil Schwefelkies so ziemlich häufig mit im Helmintholith einzubrechen pflegt? Ich spielte daher mit der Flamme des Idrophres nun auf goldbrothe, nun wieder auf goldgrüne dergleichen Probstücke. Kaum hatte die Spitze der Flamme dieselben berührt, so waren Glanz, Farbe, Puz und Schönheit weg. Schneeweiß, matt, brüchig, wurden sie sogleich im Feuer, und brannten zu Kalke, so ohngefähr, wie sich dieselben schon unter der Erde, ohne Beihilfe des Feuers, bloß durch die Verwitterung zu verfallen pflegen; nur mit dem Unterschiede, daß die ohne Mitwirkung des Feuers, durch bloße Verwitterung, unter der Erde verfallenen Stücke mit Wasser sich nicht erhitzen; da im Gegentheil jene, die die lange anhaltende Flamme des Idrophres vollkommen zu lebendigem Kalk brennt, mit — und im Wasser sich erhitzen: Vom Schwefel, oder Knoblauchgeruch war indessen schlechterdings nichts zu riechen; so nämlich nichts, als nichts im geringsten von einem blauen oder weißen, in wärendender Zeit der Röstung und Calcinirung aufsteigenden Rauche zu sehen war. Mit Borax auf der Kohle geschmelzet, gaben sie ein Glas von weißer Farbe, das, je nachdem das Verhältniß mehrern oder wenigern zugelegten Boraxes gegen eben dasselbe Theil des Probestücks war, durch, oder undurchsichtig ausfiel.

Dies sind so ohngefähr die wenigen Versuche, die meine Umstände mir erlaubt haben, mit den so schön gefärbten innern Häuten unsers Helmintholiths, um auf derselben Natur und Beschaffenheit einigermaßen schließen zu können, zu machen; und dies die Nachmassungen, oder nur etwa zufällige Gedanken? auf die mich diese wenigen Versuche gebracht haben.

B 3

Ich

- (g) Ich sage: unmittelbar nicht: wiewohl sie mittelbar durch Auflösung verschiedener Metalle, und Halbmatalle, durch Erzeugung brennbarer Luft, durch Verbreitung allerhand mineralischer Dünste ic. vielleicht den größten Theil daran hat.



Ich will sie noch einmal zusammenfassen, und so kurz, als möglich, vortragen. Entweder, sage ich, sind die gefärbten, und aus goldnem Grunde roth, oder grünlänzenden Häute stets so beschaffen gewesen; oder sie sind es nur mit der Zeit geworden. Im ersten Falle ist es unumgänglich nöthig, daß der kalkartige Saft des Seewurms, und die demselben bennegmischten Theile fremder Körper, der Urgrundstoff des Glanzes und der Farben derselben seyn müssen; und dann muß diese Gattung oder Art Schaalthiere, oder der Seewurm wenigstens (wer er auch immer war) gänzlich verlohren gegangen seyn; weil man doch heut zu Tage in keinem Meere der Welt ein Schaalthier mit diesen Goldfarben und mit diesem Feuerglanz mehr antreift, und fischt. Man muß aber auch in diesem Falle klar erweisen können: 1.) Warum die äußern Häute lichte, oder dunkelkastanienbraun sind, da doch die innern grün, oder goldroth sind? 2.) Warum von den gefärbten die Einen bloß goldroth? die Andern bloß goldgrün sind? 3.) Warum bald mehrere goldrothe auf einander folgen, bald weniger? Warum hingegen bald lauter goldgrüne erscheinen? und entweder gar nicht, oder doch sehr selten, mit einigen goldrothen abwechseln? 4.) Warum bisweilen eine goldgrüne Oberfläche zum Theile ins Goldrothe? und auch hinwieder eine goldrothe Oberfläche an einigen Theilen ins Goldgrüne schielt, es sey bey'm Herumdrehen, oder ohne daß der Winkel des Auges geändert wird? und dieß alles, ungeachtet diese Oberflächen weder gestrichet, noch fleißig; weder blättrig, noch schuppicht; sondern gleichförmiggeben, gleichförmigglatt, und von unsühbaren Theilchen sind? 5.) Warum endlich diese Häute, eine jede für sich, so fein sie auch sind, nur auf ihrer obern und untern Oberfläche mit diesen, und so glänzenden Farben prangen? nicht aber in ihrem innern Wesen, das ist bis ins Mark hinein? denn ich mag sie einzeln, oder mehrere zusammen, oder ein ganzes Blatt des Schaalthiers kreuzweise, wie ich will, brechen, oder schneiden, wenn nur der Schnitt, oder Bruch in der Richtung eines schiefen, oder rechten Winkels auf dieselben geschieht, ist der feinstblättrige Streif, als das Merkmal des Schnittes, oder Bruchs, allezeit bloß weiß, und matt, nie gefärbt, und glänzend. Fürwahr es ist nicht zu vermuthen, (oder es muß das Gegentheil erwiesen werden,) daß die natürliche Verkalkung oder Verwitterung von innen beginne, und nach beyden Seiten herauswärts geschehe; sondern vielmehr, daß sie von aussen anfangt, und so stufenweise mehr und mehr hineindringt.

Ich komme auf den andern Fall; auf jenen Fall, sage ich, in welchem wir sehen, daß diese Farben, sammt ihrem Goldglanze, einer spätern Herkunft, eines jüngern Alters, kurz, eine Geburt oder Wirkung späterer Zeiten seyn. Entweder, sage ich denn wieder, müssen wir sie dem absterbenden Thiere selbst; oder den mit darin nen einbrechenden Riesen, oder einem andern Halb, oder ganzen Metalle, einer Gattung Salzes, oder Harzes zuschreiben; oder wir müssen unsere Zuflucht zu den unterirdischen,



schen, allenthalben eindringenden, alles durchkreuzenden, und mit fremden (zwar ohnfehlbar mineralischen, aber nicht als Minern wirkenden, nicht als Minern kenntlichen) Theilschen geschwängerten Wässern, und der unter der Erde allzeit feuchten, und nie reinen Luft nehmen, und auf einen Niederschlag des Wassers, oder Anflug der Luft, oder auf beide zugleich schließen.

Ist der absterbende, und durch sein Absterben zusammenfließende vermodern, de, verwesende Seewurm, zugleich die Farbe selbst, oder der Grundstoff wenigstens der Farbe, womit die besagten, seinen Leichnam umhüllenden, innern Häute bemalt sind? Warum färbet er sie nicht durch und durch? Warum nur durch Sprünge? Warum überhüpfer er das mittlere Mark eines jeden Häutchens? — und läßt dasselbe weiß, ohngefärbt, matt? Indem er die untere und obere Oberfläche mit feurigem Goldroth? und mit noch viel angenehmerem Goldgrün übertünchet?

Der mit darinnen einbrechende Kies, ist nichts weniger, als aufgelöst; noch hat er selbst keine Verwandlung gelitten; derb, oder körnig, wie er darinnen sieckt, ist er noch ganz in seinem natürlichen Stande, und daher nicht geschickt und aufgelegt, die Stelle des Malers zu vertreten. Zwar könnte er allenfalls anflüchtig seyn: aber dann würden die Häute der Schaalthiere nur bleichgoldfärbig; nicht roth, nicht grün, nicht anders gefärbt seyn: zu geschweigen, daß er an seiner Oberfläche selbst nicht selten (wie zumal zu Schemnitz in Ungarn, im Ringingerthal in Schwaben, zu Hüttenberg und Bleiberg in Kärnten,) mit pfauenschweifigen, das ist, mit goldgrünen, goldblauen, goldrothen u. Farben prangend angetrocknet wird; wo schwerlich jemanden wird träumen können, Schwefelkies habe den Schwefelkies mit fremden, dem Schwefelkies nicht eigenthümlichen Farben gemalt.

Ein anderes Halb, oder ganzes Metall, eine Art Salzes, oder Harzes habe ich in Wahrheit nie in unserm Helmintholith erblickt, dem ich besagte Farben, und den hohen Glanz zuzueignen Grund gehabt hätte; und so, wie das Auge nichts davon je wahrgenommen hat, so war durch die wenigen von mir gemachten Versuche auf derer seines mit einiger Wahrscheinlichkeit zu schließen.

Habe ich daher Recht, oder nicht, (andere sollen urtheilen, und sprechen,) wenn ich unter allen vorzuschützenden Ursachen gemelddes glänzenden Farbenpiels, mich vorzüglich für einen bloßen Abfluß unterirdischer Wässer, oder Anflug unterirdischer Luft erkläre? So wohl das Wasser, als feuchte Luft, sind vernögend, den Körpern, an die sie angepöht werden, einen Glanz, eine Glätte, oder Politur mitzutheilen; zumal wenn dieselben schon für sich dazu geschickt sind, und so, wie die Mies-

muschel,



muschel, und das Schiffsboot, eine Perlmutter-Anlage haben. Die denselben Beyden bengewischten fremden mineralischen, und nicht so leicht zu erkennenden Theilchen, (sie mögen metallischer, salinischer, phlogistischer u. Natur seyn,) können sie färben. Durch die zu einer andern Zeit erfolgende Trockne, können die abgesetzten, oder angezogenen Theilchen an den Körpern mehr und mehr befestiget werden. Diese Ruchmahlung enthält nichts widersprechendes. Sie stimmt mit den wenigen gemachten Versuchen überein. Sie wird durch die Beyspiele aller anderer pfauenschweifiger, mineralischer Körper unterstützt. Es ist dabey leicht darzutun, wie bloß die obern und untern Oberflächen der innern schaaligen Häute, nicht das mittlere Mark selbst, habe gefärbet werden können. Leicht überdem zu erweisen, wie die Farben, sammt dem Glanze, von keiner zu sehr langen, vielweniger ewigen Dauer seyn; und bey welchen Umständen sie sich endlich wieder verlieren müssen u. Dem das, was manche sich einbilden, und vorgeben, daß bey dem Anschleifen, über den opalisirenden Flammen eine sehr feine gläserne, oder glashafte Steinhaut zurückgelassen werde, die den Glanz, sammt den herrlichen Farben für der Verwitterung, für dem Abschleifen und Absterben genugsam bewahren, ist gewiß ein so eben vergeblich, als willkürlich behaupteter Satz, und der Wahrheit selbst keines Weges gemäß. Das Vergrößerungsglas, womit man die gemeldeten Flammen ansieht, entdeckt unwidersprechlich den Betrug. Und in der That, woraus sollte zuletzt diese glasige Steinhaut bestehen? aus dem mit einbrechenden Thone? oder aus dem Kalkstein, in welchem unsere Schaalthiere einbrechen? und zwar Beyden von schwarzer, oder schwarzblauer Farbe? Schwerlich, denke ich, wird es die Kunst des Steinschleifers so weit bringen, daß er mit seinen Werkzeugen den Kalkstein, noch weniger den Thon, so unendlich fein und dünne abschleifen wird, bis sie den Grad der Durchsichtigkeit erlangen sollten. Ich will indessen auch dieses zugeben; sowohl der Elne als der Andere, zumal in der vorgegebenen und frengbig zugestandenen Dünne, sind viel zu weich, als daß sie sehr lange den steten Abwechslungen der Luft, vielmehr noch dem alles zernagenden grausamen Zahne der Zeit, sollten Troß bieten können.

Allein genug von Glanz, Farben und Kinderspiel; als Naturforscher haben wir bey unserer Muscheltresche noch mehr andere, viel wichtigere Gegenstände vor uns; Gegenstände, die unserer Betrachtung, vielleicht auch unserer Verwunderung, viel angemessener, viel würdiger sind. Was ist sie eigentlich? Wie ist sie entstanden? Aus was besteht sie? Wo bricht sie ein? Welche ist überhaupt die Art und Weschaffenheit des Gebürges, in dessen Eingeweide sie Jahrhunderte still, und vor der Wißbegierde des Philosophen verborgen, umverteht gelegen hat? Aus dessen Schooße sie endlich nicht Menschenverstand herausgezogen, sondern Eisen und Schlegel des aus Hungers,

Hungerdnoth sein leben wagenden Bergknappens erschrotter, und herausgeschlagen hat, um den Gelehrten ein neues Licht anzuzünden. Noch mehr; sind ihre Schaalschtiere alle einzeln? oder von verschiedner Natur, Gattung und Art? Wie heißen sie? Welche ist ihre wahre systematische Beschreibung? u. Diese, und dergleichen sind die Fragen, an deren Erörterung und Beantwortung dem Flattergeist nichts, aber naturforschenden Freunden mehr, als an dem ganzen so genannten opalisirenden Olyen gelegen ist.

Allezeit lese ich mit vielem Vergnügen die verschiednen Meinungen der Gelehrten von Entstehung der Erde. Aber nie hat mir dennoch seither nur der Kizel anwandeln wollen, mich an dieß so außerordentlich klippichte Unternehmen zu wagen. Welche Schöpfergedanken! welche witzige, erhabene, und schier hätte ich gesagt, kühne Muthmassungen! und auf kühne Muthmassungen noch viel kühnere, aufgerichtete Systeme! Ich erstaune über die glücklichen Einfälle! ich bewundere die künstlichen Weltgebäude! Ich verehere die sinnreichen Erfinder derselben! und mit ihnen bedes ihre so wahrscheinlichen Sätze, und ihre so natürlich aus denselben hergeleiteten Folgerungen! und voll der Erstaunung; voll der Verwunderung, auch durchdrungen von Hochschätzung gegen dieselben, denke ich lächelnd bey mir ingehelm: sind es auch nichts als Träume, (denn wer hat doch von Allen, hinter den Vorhang der allwissenden Vorsicht und allmächtigen Weisheit gesehen?) so sind es doch wenigstens lauter sehr wahrscheinliche, sehr gelehrte Träume. Kaum stand er da unser Planet, durch das allmächtige Wort des Schöpfers aus seinem Nichts herausgerufen; kaum hatten sich von den untern die obern Wässer getheilet, das Trockne mit Meeren umgeben, und mit tausend Flüssen durchschnitten, kaum aus seinem Chaos entwickelt: so fand er sich schon wieder durch eine allgemeine Ueberschwemmung der so genannten Sündfluth, durch unterirdische Feuer, durch gewaltige Erdererschütterungen, durch Schrecken, Verwüstung und Tod verbreitende Vulkane, aus seinen Pfosten gerückt, zerstört, in Unordnung, sich nicht mehr gleich, ein neues Chaos!

Neu mußte der Erdball, wo nicht geschaffen, doch eingerichtet werden. Die Zerstörungsmittel mußten eben die Mittel der neuen Einrichtung seyn. Es geschah! Durch das Feuer schuf ihn der wieder, dem Vulkane, und seiner Vulkane Wirkungen bekannt waren. Der hingegen, der, vom Wasser allenthalten umgeben, Vulkane nie gesehen, kaum ihre fürchterlichen Namen gehört hat, was konnte er anders denken, von was träumen, was behaupten, als daß das Wasser der neue Baumeister einer neuen Erdbugel gewesen sey? die er theils durch Entblößung vieler unter dem Meere seither verborgener Strecken, theils durch Einstürzung gewaltiger, über dem übrigen Erdboden aufgerhürmter Steinmassen; durch neue und tief ausge-



waschene Thäler, durch zusammengeschlemmte, und, weit von ihrem Geburtsorte, über andere Erderhöbungen aufgesetzte Berge so eben gebildet hat, wie wir sie etwa heut zu Tage sehen.

Aber Gelehrte mit Gelehrten in Vergleichung ziehen, ist nicht meine Sache; auch nicht mein Wille, der ich sie alle so liebe, als ich sie verehere. Ihre Meinungen gegen die Meinungen Anderer, ihrer Gleichen, zu prüfen; ihre Grundsätze mit den Grundsätzen der Uebrigen abzuwägen; und kurz, einen Schiedsrichter in einer so wichtigen Sache abzugeben, überlasse ich denen, die mehr Wissenschaft, mehr Belesenheit, mehr Erfahrungheit, denn ich, besitzen. Wenn ich schon vom Zusammenflusse des Saavestroms mit der Donau, (meinem Vaterlande,) bis zur Nordsee bey Haarlem und Haag, auf viele hundert Meilen, Europa durchreiset bin; wenn ich auch schon nicht bloß von der Poststraße mit flüchtig darüber wegellendem Auge, allerhand Haupt- und Stützgebürge gesehen, sondern jenes mancher einzelner Länder, wo nicht allenthalben ganz, doch großen Theils, und zwar mit naturforschenden Absichten, mit dem Auge eines Philosophen, mit so auch ein bißchen Kenntniß in den drey Reichen in der Natur, ausgegangen bin; so ist das Alles, in meinen Gedanken, noch viel zu wenig, um berechtigt, um nur im Stande zu seyn, auf den ehemaligen Stand, die ehemalige Beschaffenheit und Lage unsers Erdballs zu schließen.

Was ist Europa in Bezug auf die drey übrigen seither bekannten Welttheile? Was die wenigen Länder Europas, die ich durchwandert, gegen die übrigen alle, die ich nicht durchwandert habe? Aus einigen hier und da gesehenen, auch wohl durchschlossenen unterirdischen Höhlen; aus einigen, oder auch mehreren, doch nur eines, oder etlicher Länder, bestiegenen höchsten Bergen, und auf denselben gemachten Beobachtungen, auf Alle der übrigen Welt folgern; von der Beschaffenheit aller übrigen, und der der ganzen Erdkugel, urtheilen; kann das erlaubt seyn? dürfte ichs thun, wenn ichs gleich nicht ohne Beispiel thäte? Wie selten halten allgemeine Sätze Stich! Sollte man sie nicht mit aller nur möglichen Vorsamkeit vorbringen? Mit lauter geräuschigen, tiefen, trichterförmigen Kesseln ist der berühmte Rarsch gleichsam besetzt; der eben so berühmte Birnbaumerwald, obgleich allenthalben mit sehr dichten Waldungen bewachsen, ist gleicherdings nicht viel anders beschaffen; Ihre Kessel sind denen der vormals feuerspeyenden Berge, und nun ausgebrannten Vulkane ganz ähnlich; folglich sind sie eben so viele erloschne Vulkane! Hier ruhet der Schiefer (wohl nicht Linné's, oder Wallerius Schiefer) auf dem Granit, und auf dem Schiefer der Kalkstein; und dieß ist kein Stütz — es ist ein hohes, ein Haupt, ein ursprüngliches Gebürge; diese Bewandniß hat es dann aller Orten mit dem ältesten Gebürge! Auf diese Vermunftlehre verstehe ich mich in der That zu wenig. Jünger
ist

ist zwar unfäugbar das Kalk. als das höhere, so genannte Hauptgranitgebürg; selten wird auch (doch geschieht's bisweilen .h.) Granit, Gestein, mit Speckstein vermischter Quarz, das ist wallerischer Mühlstein u. auf dem Kalkstein aufliegen. Aber das allezeit, das gemeinlich, oder nur öfters, der Hut des ältesten, höchsten, ursprünglichen Hauptgebürge Kalkstein seyn sollte; das ist gewiß nicht wahr. Haller, dessen Verdienste um die Wissenschaften, wenn er schon, leider! nicht mehr ist, unvergesslich sind, hat auf dem allerhöchsten schweizerischen Hauptgebürge Ortisel u. nicht Kalkstein, er hat zusammengesetzte Felssteine aus Quarz, Glimmer und Thone, das ist Gneiss, und folglich *Saxum molare*, *Saxum fornacum* Wallerii gefunden. Auf dem Gipfel der Stang Alpe (der Grenze zwischen Salzburg, Kärnten, und der Steyermark) bey der eingeübten und abergläubischen so genannten Fregmannsgrube, habe ich selbst nichts, als *Saxum aethereum*. L. *Saxum Novaculare* L. das ist, Cotem *saxosam rubram* Wallerii, *Saxum cotiarium*. L. und zwar mit Einbrüchen von Fahrenkraut, *Pteris aquilina* L. &c. angetroffen. Ingleichen auf dem harten Algel, über dem Pustromersee, zwischen dem so genannten Donnerschlag, und der Hofsgeralpe, weit über die böse Nase hinaus, im Spitalerischen, nichts als ungeheuer große, unordentlich über einander, zugleich lose liegende, und den Tod stets drohende Massen von Trapp (*Corneus Trapezum* Wall.) Gestein (*Saxum fornacum* Wall.) gesehen. Nicht minder über St. Lorenzen in der Neichenau, grünlichten Trapp; mit silberlichem oder grauem Glimmer gemischten Quarz, lindens *Saxum fornacum*, et *Carpergense*, mit bläulichem, oder grünlichem specksteinartigen schieflichen oder körnigen Glimmer gemischten Quarz, Linnæi *Saxum tritorium*. L. seu *Molare*. Wallerii. So auch auf der Traasitz und auf dem Rothwiesland; auf der Oberfragant, und auf dem Waschgang, auf der Wirtz in der Firschnitz, auf der Schleinitzer Alpe bey Kitz, auf dem Nassfelder — Mauriser — Heiligenbluter Tauern; dann in Großkirchheim, und hauptsächlich auf der Basterzen, und auf der äußersten Schneide des Felsberggrabens zwischen dem Hochhorn und Sonnenblick, weit über das kärnthensche Kds, oder Gletscher (sind wahre Eisberge, wo gefrorenes

E 2

Schnee

- (h) Wie zum Beispiel ohnweit Klagenfurt bey Pizelsitten, weißer schimmernder Kalkstein (*Marmor rude*. L. seu *Calcareus micans albus*. Wall.) bläulichgrauen wallerischen Mühlstein zum Dache hat, welchen Kalkstein noch überdem gleichlaufende Lagen von ebendenselben grauen specksteinartigen Glimmer (*Mica talcosa*. L.) wechselweise durchsetzen, die bald fingerdick, bald nur von der Dicke eines Menschenrückens sind. Eben so ist der Tagstein des hülsenbergischen Erzberges, der unter dem Nasen seinen ganzen Rücken deckt, und allenthalben aus demselben hervorsteht, theils eine Art groben Granits, theils *Saxum fornacum*, et *Saxum molare* Wallerii, dann auch *Saxum alpinum* Lin. das ist, mit specksteinartigem grauem Glimmer, und rothen Granaten, gemischer weißer Quarz, u. wo doch alle Saalbänder der Eisenerze, sammt derselben hangendem und liegendem bald ein weißer, oder bläulicher spärlicher Kalkstein (*Marmor micans*. Lin.) bald ein gelblich weißer schimmernder (*M. rude*. L.) mit schuppichem Glimmer gemischter, und mit schwarzen magnetischen Dendriten bemalter Kalkstein ist. u.



Schnee ewig verbleibt) der Goldzeche hinaus, was? nichts als sparrbucke, riesenmäßige, los über einander liegende Platten von Granit, Gneissstein, und mit Glimmer, Quarz und Schörl gemischte schwarze oder grünliche Hornblende (*Saxum grandævum* L.) gefunden, wo nirgends in der ganzen Kette des höchsten ursprünglichen Granitgebürge von einem aufliegenden oder aufgesetzten Kalkstein etwas zu sehen, oder zu hören ist.

Wenn aber (wird jemand einwenden) andere Dryctographen bey den ältesten ursprünglichen Hauptgebürgen den Kalkstein nie unter dem Schiefer, vielmehr denselben so allezeit auf diesem aufgesetzt, wie dieser stets auf dem Granite sitzt, wahrgenommen haben? Wenn sie ein gleiches von verschiednen andern Ländern, ein gleiches von derer Gebürgen, ein gleiches von der Beschaffenheit desselben berichten? Sey es; ich baue die Welt nicht mit; ich widerspreche keinem, und zanke auch mit keinem über das, was er, nicht ich gesehen habe; ich sage bloß, was mir auf meinem, über wahrhaft ursprüngliche Hauptgebürge gemachten Wege, begegnet ist; weit und breit ist da oft nichts zu wissen von einem Kalkstein; ausser sehr zufälliger Weise, und sparsam; viel weniger, daß er stets auf dem vermeynten Schiefer, in der That aber auf dem schieferartigen Gneissstein, Muckstein u. aufliege, oder gar die Gipfel des Hauptgranitgebürges ausmachen sollte.

Wie aber, wende ich auch meinerseits ein, wie? wenn die verschiednen Dryctographen oft nur dem Scheine nach ein gleiches von dem Hauptgebürge anderer Länder berichten? Wie? wenn sie oft nur dem Ausdrucke, und buchstäblichen Worte nach, von einer und eben derselben Stein- oder Gebürgsart, in der Sache aber selbst, von ganz verschiednen redeten? Freulich beziehen sie sich wechselseitig einer auf den andern in ihren Schriften; und man sollte glauben, ja sie glauben wohl selbst, daß sie in Bestimmung ihrer Stein- und Felsarten, weil sie sich alle, eines und eben desselben, nichts weniger als systematischen, gemeinlich nur allgemeinen, oder gewiß überhaupt einen allgemeinen Begriff einschließenden, auch nur in einem oder dem andern Lande üblichen und bekannten, von den Vätern der Mineralogie nie gebrauchten Namens bedienen, daß sie, sage ich, von einer und eben derselben Wacke, Sielmart oder Breitsche u. reden, da sie doch in der That selbst von ganz unterschiednen reden. Woher zuletzt dieses Wirrwarr, das allezeit traurige Folgen nach sich ziehen muß, als weil man sich bey den Vätern der Mineralogie, oder doch an ihre Sprache nicht hält, und nicht halten will; willkürliche, allerhand Bedeutungen; allgemeine Begriffe einschließende Wörter bey Anzeigung sonderheitlicher und individueller Gebürgsarten gebraucht; und unter neuen, nicht allenthalben bekannten, bey den classischen Mineralogen nicht einmal zu errathenden Benennungen, Sielarten vorträgt, die

die ihnen nichts weniger, als unbekannt waren, ja von denselben schon längstens ihre gewissen bestimmten Namen erhalten haben?

Aber ist denn kein Prophet mehr in Israel? Kein Linné? Kein Wallerius? kein Cronstedt unter den Mineralogen? — Wenn ich sagte: daß ich auf den hohen kärnthenschen Alpen große, gelbe, am Wirbel bündelweise beisammensitzende, hingegen in den niedern Wäldern, ebenfalls große, aber blaue Glockenblumen, mit jederzeit entgegengesetzten und aufrechtstehenden Blüthen gefunden habe, würde sich wohl ein Botaniker einbilden, daß ich endlich mit der lange vergessenen, und bereits verkommenen *Gentiana major lutca, floribus punctis carentibus, campanulae forma* des Bauhins und Burfers, und mit der *Gentiana asclepiadea* Linn. auf einen Wege zusammen gekommen sey? Würde nicht vielmehr ein jeder geglaubt haben, daß ich von Campanulis Meldung gethan habe? — Wie oft hat man Geisbergerstein angeführt, der nichts weniger als Geisbergerstein war? wie oft eines Sandsteines (*Cos*) erwähnt, der im Grunde nur ein feinkörniger Kalkstein war? wie oft spät mit Scheldewasser aufbrausenden Kalkstein, für Onyx, Basalt für Asbest, Hornblende für schuppichten Schörl gehalten? Was ist das Gneissum? was der Greiß der heutigen Mineralogen? was des gelehrten Herrn Hofraths von Born *Saxum metalliferum*? Soll Linné, soll Wallerius, soll Cronstedt das Erstere nicht beschrieben, nicht gekannt haben? Soll das letzte mit jenem des Linné, gleichen Namens, ein und eben dasselbe seyn? Wie wäre es, wenn Gneiß, Greiß, Borns *Saxum metalliferum* &c. diesen Meistern der Kunst schon lange bekannt gewesen wäre? Wie? wenn sie bey Linné das *Saxum Tritorium*; bey Wallerius das *saxum molare*; bey Cronstedt der aus verwickelten Theilen bestehende Gestein wären? Vielleicht — ist der in heutigen Schriften so sters, so allenthalben angeführte Schiefer nichts weniger, als Schiefer? vielleicht — hat er vom wahren Schiefer nichts, als bloß das schieferichte, blättrigte Gefüge? Was hilft es, die Welt bauen, oder doch ihren Bau auszukleiden? und für gewiß behaupten, wie er allenthalben; auch da, wo ihn kein Auge je erblicken und auspähen können, ich sage tief unter der Oberfläche auf viele Lachter, beschaffen sey? aus was für Steinarten er bestehe? wenn wir nicht, oder nur rathselweise, nur so und so, theils muthmaßend, theils zweifelnd angeben können, welche seine Materialien seyn? und hierinnen kaum, oder gar nicht einzig sind?

Oft, recht oft habe ich gewünscht, daß manche nicht geschrieben hätten, oder nicht eher, als sie sich mit der Sprache unserer großen Vorfahren in der Mineralogie bekannt gemacht hätten! Es kann uns, die wir später als sie geboren, und folglich auch später auf die Bahn der Wissenschaften gekommen sind, auf der sie



mit Riesenschritten gewandert und sich grau und todt gearbeitet haben, nicht zur Schande seyn, wenn wir, was sie mit vieler Mühe, Geschicklichkeit und bestem Erfolge bestimmt, ausgearbeitet, und in Richtigkeit gebracht haben, so von ihnen annehmen und beibehalten, wie sie es uns zurückgelassen haben; und nimmermehr will, kühnlich ändern, was unverändert bleiben soll; nimmermehr gewisse bereits bestimmte, und im Besiz des Bürgerrechtes ihrer Bedeutung bestehende Benennungen mit andern neuen, oder gewiß nur in einem Lande gebräuchlichen, bey einer Nation verständlich, verwechseln; auch nicht im Gegentheile die, so zur Anzeigung gewisser sonder, heistlicher einzelner Gegenstände aufgenommen worden, zugleich zur Anzeigung ganz anderer, von den erstern unterschiedener Gegenstände unverändert mißbrauchen, wenn wir doch anders nicht Alles wieder in die vorige Verwirrung zurückwerfen, selbst uns verständlich werden, und unsern Nachkommen vergebliche Mühe verursachen wollen. Das Feld der Wissenschaften ist allemal noch weit und breit genug, es liegt noch ein großer Theil desselben brach und unurbar, wir können uns noch Ehre genug (nur nicht auf Unkosten derer, denen wir Erkennlichkeit schuldig sind, nur nicht mit Nachtheil derer, von denen wir welche erwarten können,) machen.

Nach dieser zwar eben nicht sehr kurzen, aber auch nicht gar unnützen, nicht aus Eitelkeit, nicht bloß um zu widersprechen, oder zu schmähen, kurz, in keiner bösen, vielmehr in bester Absicht, damit wir einander leichter verstehen, fester alle zusammen halten, einmütig zusammen arbeiten, um die Geschichte der Natur zu erleichtern und zu erweitern, niedergeschriebenen Ausschweifung, kehre ich wieder zu meinem Vorhaben, das ist, zu unserer Muschelbretsche zurück.

Unbekümmert wie unsere Erdkugel vor ihrer Verwüstung beschaffen gewesen sey, (1) auch gar nicht glerig zu erzehlen, wann, wie, wodurch sie die neue Gestalt erhalten,

- (1) Damit Niemand an meinen Ausdrücken sich etwa stoße, und, was mir gar nicht lieb wäre, Folgerungen daraus ziehen möge, von denen mir nicht träumen könnte; sehe ich mich wider Willen gezwungen zu erinnern, daß man von mir ja nimmermehr eine Einrichtung und vollständige Beschreibung unserer Erdkugel, ihrer verschiednen Gebürge, und der in denselben auf einander stehenden Steinarten erwarte. Ich gestehe es aufrichtig, was ich hievon weiß, ist der mindeste Theil dessen, was ich davon noch nicht weiß; doch allemal zu wissen, wenigstens durch die ruhmwürdigen Bemühungen so vieler anderer Gelehrten, recht sehrlich verlangt habe. Ich verehere sie Alle: weil sie in der That zur Aufklärung und Fortpflanzung der Wissenschaften viel, recht sehr viel beigetragen haben. Meine Wissbegierde haben sie indessen gar nicht befriediget; und ich werde aus ihren sonst noch so schätzbaren Schriften den gehofften Nutzen nicht schöpfen, es sey denn, daß sie in Benennung ihrer Stein- und Gelsarten bestimmter reden. So, wie ich keine andere Geschlechtsnamen (ein Gleiches gilt von den Namen der Arten und Abänderungen) je gebrauchen werde, als die durch einen

Linne

halten, in der wir sie erblicken, oder wie die verschiedenen Stein- und Felsadern allenthalben auf ihrer Oberfläche sich nach und nach gelagert, auf einander folgen? auffigen?

Pinné, Wallerius und Eronstedt bereits festgesetzt worden, und dadurch in der Mineralogie das Bürgerrecht erhalten haben, damit wenn mir je ein Anderer auf der Spur nachgehen sollte, er dieselben an Ort und Stelle finden, oder gewiß mich Lügen und Unverständes strafen könne: eben so wünschte ich, daß man sich durchaus in dergleichen Schriften bloß solcher Benennungen bedienen möchte, die in und nach der Sprache der angezogenen Autoren abgefaßt wären; folglich keiner bloß willkürlichen, keiner von einem jeden nach Belieben erfundenen, keiner entweder als zu allgemeinen, oder mehrere Begriffe einschließenden, endlich keiner nur in gewissen Ländern üblichen, anderorts oder nicht verständlichen, am allerwenigsten aber die bereits eingeführten, und von jedermann angenommenen Namen sonderheitlicher Steinarten, zur Angabe anderer Steinarten, die von den Erstern unterschieden sind, mißbrauche. Es ist leicht zu begreifen, welche Verwirrung der Begriffe hieraus, zumal den Anfängern entstehen müßte. Ich muß jedoch erinnern: daß ich unmöglich einsehe, wie man bei heutigen aufgeklärten Zeiten noch darauf beharren könne, daß die Kalkgebirge (so hoch ihrer manche einzelne auch sind, und so gewiß auch ihrer mehrere bisweilen kettenweise zusammenhängen) das wahre Ur- oder Hauptgebirge der Erde ausmachen? Zwar ist meine auf Reisen durch Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark, Krain, Istrien u. c. erlangte Erfahrungheit von keiner Wichtigkeit in Bezug auf die physische Berg- und Erdbeschreibung unsers Planeten: so gering sie indessen auch ist, so habe ich doch durch dieselbe auch schon in diesen wenigen Ländern dreierley Gebirge hauptsächlich unterscheiden können; wovon das höchste, als das älteste, nicht so wohl ein großer Klumpen über einander aufgesteuerter Steinlagen, als vielmehr ein ungeheurer, riesenmäßiger Haufen über einander aufgethürmter, und in langer Kette fortziehender Berge ist: die meistentheils nichts, als zusammengefestete Felssteinarten in sich begreift; von Kalksteinen hingegen nichts, oder sehr wenig; und dieses zufälliger Weise. Es sind nämlich die kettenweise zusammenhängenden Berge des Hauptgebürgs, nicht alle von gleicher Höhe. Die, wo dasselbe sich gleichsam zu verflachen scheint, ungeachtet es in seiner Fortsetzung wieder aufsteigt, diese, sage ich, sind oft niedriger, als manche einzelne Kalkberge des Mittelgebürgs, (so sind in Krain der Zerglau, im Görzerischen der Rannhard, in Kärnthen die Pezen, der Owir, der Mittagskogel, die Willacher Alpe, die Paludnig, der Trügl, die Kubegger, und Tröplacher Alpe viel höher, als der Nibelberg bey Oberdraburg; viel höher als die Wölch, als der Loben im Lavantthale u. c. Aber was sind sie gegen einen Klotzner? gegen das Kaiser-Gebürg? gegen die verschiedenen Tauern? u. c.) und in denselben ist es allerdings wahr, daß die zusammengefestigten Felssteinarten den Kalkstein unterteufen, oder auch im Gegentheil, daß sehr starke und mächtige Keile des Kalksteins ins Hauptgebirge eindringen, und die zusammengefestigten Felssteinarten, wenigstens zum Theile, unterteufen: welches letztere man in Kärnthen bey Klagenfurt, zu Hüttenberg, zu St. Gertraud, und St. Vinhard u. c. klar sehen kann. Das Mittel- und folglich jüngere Gebirg besteht meistens vom Gipfel an bis zur Wurzel herab, aus Kalkstein, mit, oder ohne verfeinerte Schaalsteine; daß indessen derselbe ein anderes Gestein, auch wo man es nicht so leicht wahrnimmt, unterteufen müsse, scheint klar zu seyn: weil man doch in den tiefsten Gräben desselben, und den Rinnfalten seiner Bäche, allemal Trümmer von Felssteinarten, als Porphyre, Ophten (Wall.) Trapp, Granite, Gesteine u. c. (so ruht insonderheit der heilige Lushariberg zwischen Kainwasserthal im Naab, und Safuz nächst Lavis, auf rothem, mit weißem Feldspat eingesprengten Porphyr u. c.) in Menge findet; die die reizenden, vom starken Regengüssen, oder im Frühjahr vom geschmol-



auffizen? und auffizen müssen? (Denn das, gestehe ich schon im voraus, ist kein Wert meiner Kräfte; und einer gelehrten Welt Fabeln, oder Einbildungen für ächte Waare verkaufen, wäre wider alle Rechtsschaffenheit, und um so sträflicher, weil ich selber, auf meinem Wege, durch eigene Erfahrung, überhaupt nichts, als beständige Unbeständigkeit, richtige Unrichtigkeit, und eine unveränderliche Veränderlichkeit, folglich auch eine gewisse Ungewißheit gefunden und gesehen habe.) Mit einem Worte: weit entfernt, mich hierinnen selbst zum Erfinder eines neuen Weltsystems aufzuwerfen, und daher auch frey von aller zu gebender Verantwortung, nehme ich nur mit Unne, und mehreren andern an, daß wo nun Istrien, Friaul, Krain, und in dem Theile Kärnthens, der, meistens rechts Hand der Draue, oder Drau (Dravus) aus Kalkstein besteht, trocknes Land ist, ehemals Meeresgrund gewesen sey; es sey nachher, daß, wie Unne meynt, bey immer abnehmendem Wasser, und zunehmendem Trocknen; oder wie Buffon dafür hält, bey Anhäufung der Wässer gegen Osten und Verminderung derselben gegen Westen, die bis dahin unter dem Meere vertieften Kalkberge ganz, oder zum Theil nur entblößt worden sind; oder, welches eben so wahrscheinlich ist, dieselben nur nach und nach, durch Zusammenschlemmung und Anhäufung, oder Fällung und Niederschlag der feinsten Kalktheile, aufgesetzt worden, und entstanden sind; weil zumal das mittlere Kalkgebürg (nämlich das von Krain) dicht, gleichförmigderb, von unfühlbaren Theilchen, und ohne Spuren von Versteinerung der Schaalhiere ist.

Dieses, bald höhere, bald niedere, oft auch sehr hohe, und gemeinlich wegen seines minder festen Zusammenhangs in Ansehung der auf dasselbe wechselweise stark wirkenden Hitze oder Kälte, Nässe oder Trockne u. leicht verwirrende, und daher öfters sehr zerföhne, abgebrochne, und gegen seine äußersten Gipfel zu, stelle, ja ganz prallige, und kaum zu erkletternde, wiewohl noch unterhalb kettenweise zusammen,

genem Schnee zusammenschießenden Wässer unterhalb auswaschen. Das allzüngste Gebürge endlich, das nicht leicht nur die halbe Höhe (oft kaum den dritten Theil) des Mittelgebürgs zu erreichen pflegt, aus lauter einzelnen, oder auch zusammenhangenden Hügeln besteht, und gemeinlich vor und hinter Berden, dem Haupt- und Mittelgebürge, sich mit denselben fortzieht, das ich auch deshalb das Vorgebürg nenne, besteht aus allerhand bald unordentlich, bald schichtenweise aufgesetzten Kalkstein- und Sandlagen und Breitschen, mit untermischten Trümmern von Feldstein (Petrofiliex. Wall.) Porphyr, und Felssteinarten. Solch ein Vorgebürg ist in Kärnten jenes, so sich diesseits der Draue von Natschberg an, über die Sattung hin, bis gegen Wiering zu, in gleichlaufender Linie mit dem Kalkmittelgebürg, so jenseits der Draue das Grenzgebürge zwischen Kärnten und Krain ausmacht, fortzieht; solch ein Vorgebürg ist das, so in der Gegend von Alibofen und Eutharing zu sehen ist: solch ein Vorgebürg vor dem Hauptgebürge ist der berühmte, oder vielmehr so beschwerlich zu befahrende Grifnerberg u.

sammenhangende jüngere Kalkgebürg (k) streicht in Kärnten zwischen Morgen und Abend, und verpächet sich gegen Mittag, das ist, gegen das adriatische, folglich auch gegen das mittelländische Meer. Wenn schon nicht so genau und mathematisch, (wäre es wohl auch möglich?) setzt dasselbe doch durch Kärnten größtentheils schier in gleichlaufender Linie fort, mit dem linken Hand der Draue sich fortziehenden, viel ältern, meistens auch viel höhern, sehr oft wellenlangen, mit ewigem Schnee bedeckte und zusammengefrorene Eisberge einschließenden Hauptgranitgebürge, das von Savoyen und Piemont her, durch einen Theil der Schweiz, sich gegen Enns hin zieht, diese Grafschaft schief durchkreuzet, dann über Niederfindel, Kienz, Döferecken, Matrap, Kals, in Kärnten zugleich, und das Salzburgische auf der Basterzen, dem Heiligenblut — und Raumer Tauern einbricht, und nachdem es dessen obern Theil ganz durchlaufen hat, theils über Großkirchheim, Gmünd, Mill, Stadl, Reichenau, Stadnitz und Kleinkirchheim u. theils über Oberdraaburg, Trausnitz, Knopitz, Tüchel und Obervelach u. sich bey Hüttenberg, und durch die Kelling ins Unterkräntzen über Wolfsberg, St. Gertrauden und St. Kienhard, und von da weiter in die obere Steiermark u. zieht; und aus lauter zusammengesetzten Felssteinen besteht. (1)

Ben

(k) Wenn schon Kalserde, wie Hentel und Wallerius behaupten, eine ursprüngliche Erde ist: so folgt doch noch nicht daraus, daß die Kalkberge selbst die ältesten und ursprünglichen seyn müssen.

(1) Dergleichen sind: *Saxum Granites* L. gemeinlich mit weißem: nur in der Gegend des Aldrichhofes mit rosenfarbencm, und am Kamprechterberge ohnweit St. Paul mit grünem Feldspate. Seine übrigen Bestandtheile sind: Quarz, der überhaupt weiß, fettig, undurchsichtig und gleichförmig verb ist; bisweilen aber ganz durchsichtig und farbelos, Quarzum hyalinum L. nichts von den Bergkrysalen unterschieden, als daß er ungeschnitten ist. Ich besitze davon ein Stück aus Großkirchheim (wo nuter dem Rös sehr große Bergkrysalen in Menge wachsen) das so groß als ein Weizenkopf, und ohne alle krySTALLINISCHE Figur ist. Glimmer, der oft kleinschuppicht schwarz, oder silberfärbig ist; selten grün; öfters großblättrig und wie Silber glänzend; ich habe fingerdicke Bündel darinnen gefunden, die spannläng, und eben so breit waren. In Großkirchheim, und am Kamprechterberge habe ich auch granatrothen Glimmer darinnen gefunden, der großblättrig, und bisweilen in dreieckige Pyramiden zusammen geschossen ist. Zu dem finden sich in unsern Graniten öfters ein: rothe krySTALLISCHE Basalten, kohlschwarze säulenförmiger Schödel, seltner grüne halbdurchsichtige säulenförmige Basalte, am seltensten schwarze oder grünliche Hornblende, specksteinartiger Glimmer, oder so etwas vom Aebst. Vermittelt der weisse oder rothe Feldspat, so zerfällt er in ein weißes saubiges Mehl. Die übrigen Felssteinarten unsers Granitgebürge sind: *Saxum fornacum* Linzei, von allerhand Art, als Garpergense L. Marestrandense L. welches wie lauter Silber aussieht, Aethereum L. Grandævum L. Alpinum L. Tritorium L. seu Molare Walleri, gemeinlich grau, bläulicht, grünlicht, seltner roth: bald sandartig, bald schiefricht. Trapezum von mehrern Farben: Cotiarium L. Talcum Ollaris L. Serpentinus Saxosus, Walleri.

D



Bei Verminderung oder Zurücktretung des Meerwassers von Norden gegen Süden, und weil doch noch Fluth und Ebbe fortgedauert haben werden, denke ich dann, muß das adriatische Meer eine Menge seiner Schaalhiere, entweder in den tiefen Hohlwegen und Gräben zurückgelassen, oder gewiß dahin zusammengeschlemmt haben, wo nun der Bleyberg, das ist, der bleybergische Erzberg steht; und zwar eben so, wie 1.) die Nordsee ein Gleiches, zu Maastricht am Petersberge und in den unterirdischen Steinbrüchen nächst dem freyherrlich de Eleerschem Schlosse u. mag gethan haben, da Nordholland entblößt worden, und sich aus dem Meere empor geschwungen hat. Es bricht daselbst sehr häufig ein: ein weißlichgelber, fein sandartiger, zwischen den Fingern zerreiblicher Kalkstein, (Marmor scdile Linnæi) der sich im Scheidewasser, und zwar mit Aufwerfung eines Staubrauchens, ganz auflöst, ohne alle Spur kengemischten Flugsandes. Cronstedt, wie Bergman in seiner Erdbeschreibung meldet, hat ihn für einen Sandstein (Cotem) angegeben, das er doch nicht ist. Er zerfällt für sich ganz in freyer Luft, bädert aber sehr gut zusammen unter der Erde; weswegen ihn auch die Maastrichter in lauter große Quatterstücke schneiden, und häufig allenthalben in dieser Absicht zum Bau im Grunde verfahren, und ist hierinnen gerade das Widerspiel des gleichbergschen fein sandartigen, mit feinem Quarzsande gemischten, weißen, in freyer Luft mehr und mehr sich verhärtenden Kalksteines (Marmor itidem scdile. L.) aus welchem alle Häuser zu Paris in Frank. reich aufgebaut worden sind. Ueber die vielen, so verschiedentlich gefärbten, schwarzen, gelblichten aschgrauen, oft nach Korallenart ästigen, und allezeit mit einer verhärteten Rinde von Kreide überzogenen Kieselsteine, (Silex cretaceus, et marmoreus L.) welcher erstaunlich große Menge bereits verkalkter, schneeweißer Schaalhiere habe ich in diesem Kalksteine in wäherender Zeit meines Aufenthalts in Maastricht, angetroffen! Wie anders? und wann sonst? als bey Abtretung des Meeres, sind die verschiednen *Cardia*, *Veneres*, *Tellinæ*, *Turbinæ turriti*, *Serpulæ*, der *Echinus Spatagus*, und was noch wunderlicher ist, der in diesem Meere heutiges Tages nicht zu ersiehende *Mytilus margaritifera*, und die *Scallop*, sammt den Kinnladen der *Lacerta Crocodilus* (davon die starken kegelförmigen Zähne mit einem braunrothen glänzenden Schmelz überzogen sind) dahin gekommen?

Eben so, sage ich, sind die heutigen Eingeweide des bleybergischen Erzberges mit Muscheln, Schnecken, und mehr andern Conchilien gefüllt worden, wie 2.) bey dem zurücktreten eben desselben adriatischen Meeres, ein ganzer Schaß schaaliger Seethiere in der Gegend von Althofen, zu Guraring, und auf beyden dem Sonnen- und Schelmenberge, vor dem höhern hüttenbergischen Gebürge, theils auf den fruchtreichen Aedern im Mergelschon, theils auf den niederen jüngern Hügeln im weißen Kalkspate, und gelblichten gleichförmigderben Kalksteine, (so lange er noch weiche



weiche Kalkerde war,) zurückgeblieben; wo dann im letztern lauter kleine walchische Helixen, in der That aber nur versteinerte Milleportien, Madreporkien, Vorprien, im Ersten hingegen eben dieselben, los, und eingeln; dann größere oder kleinere Buccinaten, Turbiniten, Herz- und Venusmuscheln, Pectiniten, sammt wahren Helixen, das ist, versteinerten Schnirkelschnecken u. gefunden werden.

Eben so, sage ich endlich 3.) als noch heut zu Tage zu Savorsl, einer Fischerinsel ohnweit Triest, das adriatische Meer in wärender Zeit der Fluth Muscheln, sammt Meerstrand, Kalkgrus und Gersten, hin an das Gestade schleudert, die daselbst unordentlich vermischet, bey der Ebbe zurückbleiben, sodann theils durch den mit austrocknenden Meerleerten, theils durch die bindende Kraft der Luft selbst, zu einer wahren Muschelbreitsche zusammen wachsen, und ungeheuer große, dicke, schwere, fest, zusammengeklittene Matten bilden, in welchen noch zur Stunde sehr deutlich die *Arca grossa* L. das *Cardium rusticum* L. der *Nautilus Beccarii* L. *Turbo striatulus* L. *Mytilus edulis* L. *Dentalia*, *Veneres*, *Tellinae*, *Donaces* &c. und zwar mit ihren systematischen Kennzeichen, zu sehen sind.

Die theils in den ehemaligen Abgründen des Meeres, theils durch desselben untere Ströme, oder auch obere Fluth und Ebbe, hie und da angepüllet, und durch andere in Folge der Zeit sich eräugte Ueberschwemmungen, hie und da, je nachdem die Richtung der anschwellenden, oder ablaufenden Wässer war, zusammengeschlemmten Schaalthiere sind nachmals wärender Zeit späterer Jahrhunderte, in verschiedenen Gegenden, durch verschiedene sich zugetrugene Erderschütterungen, Einstürzungen, Verrückungen u. bald mit Thon, Kalk, Mergel, oder Sandlagen verschüttet, begraben, bedeckt worden; bald mit andern, durch neue Ueberschwemmungen herbeigeführten und aufgesetzten Schichten Kalk, oder Thonerde überzogen worden, und so ferner fort, bis das jüngere Kalkgebürge so, wie wir es dormalen sehen, ganz gebildet worden; mit tausendfachen, ja allen nur möglichen Ungleichheiten, die wir in seinem Eingeweide allenthalben wahrnehmen, und die lange nicht in dem uralten, oder ursprünglichen Granitgebürge, das viel gleichförmiger ist, vorzukommen pflegen.

Zum Behuf der Einbildungskraft meiner Leser, lege ich hier denselben vor Augen einen bloß idealischen Entwurf des Streichens der Gänge im Innern und außen Bleyberg, den ich der Güte des geschickten kaiserlich königlichen Marktscheiders Herrn Adam von Durmer, gegen mich, zu danken habe; der auf allerhöchstem Befehl den ganzen Bleyberg in, und auswendig aufgenommen hat. Wir sehen denn aus demselben, daß das ganze Bleybergische Erzgebürge von Morgen im Abend seinen Zug, oder so genanntes Streichen, auf zwey bis drey Meilen in die Länge hin, habe. Es



ist dasselbe so, wie die, demselben sehr nahe, gegen Mittag zu, gegen über liegen. de, und wenigstens zweimal höhere Willacheralpe (sonst auch der heilige Stein genannt) ein bloßes Kalk- und folglich jüngeres Gebürge, dessen Hauptgebürge. Der Stein gleichförmigderb von unföhlbaren Theilchen, und zwar im innern Bleyberg gegen Abend hin, weiß; im äußern hingegen ums Kennen etwas grauer, das ist, weißgrau ist. Beyde, ich sage, den heiligen Steinen vom Bleybergischen Erzgebürge, schei- det ein sehr tiefer Graben, von einander, in welchem die berühmte Bergstadt Bleyberg liegt, und durch den ein zwar kleiner, aber dem dasigen Bergwerke sehr nützlicher, ja höchstnützlicher Bach strömet; der auf der nördlichen Seite besagter Alpe (zweifels- ohne schließt die Willacheralpe in ihrem Schooße ein sehr geräumiges Hydrophyllacium ein) etwas unter derselben mittlern Höhe entspringt, und sich über der Wurzel dersel- ben theilet, so, daß der eine Arm gegen Morgen, durch den äußern Bleyberg, gegen Willach hin; der andere im Gegentheil gegen Abend, durch den innern Bleyberg fließt; dem Scheine nach, als ließe er mit eilenden Schritten, sein Gewässer nur bald dem Heilthale zuzuführen, wenn er schon in der That selbst, nachdem er einige gegen Abend hin angebrachte Mühen und Werker geirleben hat, sich durch eine Krümmung wie- der gegen Morgen zu wendet, um sich abermal mit dem Hauptarm zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit demselben gegen Aufgang zu strömen.

Besonders merkwürdig ist es, daß man in dem Betre dieses Bachs, so wie im ganzen Graben, und überhaupt in den meisten Gräben, die das jüngere Kalkgebürge (im Silbergraben unter dem heiligen Ischarlberg bey Tarwls; im Kalk- wasserthal im Rabl u.) durchkreuzen, allerhand größere, oder kleinere Geschiebe und Trümmer erblickt, vom grünen, bläulichten, oder auch schwarzen Trapp (Cor- neus Trapezum Wallerii) vom Saxo Trapezio Wallerii, das ist tinnitante Lin- næi; vom Saxo Ophite nicht Cronstedti, sondern Wallerii; vom rothen, mit weiß- sem Feldspat eingepregten Porphyr; vom dichten Schörl (Basaltus solidus viridis Wallerii; dann vom Alpengestein (Saxum alpinum L.); Mandelstein (Saxum glandu- losum W.); rothen, bald feinern, bald gröbern Sandstein, (Cos fundamentalis L.) Gestein (Saxum fornacum Wall. Garpergensis Lin.); schimmernden Sandstein (Sax. Novaculare rubrum L.); u. c. ! Bin ich recht — oder bin ich nicht recht daran? ent- weder weil diese Geschiebe vom höhern ursprünglichen Gebürge durch starke Wasser- güsse, und Ueberfluthungen je hieher gefahren worden sind? oder weil vielleicht der Fuß des aufgesetzten Kalkgebürge aus denselben bestehen mag?

Einzelne, von allen Seiten ganz frey, steht die hohe Willacheralpe da, deren Länge von Willach bis Wasserlemburg, sich auf zwei Meilen wenigstens, ausstreckt; und ist im Jahre 1348. den 25. Jänner, Abends, an ihrer steilsten, oder prallig- sten

sten Seite zwischen Untergang und Mittag, das ist, zwischen Wasserlemburg diesseits, und Arnoldstein jenseits des Geißflusses, durch eine gewaltige Erberschütterung von oben herab geborsten, und zum Theile eingestürzt; wodurch dann, wie sehr leicht zu errathen ist, einzle einzeln zerstreute Hütten elender Hirten, die da noch heure Schaafte weiden; aber lange nicht, wie der eikle Wahn des blöden Vbbels vorgiebt, siebenzehn Dörfer, noch viel weniger eilich und zwanzig Städte, wie Johann Thurnmayer (m) aus Conraden von Weidenberg, meldet, vergraben worden; weil doch die ganze Strecke, über der sich das Erdbeben zwischen der Alpe, wo sie sich gespaltert hatte, und dem sehr reißenden Geißstromme, ausdehnt, keine ganze Meile austrägt; wo sodann kein hinlänglicher Raum für so viele Dorfschaften, oder Städte seyn konnte.

Das Bleybergische Erzgebürg hingegen, das mit besagter Alpe von Morgen in Abend fast in gleichlaufender Linie sich fortstreckt, schließt sich zuletzt durch eine gegen Mittag hin genommene Krümmung, an das geisthalsche Kalkgebürg an; das ohnfehlbar auf älterem Gesteine ruhen mag, weil doch in der ganzen mittlern Gegend zwischen Bleyberg, Wasserlemburg, Lucialirche, Kerschdorf, (n) St. Stephan, Windische Höhe, Kreuzen, Vaternion; und von da im Drauzergale, gegen Lind, und Schiffilz zu, allenthalben unter dem Kalkgebürge Saxum Garpergensc. L. Saxum cotiarium Wall. Saxum tritorium cinereum L. Cos saxosa rubra Wall. dann Saxum Trapezum. L. hervortragen, und zu sehen sind. Ja im Stockambog nächst Va-

D 3

ternion,

(m) Johann Thurnmayer, sonst auch Aventinus von Abentzberg genannt, meldet in seiner bayrischen Chronik. 3. Buch. E. CCCCCI hievon so viel: Im nechsten jar nach Keyser Ludwigs tod, als man zalt ein tausent drey hundert acht und vierzig jar, an sanct Pauls bekehrung, kam ein grosser Erbbidem am abend: wäret vierzig tag an ein ander; thet allenthalben grossen schaden: sechs und zwenzig Stätt und Schloßer seind mit Wibe und Leuten verfallen: das Gebuam, die Kirchen, die Krauwn umb die Stätt seyn einggangen. In Keuten thet sich das Erdreich auff: seyn zween Berg zusamen gefallen; haben die Stätt, Märkt, Schloßer, Dörffer, Wih, und Leut, nemlich Willach die Stätt verfallt. Es seyn eilliche reiche Kauffleut von Regensburg zu Willach verfallen. Man hat die Beuwn under den Kiben fizen, und melkend, mit samt den Kiben erstarret, gleichsam zu einem Salzstein verwanbelt, gefunden. Solchs schreibt Conrad von Weidenberg, dieselbige Zeit ein grosser Künkler, und Sternseher; sagt, er habe solchs besuch mit sampt des Herzogen aus Osterreich Einsler; und ist ein grosser jämmerlicher Sterben hernach kommen; ist nicht der vierte theil der Menschen überleben. 2c.

(n) Gleich außer diesem Dorfe geht ein tiefer Graben gegen Wasserlemburg hinunter; in demselben bricht im aschgrauen, nicht aufbrausenden Thone die bekannte blaue Eisenerde ein, oder das sogenann'te natürliche Berlinerblau. So lange dasselbe noch in seiner nassen Muttererde, oder auch sammt derselben im Wasser aufbehalten bleibt, ist es schmutzig weiß, und kostbarzig; wird nun der Thon, und samt demselben die Eisenerde in freyer Luft trocken, welches in einer halben Stunde geschieht, so ändert sich die weiße Farbe derselben, in das schönste Himmel. oder Berlinerblau, das saubartig ist, und abfärbt, aber nie wieder im Wasser weiß wird; auch nicht einmal im Scheidewasser, mit dem es überdem nicht aufbrauset.



ternton, bricht sogar derber und krystallisirter Zinnober in Saxo molari albo Wallerii ein; so wie zu Schiffszug kleinförniges Gold in Saxo metallifero cinereo Linnæi (composito ex quarzo impalpabili cinereo et Steatite, sive mica talcosa pariter cinerea Linnæi) und in der Neberzsch nächst Weispriach derber glänzender Wispitzel (Arsenicum albidum Linnæi) in Saxo molari cinereo Wallerii.

Es ist schwer, das in den Schriften der Gelehrten eben so, als in der Natur selbst, verirrte Steinreich, in einer mineralogischen Schrift berühren, und nicht selbst in eine Art von Verwirrung zu gerathen. Allemal sollte man nur von einem und ebendemselben Hauptgegenstande handeln; und nie kann man die, mit ihm verbundenen, oder bey und mit ihm sich stets einfindenden andern Nebengegenstände ganz unberührt neglassen.

Das Bleybergische Hauptgebürgsgestein ist denn, wie ich bereits oben, theils auch in meiner Abhandlung vom kärnthenschen Bleyspate, gemeldet habe, ein weißlichter, oder auch schmutzig weißgrauer, gleichförmigderber Kalkstein; der mit Schießpulver gewasser geschwind aufbrauset; mit weißen, auch milchbläulichten, bald dünnern, bald stärkern Kalkspatadern durchzogen ist; und im frischen Bruche (wenigstens gegen die Sonne gehalten) wegen der sehr kleinen, mit eingemischten weißen Kalkspatzielen, wie feiner Zucker glümmert. Er ist sehr dicht, schwer, und hart; läßt sich aber doch sehr gut, wie ein anderer Marmor, schleifen, und poliren, so, daß er einen guten Spiegelglanz annimmt; ohngeachtet er, weil die Farbe eben nicht sehr prächtig ist, schwerlich unter die edlen Marmorarten dürfte gezehlet werden. Magnetsaische schwarze, baum, oder flechtenförmige Dendriten pflegen in demselben, in jeder Weise, und nach allen geraden oder schiefen, loth, oder waagrechteten Richtungen einzubrechen; bisweilen auch, wo er zumal flüßig ist, erblickt man an ihm röthlichgelbe, oder gelbbraune wellenförmig concentrische, und bänderförmige Zeichnungen, einner mit den unterirdischen Wässern darüber weggespöhen, oder vielmehr geträufelten eisenschüssigen Mergelguhr.

Nicht jedermann möchte es vielleicht bekannt seyn, daß eben dieses Bleybergische Hauptgebürgsgestein, von oben herab bis auf die Hälfte des Gebürge, so viel man seit her hat beobachten können, durch den ganzen Gebürgzug aus lauter eingeschlossnen Muscheln bestehe, (und in dieser Rücksicht ist dasselbe eine wahre Lumachella:;) die, wo der Kalkstein zum Theile zu verwittern anfängt, recht deutlich auszunehmen sind; sonst aber nicht anders wahrgenommen werden, als durch den Abriß des verschiednen Durchschnits, wenn der Stein entweder nach der Länge, oder nach seiner Breite, oder Höhe, senk, oder waagrecht geschnitten, und geschliffen wird. Schon in mei-

ner



ner berühmten Abhandlung vom Bleyspate, habe ich des großen, einer Narrenkappe ähnlichen Bucardits (dessen eigentliches Geschlecht, sammt der Figur, und systematischen Beschreibung, ich bald weitläufiger geben werde) Erwähnung gethan; aber dieselbe pflegt nur einzeln hier und da im gedachten Kalksteine vorzukommen, und nistet in demselben gleich dem Kerne eines unbeweglichen Adlersteins. Viel stärker, und allemal mehr zusammengehäuft, habe ich darinnen eine Art sinnlicher Herzmuschel (Cardium) gefunden, deren Urbild im Kalk nicht angezeigt worden ist, und die im Bleyberg selten die Größe einer Haselnuß übertrifft, (bisweilen auch nicht größer ist, denn eine Erbse,) hingegen im Rahl, unter dem Wasserfall, gleich außer dem Gasthofe, doppelt so groß ist, und in einem schwarzen gleichförmigberben Kalksteine von unsichtbaren Theilschen sehr häufig vorkommt. Einige dieser Herzmuscheln, und zwar die meisten, sind noch ganz unbeschädigt, in ihrem vollkommenen Stande, mit beyden, festgeschlossenen Schalen: bey den übrigen hingegen kommt nur die Eine, bald die obere bald die untere Schale, oder auch nur ein Theil derselben, wenn sie gebrochen ist, vor. Was doch die Länge der Alles zuletzt zerstörenden Zeit nicht zu Wege bringt! Bey allen diesen, dermalen schon versteinerten Schaalstücken, ist weder der Seewurm, noch sein voriges Gehäuse mehr da! Beyde sind verweset, oder gewiß vermetamorphosirt. Was ehemals Muschel, oder Schale war, ist jetzt ein weißer, oder milchbläulicher halbdurchsichtiger Kalkspat; vielleicht weil bey verwesender Schale, in dem zurückgebliebenen leeren Raum derselben, Wasser durchgedrungen, das mit den Theilschen des Kalks, zu Kalkspat geworden ist: statt der vormalsigen Tethys im Gegentheil, füllt nun die beyden Schalen aus entweder der Kalkstein selbst, oder der vorbeschriebene Kalkspat; oder es durchkreuzt den ausfüllenden Kalkstein, eine kalkspatarartige Zwerchwand vom Schlosse bis zum entgegengesetzten Rande der Muschel mitten durch!

So, und mit so beschaffenen eingehüllten Muscheln ist nun das Gestein des Bleybergs, von seinem Gipfel an, bis zur Hälfte seiner Höhe herab, beschaffen. Ich will indessen doch nicht schlechterdings behaupten, daß in demselben nicht auch noch weiter herab Muscheln angetroffen werden könnten, oder sollten. Gewiß ist es, daß, als man vor etlichen Jahren im so genannten Gerelt, das ist, innerem Bleyberg, das kaiserliche Scheidehaus zu bauen anfieng, daß man, sage ich, etlich und fünfzig Lachter vom Antoni de Wadua Stollen gegen Abend, gleich neben dem damals ausgeheckten, jetzt aber bereits erbauten Scheidehaus, an dem Fuße des Gebürgs einen Steinbruch angelegt, wo abermal im Kalkstein häufige versteinerte Meermuscheln, mit ungleich mehrern, theils kugelförmigen, theils länglich enzförmigen Kernen, eingebroschen sind; nur mit dem Unterschiede, daß, indem das Gebürgsstein von oben herab weiß ist, und die in demselben eingeschlossenen Muscheln aus einem ins Milchbläuliche fallend.



fallenden Kalkspate bestehen, der in diesem Steinbruche eingebrochne gleichförmigderbe Kalkstein (wegen beigemischtem Brennbaren?) dunkel aschgrau, oder auch schwarzlicht; und die darinnen sich befindenden sehr kleinen, beiderseits der Länge nach, gestrichen, oder vielmehr geribbten, nicht Herz- sondern Bastardmuscheln oder Anomia, sammt den gemeldten runden Kernen, kohlischwarz sind.

Da dieser letztere asch- oder schwarzgraue Kalkstein des untern Gebürge sehr dicht und feste ist, und die Schalen der Muscheln zugleich mit dem innern Kern derselben, von einer und eben derselben kalkartigen Natur und Farbe, endlich auch Kern und Schale zusammen gewachsen sind: so war es bey denselben viel schwerer, die Gattung, und das Geschlecht des Schaalstieres zu bestimmen, als bey jenen des obern Gesteins. Läßt man denselben anschleifen, (er nimmt eine gute Politur an,) so sieht man von den Bastardmuscheln nichts, weil sie erhaben sind, als einige nicht mehr zusammenhängende Streiche; statt der vielen Kugel- oder erunden Kerne hingegen, lauter kohlischwarze zieretrunde, oder elliptische Scheiben, in deren Mittelpunkte entweder ein sehr kleines Quadrat, oder ein sehr schmales Parallelogramm von weißem Kalkspate zu sehen ist. (Wer mißkennet noch an diesem, zum Theile mit kleinen Anomiten gefüllten Kalksteine das wahre Marmor Hammitz Linnæi?) Will man übrigens die kleinen Bastardmuscheln deutlich und kennbar genug sehen, so hat man nur einen dergleichen Stein, wo er bereits zu verwittern anfängt, oder gewiß im frischen Bruche anzusehen, wenn man anders glücklich genug war, ihn so zu zerschlagen, daß ihrer einige auf der Bruchseite zum Vorschein kommen. Sie sind sogleich, theils an ihren zurückgelassenen hohlen Eindrücken, theils an den auswärts erhabenen Abdrücken, davon die Einen so wohl, als die andern, allemal der Länge nach, geribbet sind, zu erkennen.

Übermal am Fuße eben desselben klenbergischen Erzberges, aber gegen Morgen hin, und zwar ohnweit des kaiserlichen Pulverthurms, trifft man Gesehiebe, und Bruchstücke von allerhand Größe, eben desselben asch- oder schwarzgrauen Kalksteins an, (vergleichen ich selbst ein recht schönes beise,) und in denselben, sammt den gleich beschriebenen kleinen, tiefgestrichenen Bastardmuscheln, und sprudelsteinartigen festen Kernen, eine Menge anderer, nicht viel größerer, aber gleicherdings verfeinerter Schaalstiere, die von außen an der Oberfläche, wo die Verwitterung stärker zu genommen hat, deutlich zu erkennen sind. Woraus denn zuletzt, wenn schon nicht mathematisch, doch nicht ganz ohne allen Grund physischer Wahrscheinlichkeit, zu schließen ist, daß bey künftig genauer angustellender Untersuchung, man die untere Gebürge, mitre gleicherdingen mit allerhand Meermuscheln, und versteinen Schaalstieren gefüllt, antreffen dürfte.



So viel vom Hauptgebürgsgestein des Bleybergischen Erzgebürge. Wir wollen nun so ein wenig in desselben Schooß und Eingeweide, wenigstens so viel es unser Vorhaben erfordert, einzudringen trachten. Es befinden sich dann in demselben mehrere hinter ein ander liegende Mergelschiefergänge, (*Marga tophacea nigro-cærulescens Wallerii*) die parallel, das ist, in gleichlaufender Richtung mit dem ganzen Gebürgszug, von Morgen in Abend fortstreichen. Mit der St. Oswaldsgrube, die bereits auf 126. Lachter in das Gebürg angetrieben ist, hat man drey dergleichen Gänge verhärteten schiefrigen Mergels durchkreuzet. Den ersten in der 26. Lachter; und der ward nur fünfsehalb Lachter mächtig. Den zweiten in der zwey und vierzigsten Lachter, von etwa elfsehalb Lachter — und endlich den dritten nach hundert und zwö Lachtern, dessen Mächtigkeit zwölf ganze Lachter beträgt; daher er auch in Bleyberg, wegen seiner größten Mächtigkeit, der Hauptschiefer (wohl verstanden allezeit: verhärteter schieferartig einbrechender, und grobbleättriger Mergel) genannt wird. Das wahre Streichen von allen Dreyen ist dem Mittel nach, Stunde 19. † 5. Grad in Abend. Das Fallen hingegen der zwey Ersten (allezeit dem Mittel nach) Gr. 43. † 40. — bey dem Dritten aber Gr. 55. † 1. in Mittag. Nur erst in der 116. Lachter, folglich schon in der Mächtigkeit des so genannten Hauptschiefers, auf dem Kreuzgestänge, nahe bey'm liegenden, ist Eronstedts aus Kalkstein, dann Muschel, und Schneeschalen durch Thon zusammen gelemte, und zwar hieorts pfaue, schwellige Breccia, das ist der so berühmte, und nicht am richtigsten so genannte opasirende Muschelmarmor, erschrotter, und mit eben diesem Stollin verkreuzet worden. Er hat zum Dach und Bette, das ist zum Hangenden, und liegenden, den bläulichen, schwarzen, oder auch blau aschgrauen verhärteten Mergelschiefer; streicht hier mit eben demselben Hauptschiefer in einer und eben derselben Stunde in Abend; und hält auch mit ihm ein gleiches Fallen von 55. Gr. in Mittag. In dem Morgenschlag, der von diesem Kreuzgestänge aus, in die Mächtigkeit des Hauptschiefers ist betrieben worden, ist weder in der Sohle, noch in der Fürst von dem Muschelmarmor etwas wahrzunehmen; es hat folglich derselbe sein Streichen bloß in Abend über sich; und ist da (wo er am mächtigsten war) eine Querhand breit, meistens aber nur einen bis drey Finger dick eingebrochen. Vom gleichermähnten St. Oswaldstollner Kreuzgestänge 178. Lachter in Morgen ist zwischen dem gewerkschaftlichen Dreyfaltigkeits, und dem kaiserlichen verantheilten St. Christophs Stollen, mit dem, mit beyden Stollen verdurchschlagenen Schlag in Abend, gedachter Hauptmergelschiefer in einer schiefer Linie durchkreuzet worden; in welchem die bald zu beschreibenden verschiednen Muscheln und Schaalstiere in eben dem blau aschgrauen Mergelschiefer angetroffen worden sind, aber jederzeit ohne allen Glanz, und ohne die so prächtigen und lebhaften Feuerfarben. Der Mergelschiefer selbst, so feste er auch sonst in der Grube zusammen hält, zerfällt doch zuletzt in freyer Luft, und die Muscheln können dann leicht von dem



felben abgelöst werden. Wie mächtig sie aber in demselben einbrechen? läßt sich mit keiner Gewißheit bestimmen; weil sie mitten in demselben stecken, und ihn gleichsam zu Ihrer Verbindung haben; folglich auch weder ein besonders Streichen derselben, noch Fallen, in demselben abgenommen werden kann.

Im äußern Bleyberg, ohngefähr 2500. Lachter vom St. Christophs Stollen in Morgen, auf dem gewerkschaftlichen St. Franciscus Stollen, ist bey dessen Vermessung eben dieselbe Art Mergelschiefers in der 26. Lachter erreicht worden. Es ist derselbe gleicherdings verhärtet, sieben ganze Lachter mächtig, und scheint der erste, das ist, eben derselbe zu seyn, der schon im St. Oswalds Stollen, und zwar eben in der 26. Lachter, am ersten ist erreicht worden; er enthält jedoch hier eine ungleich größere Menge von Schaalstieren, die nicht so wohl von einer und eben derselben, sondern von mehrerley Art und Gattungen sind; doch wieder stets ohne Feuerfarben, und Glanz. Gleiche Umstände pflegen gleiche Folgen und Folgerungen zu haben. Auch hierorts ist die Lage der eingeschlossnen Muscheln nicht so ganz ordentlich beschaffen; deßhalben kann auch, aus eben der Ursache, weder ihr Streichen, noch Fallen im besagten Mergelschiefer abgenommen, und noch viel weniger ihre eigentliche Mächtigkeit in demselben ganz genau bestimmt werden.

Die Erzgänge anbelangend, so streichen sie in diesem Gebürge parallel, das ist, gleichlaufend mit den Mergelschiefergängen, oder auch mit den Wendungen des Gebürgs selbst; und sind an und für sich völlig taub. In dem innern Bleyberge fand ich durchgehends bey den verschiedenen Stollen, die vermessen und aufgenommen worden sind, (als insonderheit bey St. Christoph, St. Anton von Vadua, heiligste Dreifaltigkeit, Maria Empfängniß, vierzehn Nothhelfer, St. Oswald, und andern mehr,) daß der erste Gang, auf welchem die meisten Bleyerze einbrechen, und bereits eingebrochen sind, gleich hinter dem Hauptmergelschiefer, hart daran liegt; so daß auch öfters der Mergelschiefergang auf dem Erzgange ruhet, und da, wo der Gang edel wird, die Erze noch außer der Mächtigkeit des Gangs, schon im Mergelschiefer angetroffen werden. An manchen Orten aber findet man denselben erst etliche Lachter davon entfernt. Das Ganggestein ist eben auch nichts anders, als ein dichter, und meistens gleichförmigder Kalkstein; welcher sich bloß darin vom Gebürgsgesteine unterscheidet, daß das Ganggestein etwas grauer, als das Gebürgsgestein ist, wohingegen dieß Unterscheidzeichen im äußern Bleyberg gerade umgekehrt befunden wird; da nämlich das Ganggestein weißer, das Gebürgsgestein aber etwas grauer ist. Da übrigens, dem gemeinem Sprichwort nach, nicht leicht eine Regel ohne Ausnahme ist: so befindet sich auch sowohl der innere, als der äußere Bleyberg in diesem Falle; und an manchen Orten läßt sich denn das Eine von dem Andern der Farbe nach,



nach, kaum, oder gar nicht unterscheiden; oder soll man etwa vielmehr sagen: Vermischung fremder Schwängern der Theile (davon die wahre Ursache in allen Umständen für gewiß anzugeben, sehr schwer ist,) verursache den Uebergang des Einen in den Andern? wenigstens, wo nicht der Wesenheit selbst, doch der zufälligen Farbe nach?

Wenn das Ganggestein im innern Bleyberge, bey Verfolgung der Gänge, oder bey Betreibung der Hoffnungsschläge, graue Flecke bekömmt, oder auch sich so weit ändert, daß es fast ganz grau wird; so hat man allezeit gute Hoffnung, auf Erzte bald zu gelangen; indem das Ganggestein da, wo die Erzte einbrechen, durchaus grau ist, oder auch, hie und da wenigstens, graue Flecke zu haben pflegt, die man, wenn zumal der Stein naß ist, in der Grube öfters für Bleyerz selbst anseheth. Die Mächtigkeit dieser Gänge ist im innern Bleyberg nichts weniger als jederzeit gleich; doch kann man dieselben, dem Mittel nach, für sechs bis achtachter mächtig annehmen. Das Streichen derselben ist jenem des Hauptmergerschiefers gleich; das Fallen aber 37. Grad im Mittag, und ändert sich mit den aufsteigenden Gebürgswendungen, oder mit dem Fallen des Gebürgs selbst. Zu dem hat die vieljährige Erfahrung überzeugend gelehrt, daß die Erzte in den bleyberger Gängen nie bloß dem Streichen nach fortsetzen, noch daß dieselben die Gränzen ihrer eigentlich dazu bestimmten Erzeugung, nämlich vom Hangenden bis zum Liegenden, wie bey andern Hauptgängen, und Klüften, bebehalten; sondern es werden dieselben auch noch überdem, außer dem Hangenden, und Liegenden, wo die Gänge edel sind, in dem daran sich unmittelbar anschließenden Gebürggesteine beiderseits angetroffen. Sowohl im äußern als im innern Bleyberg geschieht die Veredlung der Erzgänge durch die, dieselben übersezen, den Kreuzblätter, oder Klüfte. Sie streichen zwischen Stunde 11. und 12. in Mitternacht; und fallen im innern Bleyberg 32. bis 39. Grad in Morgen; im äußern hingegen 15. bis 20. Grad in Abend. Wo daher diese Kreuzklüfte die Gänge durchsetzen, bilden sie die sogenannten Erzflächen; welche von der Anhöhe des Gebürgs in einer schiefen Richtung auf den Gängen bis in die Tiefe herabfallen. In dem innern Bleyberge zum Beispiel, wo sowohl die Gänge, als die übersezenen Kreuzblätter flach fallen, fällt die Schärungslinie, (welche die Kreuzblätter mit den Gängen vermöge ihres Streichens und Fallens machen) unter einem Verschägunswinkel von 25. Grad in die Stunde 9. in Morgen. Diese Linie, die durch beyde Flächen bey ihrer Durchkreuzung bestimmt wird, ist also das eigentliche Streichen der Erzte. In dem äußern Bleyberg hingegen, wo die Gänge steiler fallen, und auch sehr schmal sind, fallen die Erzte auf den verschägenden Kreuzblättern, nach dem Streichen der Gänge, in Abend unter sich in die Tiefe.



Zu mehrerer Deutlichkeit alles dessen, und um uns überhaupt einen zwar kurzen, doch ächten Begriff, nicht von den besondern einzelnen Eruben (denn wer würde sie alle von 3 bis 6 hundert an der Zahl beschreiben?) sondern von dem Bleybergischen Erzgebürge, seinem Streichen, Fallen, Gebürge und Ganggestein ic. zu machen, habe ich hievon in der oben angeführten Idealcharte die von Dürer'sche Zeichnung bengeleget; wie nämlich die Gänge, und übersehbenden Klüfte, dann die Erzflächen selbst, streichen und fallen; und wie sie auf dem ersten Gang in einer Entfernung von 30. bis 40. Lachtern hinter einander folgen. Die Mächtigkeit der Erzflächen ist ungleich; im innern Bleyberge sind sie eine bis zwei, auch dritthalb Lachter hoch und breit; im äußern im Gegentheil nur eine halbe bis eine ganze Lachter breit, und oben unter dem schief fallenden Kreuzblatt, zwei bis sechs Lachter hoch und tief verhauet.

Und hiemit wissen wir denn zuletzt, das dormalige Stiefvaterland, und ihr demselben den vermeinten eigenen Geburtsort, ja, wenn ich so reden darf, auch das Bette oder die Wiege selbst unsers pfauenschweifigen Helmsinckholts. Noch mehr; wir wissen, daß er in seinem Urgebürge; nein, nur in einem viel jüngern; ich will sagen, in einem Gebürge, das, wenn es auch hoch genug ist, doch bloß als eine Tochter späterer Zeit anzusehen ist, ist zu Hause sey, nachdem seine leibliche Mutter, das adriatische Meer, glücklicherweise diese Gegenden verlassen, entblühet, sich von denselben weiter weggezogen; und ihn, als den unglücklichen Waisen, außer seinem Elemente, seinem Schicksale, und der Gnade oder Ungnade des in spätern Jahrhunderten sich hierorts aufschürmenden Gebürges überlassen; welches denn auch denselben nicht so, wie selbsteigleichen viele, geschonet; sondern recht unbarmerzig behandelt, zerbrochen, zertrümmert, in jämmerlichen Stand gesetzt, und größtentheils halb vernichtet hat! Endlich wissen wir, (so wenigstens überhaupt,) wie dieß jüngere Kalkgebürge, wie das in demselben streichende Gebürge, oder Ganggestein ic. beschaffen sey. Es ist dann nichts mehr übrig, als daß wir noch gründlich, und mit aller möglichen Zuverlässigkeit wissen: was er endlich sey? aus welchen verschiednen Theilen er zusammengefüg, oder vielmehr zusammengeleimt? und welche Schaalschiere insonderheit die seyn, die in seine Zusammenfügung mit einlaufen? ob sie alle von einerley, oder von mehreren Gattung und Art seyen? Alle, oder nur Einige, und welche hauptsächlich, mit den so prächtigen Farben, und hohem Feuerglanz prangen?

Ohngeachtet es nun äußerst schwer war, vom gemelbeten Muschelmarmor so etwas zu erlangen, weil er zumal gleich von allem Anfange, als er nur bekannt wurde, schon von allen Seiten her verschrieben, bestellt, und mit erstaunlichen Unkosten aufgekauft worden ist; zwar nicht in der Absicht, damit man ihn unterfuchte, und endlich wüßte, was doch in der That selbst daran wäre; sondern um ihn zu verschnel-

den,

den, zu schleifen, zu poliren, zu verarbeiten, kurz, zum Gegenstande der Eitelkeit zu mißhandeln; so gab ich mir doch alle mögliche Mühe, um nur einige, wenn schon nicht die schönsten, und die vorzüglich mit vielen glänzenden Blättern versehen wären; als vielmehr, die man wahre lehrreiche Stücke nennen konnte, davon zu bekommen, aus denen man denn klar zu erweisen im Stande wäre, was davon zu halten sey? Meine schätzbarsten Freunde, ein Marzher (o), ein Plener, Hannstadt, Durmer, zum Theile auch Marx, haben mir auch zu diesem Ende ihre vorzüglichsten Dienste geleistet, indem sie mir gütigst Stücke zu Theil werden ließen, die, weil sie keine Blätter zu enthalten schienen, (auch in der That keine sonderbaren enthielten,) von andern verworfen wurden, nach welchen aber ich hauptsächlich getrachtet habe, weil ich sehr wohl einsah, daß sie das ganze Geheimniß aufzuschließen alleine vermögend waren. Unerkennlich, und nicht mehr würdig ihrer Freundschaft wäre ich, wenn ich Anstand nähme, ihnen meine öffentliche Dankagung dafür abzustatten.

Der ganze opalisirende Muschelmarmor, oder Lumachella, ist denn nichts, als, wie ich gleich Anfangs gesagt habe, ein von ohngefähr zusammengeflittertes Gemenge, oder Breccia aus schwarzem Kalkstein, allerley meistens schon zertrümmerten Meer- und Flußmuscheln, und Schnecken, dann bläulich-schwarzem Thone; durch welches bläwelich-schmale einzelne Adern oder Schichten weißes Kalkspates durchsetzen; und in welchem öfters theils anflügiger, theils kleinförmiger Schwefelkies einbricht. Zuerst werde ich melden, was ich von der besagten Breccia selbst, weiß; dann von einem Theile ihrer Zusammensetzung insonderheit reden.

Diese Muschelbreccie, wiewohl aus Mehrern zusammengeleimt, ist dennoch sehr feste zusammengebacken; so, daß sie sich schleifen läßt, und geschliffen einen guten Glanz annimmt. Sie bricht, wie bereits erinnert worden, im Mergelschleifer ein; steht aber in demselben nicht, wie man zu sagen pflegt, auf ihrem Kopfe, sondern liegt vielmehr, ob schon nicht ganz waagerecht, darinnen; und behauptet folglich eine schwebende Stellung. Falsch ist das Vorgeben, sie sey so hart, daß sie am Stahle Feuer schlage. Die das behaupten, hatten darauf nicht Acht, daß sie von ohngefähr auf ein mit feinem oder auch unkenntlich eingesprengtem Eisenkies gefülltes Plätzchen geschlagen hatten. Das so schöne Schattenerzt des rablerischen Blenglanzes würde mich hierinnen so, wie der kärnthnerische (vielleicht auch der von andern Ländern?) kleinflüßige Eisenspat, getäuscht haben, wenn mir nicht das Vergrößerungsglas den

(o) Meine Abhandlung, und wärmster Wunsch ist zu meinem vielen Vergnügen in Erfüllung gegangen. Man hat die großen Verdienste Eurer Gnaden des Herrn von Marzher erkannt, und ihn als wirklichen Suberalrath bey dem kaisert. königl. unterösterreichischen Gubernio angestellt.



sonst unschicklich in denselben eingewirkten Kies entdeckt hätte. Ich will indessen das durch eben nicht sagen, daß zum Feuer schlagen mehr, als eine sehr große Härte des Körpers, nöthig sey; nein; ich weiß schon, daß so gar der sonst weiche klebrichte Thon, wenn er anders genugsam im Feuer verhärtet wird, am Stahle Feuer schlage; nur behutsamer, wollte ich sagen, soll man seyn, wenn man Kalksteinen, oder kalkartigen Eisensteinen so frey von der Leber Eigenschaften zumuthet, die sonst nur glasartigen Steinarten zu kommen; weil sie doch selten oder nie die Härte des Kiefels oder Quarzes besitzen. Der Eisenpat (sonst auch weißes Eisenerz, oder Pfingz) wird zwar in der Steyermark, und anderorts, Stahlstein genannt; aber nicht, weil er am Stahle Feuer giebt; noch weniger, weil er schon von Natur bereiteten guten Stahl enthält; nein, sondern weil der meiste Stahl im Eisenerz und Vorderberg aus demselben, als dem daselbst gemeinsten, und am häufigsten einbrechenden Eisenstein verfertigt wird; übrigens aber wird sowohl in der Steyermark, als sonderlich in Kärnten, (dessen Stahl überhaupt, und vorzüglich der Graf Christalniggische, dann der Vellheimische, Baron Eggerische, Graf Lobronische, den Steyermärkischen selbst an Güte weit übertrifft,) auch aus den übrigen erdhafte Eisensteinen, ich verstehe den rothen, schwarzen, braunen, gelben Blutstein, mit gleichem Vortheil und Nutzen, Stahl in Menge verfertigt. Nun von den Theilen, daraus sie besteht:

1.) Der Kalkstein unserer Muschelbressche brauset sogleich mit Scheidewasser stark auf, ohngeachtet er übrigens sehr hart, feste, gleichförmigderb, von unsühnbaren Theilchen, und im Bruche, wie ein jeder anderer Kieselstein, muschelförmig ist. Sein Strich, Pulver, und der daraus beim Idrochre, oder sonst im Feuer gebrannte Kalk ist weiß. Seiner schwarzen einförmigen Farbe ohngeachtet, (die doch hauptsächlich vom brennigemischen Brennbaren herrühren wird,) verbreitet er dennoch, wenn er zerrieben wird, keinen widerlichen Geruch, wie der Stinkstein; nein, er verhält sich hierinnen gerade so, wie ein jeder anderer gemelter weißer Kalkstein. Ich würde keinen Anstand gehabt haben, das Marmor Schistosum. L. oder des Wallerius *Calcareum æquabilem siliciformem*, daraus zu machen, wenn nicht die feine Politur, und der Spiegelglanz, den er durch die Politur annimmt, stärkere Gründe gegeben hätten, ihn unter die edeln Marmorarten, als eine Spielart des *Marmoris Luculli*, zu zählen. Eben diese feine Feine, und die Unsühnbarkeit seiner Theilchen, die ihn gleichförmigderb macht, und die Ursache seines so schönen Spiegelglanzes ist, zum Theil aber auch die Wahrnehmung, daß ihn, so dicht und fest er auch ist, nicht nur allein kleine Blättchen, sondern auch sehr oft ganze große Blätter der opalisiren, den Muschel, schichtenweise, und gedrängt, und nach allen Richtungen, durchkreuzen; endlich auch die stete Beobachtung, daß, wo in demselben noch immer das pfaunen, schweifige Gehäufte des Schaalthieres, ganz oder nur zum Theile, angetroffen wird,



so gar, wenn dasselbe vielkammerig ist, es allezeit mit eben demselben Kalkstein an, und ausgefüllt sey; alle diese Betrachtungen, sage ich, haben mich auf den Gedanken gebracht, (ob ich recht daran sey, oder nicht? werden Andere entscheiden; zumal die, die eine bessere Auslegung des Geheimnisses angeben können, wie es möglich sey, „sind die Worte eines Walchs,“ daß eine Steinmasse durch die bekanntermaßen enge Nervenöhre des Nautiliten so vollkommen durchkommen könne, daß sie allen zwischen den Scheidewänden befindlichen leeren Raum desselben völlig ausfülle?) daß dieser Kalkstein zu der Zeit, da die Versenkung, oder Verschleuderung unserer Schaalthiere, sammt dem zähen Bodensatz des Meeres, nach dem heutigen Osvaldestollin geschehen ist, reinste niedergeschlagene Kalkerde, das ist mehligte Kreide gewesen sey, die mit dahin zusammengegeschlemmet worden, mittelst des Meerwassers sich theils um die zertrümmerten Gehäuse und SchaaLEN geleeget, theils in die halb, oder ganz gebliebenen Gehäuse selbst eingebrungen, darinnen durch die Frist von Jahrhunderten verhärtet; und durch, wo immer her, dazu geschlagenes Phlogiston, schwarz geworben sey. Und das ist nun der stärkste Theil unserer Lumaehella; es folge

2.) der Kleinste, nämlich das *Viscidum maris sedimentum*, ich will sagen, der Thon, der die im Nergelschiefer tief vergrabene Muschelbrette meistens so ohn, geführ von der untern Seite, wie der gemeldete Kalkstein von der Obren, gleichsam einschlammert, wiewohl er auch die Muscheln und Schnecken selbst (die anders noch mehr oder weniger ganz sind) allenthalben einhüllt; vielleicht zu einigem Beweise, daß diese Schaalthiere nicht, so wie der Pomplius, bis zur Oberfläche der See gewohnt waren sich zu erheben, um auf derselben zu rudern, und herum schiffen zu können, sondern stets im Abgrunde des Meeres, in seinem zähen Bodensatz geleeht haben, oder etwa noch irgendwo leben; weswegen man auch ihre Originale seither aus keinem Meere noch gehakt, und sie bloß versteinert unter der Erde gefunden hat. Es ist derselbe schwarzblau; im Wasser, oder auch nur mit Wasser benetzt, ganz schwarz; in freyer Luft wird er zuletzt bläulich. So, wie er in der Breische selbst steckt, oder den Schaalthieren ansetzt, ist er verhärtet, und fest; saugt durchaus das Wasser nicht ein; ja löset sich in demselben nicht einmal auf; ob er schon, nachdem er im Wasser lange gewesen ist, bey der Austrocknung zerspringt, sich bröckelt, und endlich wegfällt. Im irischen Bruche, wenn man ihn zumal vom opalisirenden Schaalthiere ic. wegreißt, ist er ganz glatt; weich und fein anzufühlen; glänzt, als wäre er mit Oele angeschmiert; steht aber dessen ohngeachtet, oder vielmehr eben deswegen, nie an die Zunge. Ich habe starkes Scheidewasser darauf gegossen; er brausete mit demselben gar nicht auf; kugte es nicht einmal ein; so wenig, als darauf getropfeltes Del; es breitete sich das Eine, so wie das Andere auf ihm bloß mehr und mehr aus, bis Beyde darauf aus, oder eingetrocknet waren. Nun wollte ich noch sein Verhala



Verhalten im Feuer wissen. In der Absicht legte ich ein Probestück davon auf eine gelbschte Kohle, und spielte mit dem Idirohre die Spitze der Flamme darauf; sogleich fieng er an zu knistern; es sprangen auch manche kleine Stücke davon weg; entweder weil noch verschlossene fixe Luft, oder gewiß unendlich kleine Wassertheilchen darinnen enthalten waren. Ohnbewegtr stund er endlich da; aber bey Fortsetzung des fortwirkenden Feuers, blähte er sich stark auf, und bekam ein Aussehen eines Schiefers, das ist eines bläurigen Klumpens; wurde weder roth, noch röthlich, sondern bleich mausfärbig, wie etwa trockne Stauberde, und verhärtete mehr und mehr, bis er zuletzt, bey weiter fortgesetztem Feuersversuch, für sich selbst zu einem mausfärbigen undurchsichtigen festen Glase schmolz. Noch vor der Schmelzung, so bald er genug geröstet war, zerrieb ich davon etwas zu Staube; es wurde jedoch kein Staub, denn davon vom Magnete gezogen, wiewohl ich noch überdem, bey abermaliger Röstung, und wiederholtem Versuche, Fett dazu geschlagen hatte, um den Eisentheil, der darinnen stecken konnte, durch das Brennbare wenigstens zu entwickeln. Allein vergeblich. Ich nahm meine Zuflucht zum Borax, schmelzte mit demselben abermal auf der Kohle das Probestück des Thons. Stufenweise, so wie sich beyde durch die Schmelzung mehr und mehr vereinigten, wurde das Boraxglas undurchsichtig schwarz, braungelb, fuchseroth, gelbgrünlicht, zuletzt da das Probestück in dem sich stets in die Runde herumdrehenden feurigen Kügelchen schier ganz verzehret war, wasserklar und durchsichtig, jedoch allezeit so etwas ins Grünlichte schielend, woraus ich denn schließen zu können hoffe, daß derselbe nicht ganz ohne seinen kleinen Theil Eisens, und folglich ohnfehlbar die *Argilla mineralis caerulea*, sive *nigro-caeruleus Wallerii*, das ist, eine Unterart des *Bolus caeruleus Linnæi* (oder sollte man *caerulea* sagen?) seyn müsse. Da nun der Mergelschiefer, in welchem der ganze Keil des Muschelmar-mors einbricht, sowohl der Farbe nach, als nach dem weiß aschgrauen Strich, und zumal nach den Versuchen im Feuer, gänzlich mit besagtem Thone überein kommt, nur daß er mit Schelbewasser stark aufbrauset; so bin ich ganz der Meinung, daß er anfänglich eben nichts anders, als *viscidum maris sedimentum*, sonach aber eben dieselbe *argilla mineralis Wallerii* gewesen sey, bis er endlich durch den Benützte der Kalktheile, die die unterirdischen Wässer von dem später aufgesetzten Kalkgebürge abgewaschen, ihm zugeführt, und in ihm abgesetzt haben, zu einem schieferartigen Mergelthon (*Marga tophacea caerulea Wall.*) geworden ist.

3.) Der Kalkspat, den ich darinnen sparfam, hie und da in dünnen Adern, oder auch lagenweise angetroffen habe, ist gemeiniglich weiß, und durchscheinend, oder gewiß vom ersterbenden Blau, das ist, wie stark gewässerte Milch bläulich, und halbdurchsichtig; dem Gefüge nach bläweissen gleichförmigderb; aber gemeiniglich, wie *Spatum confusum Linnæi*, kleinstüftig, mit allenthalben hin unordentlich gerichteten

Bliesen

glühend; nur wenn er ohngefähr in einem Gehäuse eines Schalthieres, oder zwischen dessen innern Scheidewänden mehr Raum angetroffen, drümpf, und unordentlich krySTALLINISCH angeschossen, pflügt er von bleicher Rosenfarbe zu seyn.

4.) Eisen, oder wie ihn Andere nennen Schwefelkies, findet sich auch nicht selten darinnen ein; und zwar bald im Kalksteine, bald im Thone, bald auf den Schalthieren selbst, als ein äußerlicher Ueberzug derselben. Er ist entweder nur anflüßig und angeschmaucht, oder stahldicht und feintörnig; allezeit jedoch von sehr wässriger gelber Farbe, es sey denn, daß er irgendwo, wo der Kalkstein klüßig ist, oder gerade ausgeht, sich angefest hätte; denn da habe ich ihn öfters auch vielfärbig, das ist, pfauenschweifig gesehen. Auf der Kohle geröstet, raucht er nicht; der Geruch davon ist dennoch sehr durchbringend schweflicht, und die Schlacke, die nach verflüchtigtem Schwefel zurück bleibt, wird alsogleich vom Magnet gezogen. Endlich komme ich

5.) auf jenen Theil der Zusammensetzung unsers Muschelmarmors, der denselben hauptsächlich und allein berühmt gemacht hat, und der vielleicht am wenigsten noch zur Stunde bekannt, oder gewiß nicht anders bekannt ist, als überhaupt, und unter allgemeinen nichts bestimmenden Begriffen. Es sind diese die Meermuscheln und Meeresschnecken, die in demselben in Menge stecken; freylich, was meistens zu beklagen ist, in sehr elendem Stande! jämmerlich zertrümmert! erbärmlich zerschlagen! aber doch noch zum Glück in einigen wenigen Stücken so ziemlich gut erhalten, daß man sie zuletzt erkennen, bestimmen, beschreiben kann. Dies will ich mich denn nach Möglichkeit zu thun befehlen, genug, ja überflüssig für alle Bemühung des, lohnt, wenn Kenner und wahre Naturforscher mein Bestreben gütig aufnehmen, und ihrer Aufmerksamkeit nicht unwürdig schätzen sollten; was nachher immer bloße Liebhaber schöner Ländeleien, oder bloße Verehrer künstlich zusammengestoppelter Träume, vielleicht gar gallstüchtige Gelehrte? (deren Zorn ich doch nirgends gereizt habe) davon denken, oder reden, und dasselbe billigen, oder mißbilligen mögen.

Die in der blenbergschen Muschelbreitsche sich findenden Schalthiere, oder Conchylien, sind nicht alle von einer und eben derselben weder Gattung, noch Art. Ich habe darinnen zwoschaalige Muscheln, ich habe auch nur einschalige, so genannte Schnecken gefunden, und unter den letztern Schnecken ohne Abtheilungen, (Spirales univalves,) oder inwendig mit Kammern versehene Schnecken, (Spirales multivalves sive polythalamias,) das ist: ein, oder vielfächerige Schnecken. Da, wie bereits angemerkt worden ist, der ganze Keil der Muschelbreitsche, wie er in dem Mergel, schiefer selbst sich findet, beiderseits gleichsam eingeklammert ist zwischen einerseits dem berben Kalkstein, und andererseits dem mineralischen Thone; und die meisten in



derselben eingeschlossnen Conchylien größtentheils schon zertrümmert sind, so, daß man von außen ohnmöglich weder ihre äußerliche Gestalt, noch den innern Bau unterscheiden, auch nichts von ihren Farben, nichts von ihrem Glanze, Puz, und Schönheit u. entdecken kann; so war es freylich unumgänglich nöthig, oft die allerschönsten und größten Stücke, in welchen man die prächtigsten Flammen erlangt haben würde, aufzuopfern, und zu zerbrechen. Nur dadurch erkannte ich dann erstens: daß die in dem Helmintholith einbrechenden Conchylien, von jenen, die im Mergelschiefer, auf mehr denn 2000 fachter vom Osvaldsstolln weg, gegen Morgen zu, sich finden, nicht wenig unterschieden sind. Ich nahm zweitens wahr, daß die des Mergelschiefers, nie mit sehr prächtigen Farben, noch viel weniger je mit dem vortreflichen Feuerglanz versehen sind. Drittens: daß auch nicht alle, weder Muscheln, noch Schnecken des Muschelmarmors selbst, mit den glänzenden Feuerfarben spielten, sondern, daß Viertens ihrer hauptsächlich nur drey feiner von mir darinnen entdeckt wurden, denen diese Eigenschaft zukömmt; als nämlich (a) einer aus Linnden nicht genug zu bestimmenden Riesmuschel, *Mytilus forfan barbatus*? aut *edulis*? Lin. Ginanni. 2. Tab. 27. fig. 168. et fig. 169.) die ich selten, wenigstens in den mir zu Theile gewordenen Stücken, erblickt habe; dann (b) einem unter den sinnlichen Schaalstieren nicht beschriebenen, wohl aber unter seinen Helmintholithen einigermaßen (*λ. ambitu depresso, lateribus nodosis*) angezeigten Schiffebock, das ich *Nautilus redivivum* nennen werde, weil man dasselbe seither zwar sehr oft versteinert, aber nie, wie man zu sagen pflegt, in originali selbst gesehen, und nur erst ist im Wexberge noch ohnversehrt, noch in seinem natürlichen Stande, ob schon außer seinem Elemente, freylich nicht vollkommen und ganz, aber stückweise, in und mit allen seinen verschiednen besondern Theilen gefunden hatte; und dessen innere Wände oder Blätter prangen noch heutiges Tags jedervelt mit den so schönen und so feurigen Farben, wenn sie nicht gänzlich verwittert, oder verkalft sind. Endlich (c) abermal einem jedoch länglichten, nicht sehr stark, vielmehr sachte gebogenen *Nautilus*, den ich nirgends füglich hinweisen kann, als zu Linndens *Helmintholitho Nautili Orthocerae*, und folglich für eine besondere Spielart eines *Litui*, das ist in der Sprache des Herrn Martini (S. dessen systematisches Conchyliencabinet 1. Band S. 258.) eines *Bischofsstabs*, halten muß. Fünftens erkannte ich dadurch, oder ich glaube wenigstens nicht unbefugt zu seyn, mit vieler Wahrscheinlichkeit schliefen zu können, daß die goldgrünen und goldrothen Feuerfarben nichts, als eine bloße Wirkung mineralischer Dünste, (*vapores minerales*.) folglich spätern Alters, späterer Zeiten, und zwar, wie ich bereits oben, gleichsam im Vorbegehen, erinneret habe, ein bloßer Anflug seyn müssen; es sey nachher unterirdischer Luft, oder unterirdischer Wässer, die fremde, unendlich kleine Theilchen mineralischer Körper, womit sie geschwängert waren, herbegebrachte, und indem sie in den Muschelmarmor eindrungen

drungen, dieselben auf ihn abgesetzt, und zurückgelassen, die sich zuletzt an demselben fest angelegt, und ihm dadurch eine solche Pracht mitgetheilter haben. Denn da die zwoschaalige Miesmuschel von dem einschaaligen und viestämmigen Schiffeboote; und die verschiedenen Arten der Schiffeboote selbst, untereinander, nicht allein dem Bau nach, sondern auch in Bezug auf ihre Bewohner, die Seewürmer, als derselben Baumeister, gänzlich unterschieden sind, und dennoch alle im blenzenden Hellschwarz, mit eben denselben Farben, mit eben demselben Glanz spielen: können wir, sage ich, eine wahrscheinlichere, eine natürlichere, und den Umständen ihres unterirdischen Orts und Aufenthaltes angemessene Ursache dieser Erscheinung angeben? Zumal, da, wie ich schon zu Anfang gemeldet habe, eben dieselbe Ursache, in eben denselben Umständen unterirdischer Dörfer die pfauenschweifigen Glasköpfe von Hüttenberg, die ungarischen kristallirten Spieglaserze, die framontischen, die eisenstoffschen, die elbaischen prächtigen Eisenerze hervorgebracht hat! Zumal, sage ich wieder, da die ganze majestätische Pracht dieser glänzenden Feuerfarben bey erster (so zu sagen) Fühlung der Flamme des Idrothes so gleich, so plötzlich, so augenblicklich weg ist! folglich ungleich geschwinder, als bey weit stärkerem, weit länger anhaltenderem Feuer die Farben des Saphirs, des Topases, des Chrysoliths u. erst verschwinden! Niemand zweifelt daran, daß die Unbeständigkeit der Farben besagter Edelsteine im Feuer, und jene des Rubins und des Smaragds durch die bloße Zerstörung ihres Zusammenhangs, (wenn sie zu weißem Pulver zerleben werden,) ein richtiges zuverlässiges Zeichen der Vermischung fremder Theile sey, und alle Mineralogen behaupten einmüthig, die Vermischung geschähe bloß durch mineralische Dünste. Denn es läuft zuletzt auf eins hinaus, ob das sogenannte vehiculum der allerfeinsten mineralischen Theilchen, Wasser oder Luft sey. Als ich von Mainz nach Schwalbach fuhr, lockte mich die auf dem Berge vor Schwalbach, mit dem Spatio Scopario L. häufig allda wachsende sehr schöne *Digitalis purpurea* L. aus dem Wagen heraus. Bey dieser Gelegenheit sah ich allenthalben große Gesehieße, und Trümmer, auch hier und da aus der Erde hervorragende Felsstücke des *Quarzi colorati rubri Wallerii* und *Linnæi*; er war recht gesättigt dunkelroth, und durchsichtig, dicht, spalttrichtern Bruchs, schlug stark Feuer am Stahle, zwar dem Auge nach körnigen Gefüges, in der That aber bestand er nicht so wohl aus losen und bloß zusammengeklebten, sondern wirklich, und von Natur aus unmittelsam zusammengeflohenen Körnern. Wieder fand ich eben daselbst das *Quarzum Fragile Wallerii*, oder *opacum* L., das dem vorigen, wie ein Ei den Andern, gleich sahe, nur daß es ganz weiß ward. Damit ich nun nicht ganze Gesehieße des rothen mit mir nehmen dürfte, zerstückte ich deren manche. Einige davon waren durch und durch roth, wieder Einige hatten innerlich, in einer ziemlichen Tiefe, allershand bald größere, bald kleinere weiße Flecke, das ist, sie waren an jenen Plätzen dem besagten Quarzo



Fragili albo Wall. völlig gleich, und ich hatte folglich an manchen Stücken beyde, das Qu. coloratum rubrum, und das fragile album Wallerii benahmen, und brauchte dann nicht mehr zu folgern, sondern ich konnte schon mit Händen (wie man sagt) greifen, daß das Qu. coloratum rubrum in der That, und im Grunde nichts anders sey, als das Fragile Wall., nur daß es durch mineralische Dünste roth gefärbt worden ist. Wer daher das Coloratum für eine bloße Abänderung des Fragilis ansähe, würde meines Erachtens gar nicht fehlen. Im langem starkem Feuer wird das Rothe für sich selbst weiß; schmelzet man aber ein kleines Probestück davon auf der Kohle mit Borax, so wird man dasselbe zuletzt in dem reinsten wasserklaren und durchsichtigen Kugelschen des Borarglases, nicht mehr roth, sondern ganz weiß und matt sehen. Was sind mineralische Dünste? Ich denke, die feinsten brennbaren und andern flüchtigen Theilchen der Minern, die durch irgend eine Ursache aufgelißt, von ihnen losgerissen, mit der Luft, oder den Wässern vermischt, in denselben eine Zeit hindurch herumschweben, und wieder daraus niedergeschlagen u. werden. Haben dergleichen Dünste, haben, sage ich, mit dergleichen mineralischen Dünsten oder Theilchen vermischte Luft und Wässer, über, oder unter der Erde, die dichtesten gleichförmigwerden, edlen, oder unedlen Steine, ganz oder zum Theile durchdringen — dann anders, als sie bevor waren, färben können, mit, oder ohne Glanz, und Durchsichtigkeit: warum soll das Ding nicht auch im Bleyberge? warum nicht auch mit unserm Helmintholith, auf gleiche Art haben geschehen können?

Man wird sagen: Wenn daraus, daß nicht eine und stets eben dieselbe Muschel, oder Schnecke, sondern drey, gänzlich untereinander unterschiedne, mit eben denselben ungewöhnlichen Feuerfarben, und dem nehmlichen herrlichem Glanze prangen, richtig gefolgert werden könnte auf einen mineralischen Dunst, auf ein unterirdisches mit mineralischen Theilchen geschwängertes Wasser, oder auf die mit gleichen Körperchen angefüllte Luft unter der Erde, als auf die physische Ursache dieser Erscheinung; warum sind denn nicht auch andere, in eben denselben Muschelbreitsche eingehüllte Muscheln und Schnecken, durch eben dieselben Dünste, Luft, und Wässer, mit gleichen Farben, mit dem nämlichen Glanze, mit eben denselben Pracht, und Schmucke gemalt, verziert, verherrlicht worden? denn vermuthlich, ja ganz gewiß, haben diese Dünste, Wässer und Luft den ganzen Keil der Muschelbreitsche durchdrungen.

Allein das sind Geheimnisse der Natur! Geheimnisse, die, so wahr sie auch sind, oder es wenigstens seyn können, uns indessen dennoch eben so wenig, oder doch nicht



nicht so leicht, nicht so geschwinde auffallen können; Geheimnisse, die vielleicht nur unserm Nachkommen gänzlich zu entwickeln, vorbehalten ist; kurz, Geheimnisse, die ich, ohne zu erröthen, gerne eingesteho nicht ganz enthüllen, nicht vollkommen erklären, oder gewiß nicht allemal klar genug auslegen zu können. Aber wo ist auch derjenige, der sie bis auf den Grund eingesehen hat? der im Stande ist, sie völlig auseinander zu setzen? und der sie uns begreiflich genug lehren wird? Wo ist er? Ich will der erste seyn, der lernen wird, der erste, der meine Meinung fahren lassen wird, um die Seinsge anzunehmen, der erste, der ihm Dank und Erkenntlichkeit dafür abstatten wird. Bis dahin aber müssen sich schon die, die so denken, und reden, und so beschaffene Einwürfe machen, mit dem begnügen, daß ich ihnen aus der Vernunftlehre sage: daß man von einem besondern Falle, wieder auf einen besondern Fall, nicht sehr gründlich schliesse, und folgere. Sie müssen sich damit begnügen, daß ich sie erinnere, wie die Folgerung von der Wirklichkeit auf die Möglichkeit zwar allemal statt habe, aber nicht umgekehrt von der Möglichkeit auf die Wirklichkeit gut, und bündig gefolgert werde. Sie müssen sich bis dahin mit dem befriedigen, daß ich ihnen zu verstehen gebe: daß mein Schluß in der That nicht so wohl der war: „drey verschiedene Muscheln und Schnecken prangen mit opalisirenden Farben, also sind die mineralischen Dünste die Ursache dieses Farbenspiels;“, als vielmehr der: wenn nur stets eine und eben dieselbe Muschel oder Schnecke mit diesen Farben, und diesem Glanze versehen wahr genommen würde, so könnte man glauben, sie wäre von jeher vom Anfange ihrer Entstehung, sie wäre stets so gewesen, und das Thier oder der Bewohner derselben habe allein Theil daran. Da nun aber ihrer drey, und zwar so sehr unter einander unterschiedene, deren Bau, Zusammenfügung, und Baumeister selbst, so sehr unterschieden sind, hierinnen gleich beschaffen sind, so ist es nicht so leicht zu begreifen, daß ihnen diesen Puz der Seewurm selbst soll gegeben haben: und da wir zugleich eben dieselben Feuerfarben und Glanz an mehreren Mineralen und Steinen wahrnehmen, die stets unter der Erde vergraben sind; wo gewiß mineralische Dünste vorzüglich zu Hause sind, die dieselben, nach einhelliger Meynung aller Mineralogen, färben können, und zu färben pflegen, so scheint es wahrscheinlich genug zu seyn, daß eben dieselben so etwas in unserer Muschelbreische heimlich gewirkt, und diese bezaubernde Erscheinung zu Wege gebracht haben. Sie sollen sich bis dahin mit dem Bescheide begnügen, daß vielleicht andere, in eben derselben Muschelbreische sich gleicherdings einfindende Conchylien, da diese Dünste dieselben durchdrangen, nicht in der Verfassung gewesen sind, die bewußten Farben, und Glanz anzunehmen, denn es gehöret doch zu allen dergleichen Wirkungen der Natur eine gewisse Verfassung der Körper, ohne welche diese oder jene Ursache auf sie nicht wirkt, die sonst auf sie gewirkt, und diese oder jene Erscheinung zu Wege gebracht hätte. Wasser ist naß in



Bezug auf die Leinwand, und das Papier, aber nicht in Bezug auf den Kofh; die Sonne, die sowohl den Alpenschnee, als das an denselben gränzende nasse Erdreich beleuchtet, schmelzet den erstern zu Wasser, indem sie das letztere nur verhärtet; und wenn der Weingeist nicht zuvor erwärmet, oder doch so rectificirt wird, daß er die allerfeinsten unsichtbaren brennbaren Theilchen ausduftet, so wird ihn nie weder die Flamme der Kerze, noch jene des electrifirten Körpers entzünden. Ich habe indessen nur: vielleicht! gesagt; denn wer ist im Stande, so überzeugend, und mit Gewißheit die Ursache anzugeben, warum der Anflug mineralischer Dünste die krystallisirten ungarischen Spießglasnadeln, und nicht auch den Mutterstein, auf dem sie aufsitzen, oder nur den einen Theil, nicht aber zugleich auch den andern des hüttenbergischen schwarzen Glaskopfes, mit pfauenschwefelgem goldrothen, goldgrünen ic. Ueberzug, und Feuerfarben gemalt hat? Sie müssen sich endlich damit indessen begnügen, daß ich ihnen aufrichtig gestehe, daß mir bis iht keine wahrscheinlichere Ursache dieser Erscheinung beigefallen sey, und ich keine bessere Auslegung derselben wisse; auf meine Meinung aber dessen ohngeachtet nicht so hartnäckig verfallen sey, daß ich dieselbe nicht verlassen, und jener eines Andern nicht verpflichten wolle, der uns etwas anders, etwas bessers lehren, und das ganze Geheimniß gründlich, zugleich mit Anstand, ohne Galle, ohne Bitterkeit, und zumal ohne persönliche Schmähung (die ich von Gelehrten weder erwarte, noch verdient zu haben glaube) aufdecken wird.

Es folgt nun die Auslegung der beigefügten Figuren, und eine systematische conchyliologisch. mineralogische Beschreibung der auf besagten Figuren vorkommenden Conchylien und Steinarten.

Die Erste Figur.

Stellet das Gebürggestein des Bleybergs vor, das zugleich im äußern Bleyberg das Ganggestein ist, auf welchem in der alten St. Matthäus Grube die schönen gelben Bleyspate, und Bleyspatkrystallen eingebrochen sind. Es ist dasselbe ein weißlicher gleichförmigderber Kalkstein, der, dessen ohngeachtet, im frischen Bruche, wenn er anders der Sonne entgegen gestellt wird, mit den kleinsten und allerfeinsten Fliesen glimmert, sich gut poliren läßt, einen Spiegelglanz annimmt, und hie und da stärkere oder schwächere, kürzere oder längere, krumme oder gerade Wern von weißem, ins milchbläuliche (bleumourant) fallendem halbdurchsichtigen Kalkspat besitzt. An seiner höchsten Oberfläche scheint er mit krummen wellenförmigen concentrischen Streifen gebändert zu seyn, die wechselsweise von lichterer oder dunklerer gelbbrauner Farbe sind. Es sind indessen dieselben nichts anders, als ein sehr feichter, fast nur anflügiger, flenshüßiger Mergelkitten, den die je darüber weggeschos-

nen



nen, und mit demselben geschwängerten unterirdischen Wässer niederzuschlagen, und auf ihm zurückgelassen haben. Einer ganz andern Natur sind hingegen die baum-, oder gesträuchförmigen schwarzen Verzicerungen, die man häufig in diesem Kalksteine anzutreffen pflegt. Ich habe (wie ich bereits in meiner deutschen Abhandlung vom kärnthenschen Blespathe erinnert habe) mit denselben Versuche gemacht; diese haben mich überwiesen, daß sie bloß der ruffige Braunkstein (*Magnesia fuliginosa nigra superficialis dendritica hypni- aut sertulariaformis. Wall.*) hingemalt habe. Die, die auf der höchsten Oberfläche vorkommen, sehen so einigermaßen der kinnelischen *Sertularia polyzonias* (Ellis. Tab. 2. N. 3. fig. a. b.) gleich; jene hingegen, die wir auf dem abhängigen Bruch des Steins, der seine Mächtigkeit oder Dichte mißt, sehen, haben mich allezeit, ich weiß selbst nicht, warum? an das *Hypnum abietinum*, und *prolificum* Linnæi erinnert. Noch pflegen sonst diese magnesiatischen Denkmäler in Gestalt kleiner sternförmiger Astroiten öfters auf demselben zu erscheinen.

Die Zweite Figur.

Schon in meiner lateinischen Abhandlung von den kärnthenschen Blespaten, und nachher auch in der deutschen Uebersetzung, habe ich angemerkt, daß ich in dem gleich beschriebenen Kalksteine allenthalben einzelne, zwar lose, aber doch fest in demselben sitzende Kerne angetroffen habe. Sie sind ohngefähr von der Größe einer so genannten welschen Nuß, bisweilen etwas kleiner, gemeinlich zwey, auch drey, oder viermal größer. Wenn sie schon eine geschlossene zwoschaalige Seemuschel jederzeit richtig, und stets eben dieselbe vorstellen, so hat man doch an denselben nie die Schaalten selbst gefunden. Sie sind ein pur lauterer, und zwar eben derselbe Kalkstein, in welchem sie nisten. Sie passen ganz genau in den leeren Raum desselben, und füllen ihn dergestalt aus, daß sie darinnen unbeweglich sind. Dazu dient ihnen hauptsächlich entweder ein sehr dünner Ueberzug eines ziegelrothen staubartigen eisenschüssigen Mergelthons (*Marga argillacea pallide rubens Wall.*), oder eine gleichbedingte sehr leichte Rinde von weißem, auch milchbläulichem, durchsichtigem, drusigkrySTALLINISCHEM Kalkspat; (*Stalactites spatulus drusicus et crystallatus. Wall.*) deren zusammengewachsene Krystallen, wenn sie sehr klein sind, auch durch das Vergrößerungsglas nicht zu bestimmen sind, und dem Bruch eines feinschimmernden Zuckers gleichen, oder wenn sie in einem geräumigern Orte (in impressa ani regione) anschließen konnten, kurze sechsflächige Säulen, mit einer noch kürzern und stumpfen, aus drey fünfflächigen Seitenflächen zusammengesetzten Endpyramide, vorstellen. Seltner, ja sehr selten, habe ich sie mit einem dünnen, kreidenartigen, weißen, glatten Sinter *Stalactites incrustatum corporis peregrini. Wall.* überzogen gesehen. Es ist nicht zu zweifeln, daß diese Seelaterne vor Jahrhunderten wahre Seemuscheln gewesen seyen; aber welche?



che? das ist allemal schwer zu bestimmen, da ich Ihres gleichen bei meinen Conchyliologen keine finde. Wegen einiger, dem äußern Ansehen nach, mit den walchischen Buccarditen wahrgenommenen Aehnlichkeit, hatte ich sie in der angegebenen Schrift unter dieselben verwiesen, doch kann ich noch heutiges Tags mit keiner Gewissheit sagen, ob sie unter die Bien- (Chama) oder vielmehr Herzmuscheln (Cardium) mit mehrern Rechte gehören. Das Schloß würde alles sogleich entscheiden, wenn es nur möglich wäre, in einem bloßen, und zwar gleichförmigderben Seile, denselben je anständig zu werden. Chama Cor Linnæi kann sie gewiß nicht gewesen seyn. Ich will indessen, bis ich eines Bessern belehret werde, unmaßgeblich annehmen, daß sie ein verlorengegangenes, oder vielleicht noch irgend in dem Abgrund der Meere vorhandenes Cardium sep. Seine Beschreibung, wie aus der beigefügten Figur zu ersehen ist, ist folgende: Cardium triquetrum, testa cordato-trigona; nuda, leviz; valvulis æqualibus, antice compressis, obtule carinatis; vulvæ regione profunde dehiscente utrinque versus rimam declivi; hymene proilante; ano retuso; natibus procurrentibus, distantibus, parumper inflexis, obtusis; margine laterali politico acute carinato, edentulo. Damit man nun die dreyeckige Gestalt dieser Herzmuschel ganz deutlich ausnehmen könne, habe ich sie umgekehrt, auf ihrem Kopfe (oder will ein anderer sagen natibus et ano insistentem?) schief nach der Seite aufgestellt, N. 1. zeichnen lassen. N. 2. stellt sie vor, wie sie, noch halb im Mutterkalksteine nistend, von der Seite des Hinterzwischels — und N. 3. von jener des Vorderzwischels beschaffen ist. Zu allem Glück, da ich eben diese Abhandlung ins Reine schrieb, kam mir durch die Güte des Herrn Ploern gegen mich, ein Stück dieses Kalksteines in die Hände, in welchem zwar keine versteinte Muschel noch Schnecke zu sehen war, wohl aber der tiefe vollkommene Eindruck einer darinnen eingeschlossenen, und im Bleyberge feirher noch nie gesehenen Schnecke. Ich halte sie für einen Kräusel, (Trochus) will mich aber keines Wegesanken, wenn ein anderer, der mehr, als ich, Einsicht besitzt, behaupten sollte, sie gehöre vielmehr unter die so genannten Mondschnecken (Turbo) etc. Die versteuerte Schnecke selbst ist nicht vorhanden, folglich wird die Beobachtung ihrer Oeffnung (Apertura) und mit derselben die rechtmäßige Bestimmung ihres Geschlechts, ohnmöglich. Der schraubenartigen Gewinde habe ich sieben bis achte ganz deutlich gezählet, die eine einfache schräge Reihe hoher knoetiger Buckel in die Quere umgiebt (anfractibus subodonis, serie nodorum simplice coronatis). Sie ist N. 4. zu sehen.

Die Dritte Figur.

Uebermal ein gleichförmigderber, aber viel weiserer Kalkstein (Calcareus æquabilis albus opacus. Wall.) von unfühlbaren Theilschen, undurchsichtig, der sich sein porösen

liren läßt, und dadurch einen schönen Spiegelglanz annimmt. Er macht das höhere Gebürgsgestein des Bleybergs aus, und ist ohngeachtet dessen, nicht mit einzelnen hie und da zerstreuten, sondern mit einer Menge gedrängt zusammengehäufter versteinerten Meeremuscheln angefüllt, und sodann eine wahre so genannte Lumachella. Seine Muscheln scheinen gleicherdings Herzmuscheln (*Cardium L.*) zu seyn, wie jene des vorigen; aber von einer ganz andern Beschaffenheit. Viel, denn jene, klesner, doch zugleich von sehr unterschiedener Größe unter sich selbst; so, daß indem die Einen die Größe einer großen Haselnuß erreichen, die Andern kaum eine Erbse an Größe übertreffen. Würder- und Hinterzwickel (damit ich mich der Ausdrücke eines *Stadius Müller* bediene) sind daran nicht deutlich wahrzunehmen, wie sie denn überhaupt schon bey den Herzmuscheln nicht sehr merklich und kenntbar zu seyn pflegen. Die beyden Schaaalen, die nichts weniger als klaffen, und gemeinlich benammen, und geschlossen sind, sind untereinander gleich und fast gleichseitig, ohngefähr von rundlich herzförmiger Gestalt, bäumig gegen das Schloß, hingegen zusammen gedrückt gegen den äußern Rand, der stumpf, ganz, und ungekerbt ist, inwendig rundhohl, von außen weder in die Quere, noch nach der Länge geribbet, gerunzelt, oder gestrichet, sondern glatt und nacktend. Ihre beyden Angel (*nates*) ragen nicht viel hervor, wie bey der vorigen Herzmuschel, stehen auch nicht weit von einander weg, sie lenken sich vielmehr einer gegen den andern nahe zu. Und dieses sind so bey, nahe die systematischen Kennzeichen dieser Herzmuschel, die ich unter den kinnelschen ohnmöglich ausfindig machen konnte. Auch bey dieser suchen wir ganz vergeblich sowohl den Seewurm, als sein natürliches Gehäuse. Die Schaaalen sind in der langen Frist der Jahrhunderte zu milchbläulichem durchsichtigem Kalkspate geworden; und statt des ehemals darinnen wohnenden Seehafens oder Sprüglings (*Tethys*) sind dieselben mit eben demselben derben Kalksteine, in welchem sie fest und unbeweglich sitzen, ganz ausgefüllt; nur daß bey manchen, der ganzen Länge nach, mitten durch, eine mit den Schaaalen selbst gleichlaufende Zwerchwand von dem eben angeführten Kalkspat durchsetzt. Ich habe hier nichts weiter zu erinnern, als daß man eben diese Herzmuscheln, aber doppelt bis dreymal so groß, als hier die größten sind, und viel häufiger benammen, in einem schwarzen gleichförmigderben Kalksteine, in Naßl, gerade unter dem dasigen Wasserfalle, eingeschlossen antrifft. Die Schaaalen selbst sind auch da zu weißlichem, ins milchbläulichte fallendem halbdurchsichtigem Kalkspate verwandelt worden, und stehen oft, wo der Kalkstein halb zu verwittern angefangen hat, etwas außer demselben hervor.



Die Vierte Figur.

Schon oben habe ich gemeldet, daß das untere Gebirgsgefein des innern sowohl als äußern Bleybergs ein dunkelgrauer, auch schwärzlichter gleichförmigderber Kalkstein von unfühlbaren Theilchen ist, der sehr viele, kleinere oder größere, kugelförmige, oder in die Quere länglicht eiförmige, kohlischwarze, unbewegliche Kerne, sammt sehr kleinen versteinerten zwoschaaligen Seemuscheln heget, sich gut schleifen, und mit einem Spiegelglanz poliren läßt, und wegen der besagten festen Kerne kein anderer, als das Marmor Hammites. L. seyn kann. Hier ist ein ungeschliffenes Stück mit mattem Bruche, davon, und wir sehen zugleich, wie der Stein an der einen Seite durch die angehende Verwitterung seine natürliche, in die rostige Farbe, verändert habe. Noch ist das Gefüge des einen, zu verwittern anfangenden, dergleichen großen Kerns gleichförmigderb, ohne daß man die eigentlichen Theilchen seines innern Zusammenhangs kennlich wahrnehmen kann. Wo indessen an manchen Bruchstücken die Verwitterung äußerlich schlimmere Wirthschaft geführt hat, habe ich sonst fein, wie bey einer Zwiebel, schaaliges Gewebe deutlich erkennen können, zum unüberleglichen Beweise des innlichen Vorgebens, daß diese erbsen- oder eiförmigen Kerne aus nach und nach gefüllten Kalkhellen entstanden, und zugleich durch die Meereswellen (motu rotationis) abgerundet, und durch die darauf gefolgte Verdunstung der meisten Wassertheile zusammengewachsen sind. Zwar rüget Smelin (1. Theil. S. 403. des übersezten innlichen Mineralreichs) Linnés Meinung vom angegebenen Ursprung seines Marmoris Hammitz, und will aus demselben, so wie aus dem Karlsbader Sprudel, oder Nogenstein einen bloßen Tropfstein erzwingen. Je nun, die last selbner Einwürfe drückt nicht mich. Er mache seinen Streit mit Linné aus; und sieget er, dann pflichte ich, ohne zu erröthen, seiner Meinung bey, wie der, eines jeden Andern, zu dessen Seite die Wahrheit steht. Offenbar widersprechend, oder ohne allen Grund der Wahrscheinlichkeit, soll indessen, denke ich, Linnés Vermuthung doch nicht seyn. Begierig wäre ich fürwahr, zu vernehmen, ob dieser berühmte und wahrhaft gelehrte Mann, auch jene große Kugeln für bloße Tropfsteine? und den ganzen lichteisengrauen Kalkstein der bleybergischen Bleygruben, in welchem sie nisten, für Sprudelstein (Tophus Oolithus. L.) halte? Mir gilt es gleich; eine jede Meinung, ist sie nur wahr, nehme ich gleichgiltig an. Mitren in einem dichten, gleichförmigderben, lichteisengrauen Kalkstein (Calcareus aquabilis cinereus. Wall.) finden wir hie und da einzelne nistende unbewegliche Kugeln von 3 — 4 — bis 5. Zollen im Durchmesser, um und um überzogen mit einer farblosen durchsichtigen krySTALLINISCHEN drüsigten Kalkparinde. Sie schlagen am Stahle Feuer; und brausen mit aufgekochtem Scheidewasser auf. Schlägt man sie nun, so hart sie auch sind, enigweg, so entpüllet sich zugleich das ganze Gefelminis. Die kirkelrunde Fläche des Durchschnitts bietet

bletete dem Auge das natürlichste Bild eines der Quere nach abgeschlagenen oder abgeseigten Waldbaums dar. Mehr denn fünfzig schmale, concentrische, dicht zusammengebrängte, zirkelrunde Ringe kann man vom äußersten Umkreise bis zum Mittelpunkte zählen, die wechselseitig von hornbrauner oder aschgrauer Farbe — und wieder wechselseitig Kiesel- oder kalkartiger Natur sind! so, daß zuletzt das ganze Gewebe dieser Kugeln, so wie jenes einer Zwiebel, schaalig ist; zusammengesetzt aus lauter concentrisch übereinander liegenden, und wechselseitig kalk-, oder kieselartigen schaaligen Rinden. So wie indessen bey diesen, im Kalkstein fest sitzenden Steinkugeln der mittlere Kern gemeinlich eine größere oder kleinere Kieselkugel ist; so sitzt hinten gegen im Mittelpunkte der kugelrunden oder eiförmigen kohlischwarzen Kerne unserer angeführten Marmoris Hammitæ gemeinlich entweder ein Würfel, oder ein Kugelhörnchen, oder auch eine in die Quere ovale Scheibe vom weißem Kalkspat. Die beginne ich mich in dem weiß-, oder gelblichten, gemeinlich zwischen den Fingern zerreiblichen schaaligen Kalkbader-, oder Koggensteine, wahrhafte, oder doch versteinerte Seethiere selbst gesehen, oder gelesen, oder von andern, daß ihrer welche darinnen stecken, gehört zu haben. Unser bleybergisches Marmor Hammites kann man aufschlagen, wo man will, so bestimmt man gemeinlich mehr, oder weniger, zwar nicht in ihrem natürlichen Stande, doch schon zu Steine gewordene, zwischenschalige Kieselne Seemuscheln, zu sehen. Wunderlich ist es, daß der frische Bruch des Kalksteines nie die untere, flache? oder nicht stark erhabene, allzeit bloß die obere, von außen rund erhabene, und der Länge nach tief gestrichte, auch wechselseitig mit starken Ripben versehene Schaafe (valvula) a. a. oder gewiß den rundhohlen Eindruck derselben a. a. dem Auge darbietet! Dem sey, wie ihm wolle: lange zerbrach ich mir den Kopf, um diese kleine versteinerte Seemuschel bey ihren Laufnamen zu kennen. Vergeblich suchte ich sie unter Linneens Herzmuscheln (Cardium). Keine Beschreibung seiner so vielen Arten wollte auf die Meinige vollkommen passen. Ich wußte, daß die Bastardmuscheln (Anomia) gemeinlich an der einen oder der andern Klappe, das ist, Schaafe, nahe bey dem Schlosse durchlöcheret seyn, um, so wie die Meeröhren und Klippfleber auf den Meeresselsen desto leichter fortzuziehen zu können, wenn sie schon eben dadurch öfters die untere plattere Klappe verlieren; auch erinnerte ich mich sehr gut, vor etlich und zwanzig Jahren dergleichen kleine Bastardmuscheln, sammt den Punctcorallen, auf denen sie noch saßen, gesehen, und beschrieben zu haben, die noch in meiner kleinen Sammlung seyn mußten. Ich fand sie, und stelle sie mit hier vor an der Seite, bey a. a., a. und 11. 22. Freylich nicht, so scheint die Kehnlichkeit zwischen der Versteinerten im Kalksteine, und der Natürlichen des adriatischen Punctcoralls, vollkommen gleich zu seyn. Und welche ist nun diese? Ich werde erstens meine schon längstens davon gemachte Beschreibung getreulich vorlegen, und dann werden wir untersuchen, ob sie der Ritter Linne beschreiben habe? und entscheiden, welsche



Ob sie am wahrscheinlichsten unter den Seeligen sey? Sie ist folgende: *Anomia testa suborbiculata, nuda, postice non nihil angustata, bivalvi, inaequali: valvulis medio gibbis, longitudinaliter profunde striatis, marginem exteriorum versus declivibus, conniventibus in aciem acutam, denticulatam; extus coloris ossei, squalide ex luteolo albescentis; intus dilute magis albidis; cetera respective crassiusculis, firmis. Inferiore brevior, minus gibba, ad cardinem (••) transverse truncata, integerrima, intus prope basin dentibus? duobus ossibus depresso-planis, arcuatis; tribusque aliis in centro disci, erectis, fere subulatis. Superiore postice longior, nate scilicet ultra cardinem procurrente, atque a cardine ad natis apicem oblique, et cum declivitate subtus resecta, medioque instructa foramine, introrsum cum testa communicante (X) non tamen natem ipsam, sed cardinis tendinem percurrente. Diese ist nun die genaue vollständige Beschreibung dieser bald kleinern, bald größern, bald auch sehr kleinen Bastardmuschel. Alle mögliche Mühe habe ich mir gegeben, dieselbe mit einer jeden der sinnlichen Bastardmuscheln zusammen zu halten. Keine unter allen schen mit sich besser zu ihr zu schließen, als die *Anomia truncata*. L. Lister's (den ich nicht besitze) Figur davon, Tab. 9. Fig. 50. so wenigstens, wie sie mir mein alter verehrungswürdigster Freund Voda, mit Reißblein gezeichnet, von Wien aus, ohne alle Beschreibung übersandt hat, ist zwar der Meinigen weder sehr ähnlich, noch sehr unähnlich, sie scheint mir bloß die untere am Schlosse in die Quere abgekürzte Klappe vorzustellen. Genug beim Mangel mehrern Lichtes, daß sie der Meinigen nicht auffallend unähnlich ist; vielleicht würde aus der wörtlichen Beschreibung mehr, als aus der Abbildung, zu entwickeln seyn? Indessen gefällt mir desto mehr des genauen Qualiters *Terebratula parva*, una verticis parte depressiore et truncata, altera vero elatiore et acuminata, striata, striis crassioribus, subalbida. Vide Gualt. test. Tab. 96. Fig. nicht D. sondern C. Grenzsch führt Linne diese *Terebratula* des Qualiters nur bei seiner *Anomia Caput serpentis* an, und nicht bei der *A. truncata*. Aber mit welchem Rechte? Man halte die beiden sinnlichen kurzen, und weislaustigen Beschreibungen der *A. truncata*, und der *A. Caput serpentis*, mit der besagten qualiterischen Figur und Beschreibung zusammen. Und führt nicht auch Linne zur *Anom. Caput serpentis*, und zwar noch vor Herrn Qualiteri, des Jahn's Columna Concham *signum* (Colum. *Expositio* aquat. cap. XXI. pag. L. Figura pag. XXXVI. Concha diphyca supina, et prona Editio Romana. An. MDCXVI.) an? Wie gleich sind nun die beiden Figuren, des Columna, und des Qualiters? Es sollte mir in der That sehr leid thun, wenn mir hier der allezeit mit Hochachtung zu nennende, um die Mineralogie und Conchologie bestens verdiente Herr Hofrath von Born, mein besonderer Freund, auf einem solchen Pferde begegnet wäre. Er beschreibet Linne's *Anomiam truncatam* (Mus. Caesar. Vindob. pag. 118.) und giebt davon Tabula Fig. 13. die Abbildung. Eine Abbildung, die mit der hier angeführten qualiterischen keine, mit der des Columna aber wenig, doch ungleich mehr*

Ähnlich,



Ähnlichkeit hat. Eine Abbildung, bey der nicht, wie Linné zu verlangen scheint, Tendo cardinis valvulae superioris foramine pertusus, et hians in Anomia truncata; sondern wie er bey der Anomia Cap. serpentis sagt: Natis valvulae superioris longius prominens, subtus foramine pertusa, tendine cardinis ipso illaeso, und bey der die untere kürzere Klappe am Schlosse nicht sowohl der Quere nach abgefügert ist, als vielmehr eine ununterbrochene vollständige Rundung hat. Eine Abbildung endlich einer Bastardmuschel, die Argenville, Walch, Bourguet, und Herr André unter die Bohrmuscheln, das ist Terebrateln, verweisen, der letzte auch in seinen Briefen aus der Schweiz ausdrücklich Anomiam caput serpentis Linnæi nennt (Vide Tab. 1. Fig. b. et c.), und die vielleicht von der wahren Linné'schen Anomia Terebratula bloß dadurch unterschieden ist, daß sie der Länge nach fein gestrichet, indem die letztere glatt, und ohne alle, noch so feine, Striche ist.

Meine, sie sey nun die wahre Anomia truncata L., wie ich glaube, oder eine Linné selbst unbekante (denn darüber werde ich mit niemandem streiten). habe ich erstlich auf dem Mutterkalkstein der Isis nobilis L., dann wieder, sammt der gleich zu beschreibenden andern Anomia, auf dem hier (2. 2.) abgebildeten kleinen Trumm eines Puncoralls, gefunden, den zwar im erstem Theile seiner adriatischen Meerpflanzgen (S. 8. Tab. 1. N. 3.) Graf Sinnaniti, und nach seiner Aussage, auch Graf Marfigli, Madrepora, das ist, einen Stencorall nennen, der aber in der That ein wahrer Puncorall, und zwar Linné's Millepora truncata ist. Niemand hat ihn meines Wissens seither gründlicher und treffender, als unter dem Namen Myriozoos, Donati (Essai sur l'hist. de la Mer Adriat. p. 52. T. 8. beschrieben. Ich besitze davon eine Menge der schönsten Stücke, alle von der dalmatinischen Küste bey Ragusa; dessen ohngeachtet habe ich bloß das elende Kleine malen lassen, vorzüglich wegen der darauf noch aufhängenden gemeldeten Bastardmuscheln. Seine Beschreibung ist folgende: Millepora caulecens, erecta, laevis, multiplicato-dichotoma, ramosissima: ramis breviusculis, teretibus, diffusis, undique poris in quincuncem ordinatis; operculatisque pertusis; extimi apice crassescens, truncatis, obtusissime convexiusculis. Er ist gemeinlich mit einem seichten Glanz überzogen, und wenn man ihn schon bläueln von bleich rosenrother Farbe gesehen hat, (so wie seines gleichen mehr andere), so ist doch überhaupt seine natürliche Farbe weiß, weißlichgrau, oder wie Elfenbein, weißgelblich, und geht zuletzt ins Bräunliche über. Wird er frisch aus dem Meere geholt, so ist auf demselben oft keine Spur der gewöhnlichen Wucherungen wahrzunehmen, so, daß man ihn leicht verkennen könnte. Dieß rührt indessen, wie bey seines gleichen Mehrern, bloß daher, daß an seines Polypen trichterförmigem Kopfe unterhalb, mittelst zweier haarförmiger Fäden, ein kleiner runderhakenartiger Deckel besetzt ist, der, wenn sich die Polypen in ihre walzenförmigen oder



verkehrt, ovalen Fächerchen zurückziehen, die Mundöffnung derselben vollkommen zuschließt, und nur bey ihrem Absterben ausser dem Wasser wegfällt. Dieser Umstand, und weil bey dem Corallenfange gemeinlich verschiedene Aeste weggebrochen werden, (wo denn die Bruchstelle *s. s. s.* gegenwärtiges *Punctocoralls* sternförmig gestrichet ist,) sind hauptsächlich die Ursache, daß man ihn für einen *Sternecorall* angesehen hat. In je mehr Aeste er sich übrigens über seinem kurzen Hauptstamme zertheilet, desto richtiger trifft des Herrn Pallas Anmerkung de *angulis dichotomiarum recto majoribus* ein; aber das gilt von den äußersten Aesten nicht, die oft einen ziemlich spitzen Winkel einschließen. Allemal fand ich auf verschiedenen Stücken dieses *Punctocoralls* verschiedene andere theils Zoophyten, theils Schalthiere aufsitzen, die ich bey einer andern Gelegenheit, nach der Natur gemalt, heraus geben werde; für diesesmal will ich mich bloß mit Anzeige derer begnügen, die wir hier bey (*x. x.*) und wieder bey (*a. a. a.*) sehen. Ich gestehe es, daß ich anfangs, so wie Linné, Tournefort, die kleinen zinnoberrothen Höcker und Stämmchen (*a. a.*), an denen freylich die spitzen Aeste bereits abgebrochen waren, für eben so viele aufkeimende junge *Isides nobiles* gehalten habe; da ich sie aber nachher öfters auf allerhand andern Thierpflanzen, und zwar sammt ihren Aesten, gesehen, und mir über dem das Vergrößerungsglas die allerfeinsten Löcherchen, womit sie allenthalben durchstochen sind, deutlich zu erkennen gab, so zweifelte ich nicht mehr, daß sie die wahre *Millepora miniacea* Pallas. seyn. Sie sind niemals (wie doch die *Isis*) gestrichet, haben auch nie einen knorplichten rindenförmigen Ueberzug; ihre Farbe ist jederzeit durch und durch roth, nur mit dem Unterschiede, daß sie bisweilen Blut, oder auch Zinnoberroth ist, bisweilen hingegen bleich rosenfarbig, oder wie der Pallas, in welchem Falle sie dann auch an ihren Aesten halbdurchsichtig sind. Selten sind der gabelförmigen Aeste mehr, als drey Abtheilungen; der, eine, oder zwey Linien hohe, und kaum eine halbe, dicke Stamm theilt sich an seinem Ende gabelförmig, und ein jedes der Aeste, noch ein- oder ein paar-mal, gleichermäßen gabelförmig, in sehr kurze, zarte, und fein zugespitzte Nebenzäste, und das ist Alles.

Eines ganz andern Geschlechtes ist hingegen das Seeproduct bey (*x. x.*), wenn es gleich der unvergleichliche Pallas unter die *Punctocorallen*, als eine Nebenart oder Abänderung seiner *Millepora liliacea*, gesetzt hat. Allein, da bitte ich ihn, daß er mirs nicht verarge, wenn ich einer andern Meynung bin. Es ist daselbe die wahre *Cellepora verrucosa* Linnæi, ganz unterschieden von desselben *Tubipora serpente*, das ist, von Ellisens *Elchara millepora minima* &c. (p. 81. N. 6. Tab. 27. Fig. E. c. N. 3.), und gehöret folglich unter Pallasens *Elcharas*, ist jedoch nicht desselben *annularis*, wie Linne zweifelhaft vermuthet; nein, sondern eine eigene besondere Art, davon ich unter meinen Zoophyten eine genauere, nach dem Mikroskop

verset,

verfertigte Abbildung geben werde, und die ich bis dahin etwa so schildern, und beschreiben kann: Glomer hemisphaerico-pulvinatus, scissilis, albus, opacus, dimidiis circiter pisi magnitudine; e cellulis ovatis, concentrice glomeratis, compositus; osculis cellularum stragulatis, circularibus, integris, margine exstantibus. So habe ich ihn (diesen Zellen, oder Rindencorall) hier halb abgemäzt so, aber viel vollständiger, und sehr häufig, auf dem Poro cervino Auctorum, Bonanni (einer Millepora, die Linne nicht recht mit der Flustra foliacea vermengt hat) angetroffen. Zufälligerweise kann es indessen geschehen, ut eroso demum margine, oscula cellularum subtridentata videantur. Noch muß ich hier einer besonders merkwürdigen Dactylodius Erwähnung thun, die mit auf unserem Puncorall je herum geirret, und zuletzt, wie bey (Z. 2.) dann bey (A. 2.) zu sehen ist, das Unglück hatte, feste auf demselben sitzen zu bleiben. Freylich scheinen dergleichen Sächelchen nicht allerdings hieher zu gehören, und man bringt sie auch gewiß nicht aus eiler und jugendlicher Unwissenheit herein; da sie aber schon einmal da sind, soll man sie auch mit Füßen wegstoßen? Ich nenne sie indessen *Anomiam cordatam*, weil sie die Gestalt eines umgekehrten Herzens hat, werde mich aber sehr freuen, wenn mich jemand belehren will, ob? und welche sie bey Linne seyn könne? Aller angewandten Mühe obgeachtet, konnte ich sie seither in demselben nicht finden. Gemein ist ihr mit der vorigen *Anom. truncata* L. die Eigenschaft, daß die obere Klappe hinterwärts, etwas länger, als die untere, hervortragt, und unterhalb vom Schlosse bis herab zur äußersten Spitze des Angels schief abgeschnitten ist; endlich quod foramen (π.) valvulae ejusdem, sub nate, testam ingrediens, tendinem cardinis perumpat; übrigen aber ist sie von derselben gänzlich unterschieden, wie aus ihrer Beschreibung abzunehmen ist: *Anom. testa parva obcordata albida laevi subdiaphana, utrinque convexiuscula, dorso medio prope apicem longitudinaliter non nihil introlabente, bivalvi, subaequalvi: valvula nempe superiore ultra inferiorem nate, subtus oblique truncata, procurrente, et perforata, foramine cardinis tendinem perumpente; inferiore ad cardinem truncata, ac medio emarginata. Haec intus in parte concava, prope cardinem, utrinque dente laterali planiusculo, et simplice alio subulato, erecto, ultra disci centrum, paullo sub emarginatura edentuli marginis, instructa est. Viel häufiger, als auf diesem Puncorall, habe ich sie sonst auf dem Muttersteine der sogenannten rothen Corallen, und zumal sammt der *Tubularia fistulosa* L. und verschiedenen Corallinen (*Sertularia*) auf der *Millepora cervicorni* Pallas. gefunden.*

Die Fünfte Figur.

Wir haben den Kalkstein vor Augen, der allenthalben in sehr großen Trümmern und Scherben auf dem Sonnen- und Schelmerberge des Hübnergebirgs anzutreffen ist, so in der Gegend von Althofen, Euxaring, Wieting, Silberegg und Eberstein gewöhnlich



de vor dem Hauptgebürge, das von Tyrol her durch Kärnthen nach der Steyer, marke hin, fortzieht, in spätern Jahrhunderten aufgesetzt worden ist, und wechsels weise aus Schichten theils von weißem, gleichförmigderdem, spät aufbrausens dem, dann bläulich aschenfarbenem, dichtem Kalkstein, der im Bruche fein schüm mernd ist, theils vom gelbem größern Perlensand (Arenaria boraria Wall.) von glän zigen Steinfohlen (Bit Litanthrax ligneus splendens. Wall.) von weißgelblichem schieferartigem Steinmergel (Marga tophacea albide flavens Wall.) von Strusand (Arenaria saxosa Wall.) von weißem, gelblichem, gesättigt rothem, auch mit weiß gelb- und rothmarmorirtem Bolus (Argilla Bolus. W.) endlich von weißem feinerem Perlensand, der mit Kalkschellen gemischt ist, und aufbrauset u. besteht. Das Inzwoi schen auch die spätere Fißgebürg, das sich hin zum Hauptgebürge zuschiebt, und an dasselbe anschließt, auf einem ältern Gesteine ruhen müsse, scheint nicht bezweifelt wer den zu können, da desselben tiefere Gräben, insonderheit der sogenannte kirchberger Graben, Trümmer vom Alpengestein (Sax. molare granatin. W.) Gestein (Sax. fornacum W.) und vor allen, einzelne, bis zur Fäuste große, auch fast eine gute Spanne lange Granaten (Granatus crystallatus vulgaris ruber, figura dodecaedrica ex rhombis duodecim, angulisque solidis quatuordecim composita, cortice stea titico cæruleo-virescente obductus. Wall.) in Menge heget. Nun auf unsern Kalk stein zurück zu kommen, so ist dieser sehr hart, gleichförmigderb von unfühlbaren Schel len, im Bruche matt, entweder von schmutzig weißer, oder aus dem weißen ins gelbliche mehr oder weniger fallender Farbe, und läßt sich schleifen und poliren, wie man zum Theile (Fig. 5.) ben. sehen kann. Den Sonnenberg hinab gegen Gutaring zu, sind beiderseits längst der Straffe die großen Wegmarksteine von dies sem Kalkstein gesetzt worden. Ich fand ihrer mehrere mit einer bis zweien Finger di cken harten Steinrinde von schmutzig weißlichem durchscheinendem Kalkspat überzogen, und schlug davon das Stück herab, so hier (Fig. 5.) ben. vorgestellt wird. Wen de der Kalkstein, und die Kalkspatsteinrinde, sind mit einer unaussprechlichen Menge von verloren gegangenen? oder nur noch in dem Abgrunde der Meerre sich aufhalten den, in Kärnthen aber seit Jahrhunderten zurückgebliebenen, und bereits versteinern ten, theils Nadreporen, theils Milleporen gefüllt, mit eben denselben nämlich, die in einer noch viel mehr unaussprechlich größern Menge einzeln, und los auf allen merglichten, und deßhalben sehr fruchtbaren Aekern, Wiesen, und Hügeln dieser ganzen Gegend gefunden werden, und die der Vöbel, der überall Vöbel ist, in Kraft eines lächerlichen Märchens, für steinerne Linsen hält, die an einem Sonntage sollen ausgefäet, und zur Strafe des zu feyrenden, aber verletzten Tages zu Stein gewor den seyn. Schon der gelehrte vormalige Vorsteher der gräzerischen Sternwarte, Nicolaus Poda, hat es eingesehen, (© d. select. ex Amœnit. acad. Linnæan. dissert. in addit. Biwald. pag. 174.) so, wie längstens vor ihm die schwedischen Wäner der

Erstschicht

Geschichte der Natur, Linné, und Wallerius, daß diese vermeinten Linse wahre Lithophyten je gewesen, und theils von sehr kleinen, so genannten Polypen (Hydra) theils von Quallen (Medusa) aufgebaut worden sind. Dessen ohngeachtet hält sie noch Walch, und sein Anhang, für Heliciten, Phaciten u. eine Art vielkammeriger Schnecken, deren wahres Original (wie er wähnet) im Muschelsande von Rimini, Sicilien, auch von Cambril und der Küste Istriens u. entdeckt worden, und kurz, der Nautilus Beccarii Linnæi ist. Allein, diese Meinung (ich sage es, ohne die Hochachtung gegen die vielen Verdienste eines sonst so großen Gelehrten zu verlieren,) ist im Grunde falsch. Kann das Schiffsboot (Nautilus) ein Original der Schnirkelschnecke (Helix) seyn? Ich will indessen gelten lassen, daß Helicite, ob schon nur willkürlich, für eine Art der kleinen Schiffsboote hier genommen werde. Wie kann ein noch so kleines, ja mikroskopisches, und doch mit vielen Kammern, und einer Nervenröhre versehenes Schiffsboot, das Original seyn eines See- thieres, das weder eine Nervenröhre (Siphonem communicantem), noch mehrere in einander gehende Kammern hat? das zwar mehrere Zellen, Adhren, oder wie sie sonst heißen mögen, besammen hat, aber einzelne, und derer jede ihre eigene Bewohner hat? mit einem Worte, das kein Schiffsboot, nicht einmal ein Schaalthier, sondern ein Lithophyt, und noch überdem ein Lithophyt von verschiednem Geschlecht, und verschiedner Art ist?

Eben dieselben Lithophyten, die wir bey a. im Kalkstein, und bey b. im Kalkspat eingeschlossen sehen, eben dieselben, sage ich, finden wir einzeln, und los, in einer mit Mergel gemischten Erde, auf allen Aeckern bey Gutarung in Menge; und, was das merkwürdigste ist, im Kalkstein zu Kalkstein, im Kalkspat zu Kalkspat, im Mergel zu verhärtetem Mergel versteinert. Ich habe sie einzeln, ein jedes in seiner natürlichen Größe, Gestalt und Farbe bey z. z. 3. malen lassen, und werde sie nun, ein jedes insonderheit, auf das genaueste beschreiben, damit, wenn ich nicht so glücklich seyn soll, ihre ganze Geschichte vollkommen zu entwickeln, andere Gelehrte wenigstens, bey denen hierinnen heitrerer Tag, als bey mir ist, im Stande seyn, alles zuletzt in Richtigkeit zu bringen.

- z. Helmintholithus Madreporæ lentiformis: deperditæ? an adhucdum uspiam existentis. Varietas subalterna Helmintholithi Madreporæ Linnæi p. 267. N. 14. ab eodem non recensita. Corallum Porpitæ rotundi, utrinque convexi, integri, striati. Wall. T. 2. p. 437. N. 9. lit. a. Cochlitæ Helicites rotundus utrinque convexus striatus Waller. T. 9. p. 484. lit. a.

Dieser versteinerte Sterncorall hat vollkommen die Gestalt einer Linse, nur daß er zwey, bis dreymal größer und stärker ist: beyderseits runderhaben, am Rande



de allenthalben ganz, und ungekerbt; ohne Nabelgrübchen ober, oder unterhalb; und mit vielen aus dem Mittelpunkte krumm gegen den äußersten Umriss laufenden feinen Strichen benderseits bezeichnet. Diese vermeinten Striche, die oft, wegen des anstehenden erdigen Schmutzes, wenig oder gar nicht zu sehen sind, sind in der That selbst nichts als organische Theile der Seewürmer, die den Corall nach und nach ganz aufgebauet haben. Der Corall besteht nämlich aus lauter übereinander zwiebelartig liegenden, sich aber unmittelbar nicht berührenden, jedoch an der allgem. meinen, durch beyde Wirbel gehenden Achse hangenden, halbfuglichten, oberhalb runderhabenen, feinen, steinharten Blättern, die alle auf der obern Seite, vom Mittelpunkte aus gegen den äußersten Umriss, mit krummen spirallartigen eingedrückt-furchen ausge schnitten sind. Wir sehen dieß klar und unwiderprechlich bey μ , wo der Kalkstein, und mit dem Kalksteine die in denselben eingeschlossnen, linsenförmigen Sterncorallen, zu zerfallen, und zu verwittern bereits angefangen haben; und eben so klar müssen wir dieß schon aus dem bloßen durch die beyden Wirbel senkrecht geführten Durchschnitte derselben sehen, der (wie bey α u. s. s. ohngefähr vor-
gestellt wird) die Gestalt eines lanzettförmigen Blattes eines kleinen Weiden- oder Felsenbaums hat, und an welchem sich allezeit die beyderseits von beyden Wirbeln gleich abstehenden Blätter in eine länglicht ovale Figur vereinigen. Woraus wir denn die allmächtige Weisheit des Schöpfers, in der Kunst der Qualle (Medusa) sich ihr Gehäuse aufzubauen, nie genug bewundern können. Ich stelle mir den ganzen Bau dieses Sterncoralls ohngefähr so vor: das Ey des Seewurms hat eine kreisrunde, unterhalb rundhohle, oberhalb aber mit spiralkrummen Einschnitten (die ihr ein sternförmiges Ansehen geben) bezeichnete Qualle ausgebrütet; diese hat einen kalkigen Saft ausgeschwitzt, der sich verhärtet hat; auf den hat wieder dieselbe, noch vor ihrem Tode und Verhärtung, im Mittelpunkte ein anders Ey gelegt, das wieder eine neue etwas größere Qualle ausgebrütet hat, und so immer weiter u. Dieß sind nicht erst meine Gedanken. Sie sind die Gedanken aller Derer, die die Stein-, und Horncoralle zu dem Thierreiche verwiesen haben; und die ich nur aus dem verdienstvollen Statius Müller ganz heraus geschrieben habe. Führt man nun den Durchschnitt senkrecht auf den Durchmesser, das ist auf die Spindel, die durch die beyden Wirbel geht, und folglich parallel in gleichlaufender Richtung mit dem mittlern und größten flachen Zirkel des linsencoralls, so hat man (bis auf die Nervencöhre) die gängliche Zeichnung des Nautilus Beccarii L. vor Augen, wie bey α zu sehen ist. Die Ursache liegt am Tage. Die halbfuglichten, unterhalb rundhohlen, und mit spiralkrummen concentrischen Furchen bezeichneten Blätter, liegen, wie die Schalen einer Zwiebel, vom Mittelpunkte des Coralls bis zum Ende der Achse hinauf, übereinander; die Außern bedecken stets und ganz die Innern, folglich schneidet der Durchschnitt von einem jeden Blatte im ganzen Umriffe eine kleine Lunulam, das
ist

ist, einen kleinen mondförmigen Theil weg. Kann man noch diese linsenförmigen versteinerten Geißhöfe für Nautiliten oder Heliciten halten? Ich will hier nicht einmal rügen, daß, wenn man ja aus diesen versteinerten so genannten Linsen einen Nautilus hat heraus drehen wollen, man allezeit eher auf den Nautilus crispus L., als auf den Beccarii, hätte verfallen sollen. Allein es kanns auch der nicht seyn.

C. Helmintholithus Milleporæ umbilicata: deperditæ? an adhuc uspiam existens? Varietas Helmintholithi Milleporæ Linnæi p. 167. N. 13. ab eodem non recensita.

Madrepora simplex orbicularis utrinque plana stellata. Poda Additam, ad Corallia Baltica p. 176. N. 11.

Gemeinlich wird dieser versteinerte Punctcorall mit dem vorigen Sterncorall vermengt, und beide so, wie der bald zu beschreibende, ganz unfüglich für eine seltnerne Linse gehalten. Indessen ist er von dem vorigen nicht allein der Art nach, sondern auch selbst dem Geschlechte nach sehr unterschieden. Viel niedriger, und einigermaßen auch zusammengebrückt, ist er dennoch nichts weniger, als platt und flach, sondern beyderseits wieder runderhaben, doch mit einem ziemlich großen, tief eingedrückt Nabelgrübchen an beyden Wirbeln versehen. Uebrigens sieht man (oft nur durchs Vergrößerungsglas) beyderseits an ihm nichts, als sehr kleine, nur so gar wenig hervorstehende weiße Drüsen (papillas), die in concentrische Ritzel eingeheilft zu seyn scheinen. Mit einer feinen Feile habe ich ihn in die Quere (parallele ad planum circuli maximi) geöffnet; der Durchschnitt war allezeit eine zirkelrunde Scheibe mit einer eingeschriebenen Spirallinie, die mit mehr oder weniger, näher zusammengebrängten oder weiter von einander abstehenden Punkten durchstochen war, wie man dieß bey 1. 1. 1. deutlich, oder durchs Mikroskop wenigstens, sehen kann. Geschiehe hingegen der Durchschnitt durch beyde nabelförmige Wirbel, so stellte er, wie bey 2. 2. zu sehen ist, ein sehr schmales längliches Oval vor, das beyderseits in der Mitte ausgerückt, oder höhllich eingedrückt, und der ganzen Länge nach, mit einer einzelnen Reihe dreyeckig mondförmiger Punkte bezeichnet war. Hieraus schloß ich denn natürlicherweise ganz gründlich auf seinen innern Bau und Zusammensetzung; indem ich mir beyderseits eine aufrechtstehende, in einen Schnitzel (etwa wie eine freyhängende Schneckenflüge) fortlaufende, schmale Wand vorstellte, die von der untersten Tiefe des Nabelgrübchens ausgeht, in ihrem Laufe allezeit an Höhe zunimmt, bis sie die Höhe des Coralls erreicht, dann wieder, tamquam in puncto flexus contrarii, niedriger und niedriger wird, bis sie am äußersten Umkreise der mittlern Zirkelscheibe (in periphæria plani circuli maximi), als dem untersten Orte, wieder ausgeht und verschwindet. Senkrecht auf diese Mittelscheibe, und hart an die aufrechtstehende Spirallwand angeschlossen, doch nach dem Laufe derselben, stehen die sel-



nen Haarröhren der Polypen, je nachdem ihrer mehr oder weniger sind, gedrängter beisammen, oder weiter auseinander. Die ganze Dicke dieses Punctcoralls, zumal von einem Nabel zum andern, beträgt kaum eine Linie pariser Maasses; die Röhren hingegen kann man in Wahrheit Haarröhren nennen, so unbedeutend ist der Durchmesser derselben, und sie schließen sich noch überdem ganz hart an die Spiralwand an; daher verschwinden sie allezeit auf dem wirbelreichen Durchschnitte u. s. (in plano sectionis verticalis per polos umbilicales) indem man bloß durch das Vergrößerungsglas an dem äußern Rande der dreieckig mondförmigen Zeichnungen die Hälfte ihrer haarmäßigen Dicke sehen kann. Da endlich dieser Punctcorall nicht so, wie der vorige Sterncorall, beiderseits runderhaben, sondern vielmehr beiderseits in der Mitte rundhohl ist, so können sich die beiderseitigen bogenförmigen Krümmungen, als die Merkmale der Spiralwand, nie auf dem senkrechten Durchschnitt desselben in längliche concentrische Ovale, wie bei u. s., schließen; sondern es müssen bloß die entgegengesetzten Enden eines jeden Ovals, in Gestalt eines dreieckig mondförmigen Bogens, zu sehen seyn; und der, unter den andern allezeit der größte, wo der Punctcorall (in der mittlern Entfernung zwischen dem Mittelpunkte, und dem äußersten Umrteisse) am dicksten ist. Ich glaube es sey nun genugsam erwiesen, daß auch diese vermeinte Steinlinse weder ein Nautilit, noch ein Helicit seyn könne; und daß am allerwenigsten der Nautilus Beccarii L. ihr wahres Original sey. Wie wäre es aber, wenn das wahre Original dieses versteinerten Punctcoralls die Madrepora Verrucaria Linnæi wäre? Ich will dieses ex Tripode nicht behaupten, und überlaß es gerne denen zu entscheiden, die hierinnen mehr Einsicht, als ich mit zutraue, besitzen; ohne ihre guten Gründe möchte indessen diese Meinung vielleicht dennoch nicht seyn. Linné selbst scheint im Zweifel gestanden zu haben, ob er sie ne Madrepora Verrucaria unter die Tubiporas oder Milleporas u. verweisen sollte.

§. Helmintholithus Milleporæ lentiformis: deperditæ? an uspiam in abyssarium adhuc existentis? utrinque convexus; tubis rectis in spiram ordinatis, ut in priore. Varietas subalterna Helmintholithi Milleporæ Linnæi p. 167. N. 15 ab eodem non recensita.

Größer, auch viel höher, oder bauchiger, als die beiden ist beschriebenen, ist dieser versteinerte Punctcorall (so viel ich derer gesehen habe), von schwarzbrauner Farbe, fein porist, mit einem wenigen Glanze, von unfühlbaren Theilchen; und bisweilen mit keinen sichtlich, bisweilen mit ziemlich sparsam zerstreuten, endlich bisweilen mit einer großen Menge zusammengehäufter, sehr kleiner, weißer, doch weder eingedrückter, noch hervorragender Punkte, ober- und unterhalb gleichsam besät. Gemein mit dem Erstern hat er die Eigenschaft, daß er beiderseits runderhaben, und vollkommen linsenförmig ist; hingegen kommt er mit dem letztern darinnen übere.

überein, daß er beiderseits eine aufrecht stehende Spiralswand, mit hart an dieselbe angeschlossenen und senkrechten Haarröhren, besitzt. Indessen ist doch seine Spiralswand von der des ihm gemeldeten darinnen unterschieden, daß sie nicht vom Mittelpunkte aus, als dem niedrigsten Orte, höher und höher aufsteigt, bis sie wieder mehr und mehr, bis zum äußersten Umkreise der Mittelscheibe, an Höhe abnimmt; sondern gerade im Gegentheil, im Mittelpunkte am höchsten ist, und dann fort und fort, bis zur mittlern Zirkelscheibe niedriger, und niedriger wird. Ich stelle mir sie vor, wie eine in einer hohlen Kugel eingeschlossene, und dieselbe ausfüllende Spiralfeder, die sich um den Durchmesser derselben, als um die Spindel, herum windet, und folglich, je mehr und mehr sie sich vom Mittelpunkte beiderseits entfernt, desto mehr und mehr zugleich beiderseits an ihrer Höhe abnimmt. Hieraus entsteht denn ganz natürlich, daß der wirtelrechte Durchschnitt dieses Punctcoralls allezeit, wie bey dem linsenförmigen Sternecorall (s. s. s.), geben müsse eine Ellipsin cum inscriptis ellipticibus concentricis tot, quot spiræ circa minorem conjugatorum axium revolutiones sunt; seu quoties spiralis paries maiorem intersecat axem: der waagrechte hingegen, so, wie bey dem vorigen, beiderseits genabelten Punctcorall (s. s. s.), eine zirkelförmige Scheibe mit einer eingeschriebenen Spirallinie vorstellen müsse, an deren äußerem Rande die Mündungen der Haarröhre deutlicher, oder nicht so deutlich zu sehen sind.

- x. Helmintholithus Medusæ orbicularis? deperditæ? an uspiam existentis adhuc? Corallum Porpitæ rotundi; ab una parte convexi, ab altera plani. Wallerius.
 Helmintholithus Nautilli numalis, testis majoribus planis. &c. Born. T. 2. p. 28.
 Lapis Numismalis, aliis Helicites, aut Phacites. Gmelin. T. 4. p. 64. lit. c. Tab. 17. fig. 201.
 Helicites, sive Phacites, aut Lapis numularius. Walch. T. 1. p. 140. Tab. 8. N. 3.

Niemand, hoffe ich, wird mir verargen, daß ich diese Versteinerung, (davon Gmelin am angeführten Orte eine Abbildung der untern Seite giebt, die mit meinem Stücke vollkommen übereinkömmt,) nicht anders, als frageweise unter dem Namen einer versteinerten tellerförmigen Qualle vorgestellt habe. Man sieht schon aus den Citaten, wie verschiedentlich von derselben größere Mineralogen, als ich bin, gedacht haben. Wenn ich schon gleichsam mehr als versichert für mich selbst bin, daß sie eine wahre Qualle, das ist, Meduse, gewesen sey; und überdem kaum zweifle, daß Linneüs Madrepora simplex orbicularis, plana, stella convexa. Fig. V. lit. a. et b. (Vide Corallia Baltica ab Henrico Fougt edita.) eine und eben dieselbe (nur die Größe ausgenommen) mit der Meinigen seyn müsse; so hat mich denn noch das Beispiel eben desselben großen Mannes, (dem niemand die größten Einsich-



ten in der Geschichte der Natur absprechen kann; der, so viel er auch geschrieben hat, alles mit der reifsten Ueberlegung, und einem Meisterverstände geschrieben hat; und kurz, der bey mir wenigstens allezeit, vom ersten, und größten Bewichte ist;) kühnere Beispiel, sage ich, hat mich etwas schüchtern gemacht, nicht zu dreiste darin-
nen zu seyn, wo er selbst nicht anders, als zweifel- und frageweise spricht. So be-
kann es ist, daß er den sogenannten Lapidem Numismalem als die zwote Abände-
rung seines versteinerten Stenocoralls vorgestellt hat; eben so wissen wir, daß, wo er
nachher immer desselben gedacht hat; sters hinzugelegt habe: an *Medusa Porpita pe-*
trincata? Er stand also bloß im Zweifel: nicht ob derselbe ein versteinertes Schaalstier-
sen; sondern ob man denselben füglich unter die versteinerten weichen und mit Stie-
massen versehenen Seewürmer (*Mollusca*), als unter die versteinerten Lithophyten ver-
weisen sollte? Dem sey nun, wie ihm wolle; was ich davon weiß, und meine un-
maßgebliche Meinung, werde ich hier getreu und genau vorbringen; die obllige Ent-
scheidung des Streits hingegen, so wie kind, Andern überlassen. In der öfters schon
gemeldeten Gegend von Sutaring wird dieser Pfenningsstein, sammt den so genann-
ten Liniensteinen, beyh Umacern häufig gefunden. Der Größe nach giebt es solche,
die einem kaiserlichen Groschen, Zehner, auch einem Conventions Zwanziger, und
darüber ic. gleichen. Sie scheinen beyderseits ganz platt zu seyn, gemeinlich aber,
wie ein kaiserliches Sieben, oder Siebenzehnerstück, etwas gekrümmte, und eingebog-
gen. Sieht man sie indessen genauer an, so nimmt man doch wahr, daß sie auf einer
(der untern) Seite platt; auf der andern hingegen (zwar sehr schwach) runderha-
ben sind. Ihre Farbe ist bald mehr oder weniger schmutzig weiß, bald grau, horn-
artig, oder wie die der lichtern Flintensteine; je nachdem sie mit mehrern erdigen
Schmutze überzogen sind, oder die durchscheinende Kalkspatrinde, mit der sie hier
überhaupt von beyden Seiten umhüllt sind, hervorzieht. Wenn ich ist nur noch
hinzu setze, daß sie matt, und undurchsichtig, oder, im letztern Falle, an den
Kanten durchscheinend sind, so ist an ihnen äußerlich gar nichts mehr zu sehen. Dem
gekräftigen Fasne der Zelt, so Stein sie auch sind, können sie inzwischen so wenig,
als andere Dinge trogen; und wir sehen sie daher öfters beyderseits eben so hie und
da angekreffen, wie ein wurmfressiges Holz; vermuthlich durch die Vermitterung unter
der Erde. Dieser Umstand war mir günstig; und ich sah dadurch an der untern
Seite gegen den äußersten Umlkreis zu, gerade wie auf der gemelinischen Figur 201.
viele bogenartige, sehr gedrängt concentrische, und tief eingeschnittene Striche; nd
wieder andere dergleichen, die vom Umlkreis gegen den Mittelpunkt hin, aber nicht
gerade, sondern bogenweise, liefen; so daß dadurch der Pfenningsstein dafelbst ein
schief nezförmiges Gewebe anzeigte. Aufgemuncert hiedurch, und sehnsuchtsvoll zu
wissen, wie diese concentrische Bogen, und die dieselben nach der Quere durchkreu-
zenden bogenförmigen Strahlen um dem Mittelpunkte der ganzen Scheibe selbst be-
schaffen



schaffen wären? ergriff ich eine feine scharfe Feile; und feilte damit beyderseits so lange, (doch viel länger auf der obern Seite,) bis ich auf die Innersten Kreise kam. Nun sahe ich, erstens: daß sie keine concentrischen Zirkel, sondern spirale, aber doch rundspirale, nicht wie bey der *Urtica marina* *Veilla Fabii* Columnæ, länglich eysförmige Krümmungen seyn; die oberhalb nicht, aber wohl unterhalb, sein eingesehnitten sind, und so gedrängt beysammen, daß man ihrer vom Umkreise bis zum Mittelpunkte zu dreyßig, und im ganzen Durchmesser bey sechsßig zählen konnte; zweitens, daß die krummen Querstiche nicht bis zum Mittelpunkte hin langten; drittens, daß, nachdem ich schon von der obern Seite so viel weggenommen hatte, daß bereits auch auf derselben die spiralen Krümmungen um und um sichtbar wurden, die innersten bey dem Mittelpunkte selbst noch nicht erschienen; folglich, daß, wenn gleich der obere Theil sehr stumpf runderhaben ist, der Wirtel jedoch selbst ein wenig eingedrückt, und genabelt seyn müsse. Weil ich denn aus dieser Qualle weder die *Medusam* *Porpitam* L. noch eine *Veilellam* so ganz mit aller Gewißheit heraus bringen konnte, von den übrigen sinnlichen aber gar keine sich dazu schicken wollte: so nannte ich sie, wegen ihrer äußerlichen Gestalt, die tellerförmige, und stellte mir sie ohngefähr so vor: *Medusa orbicularis, supra plana, obtusissime convexiuscula, nuda, lævis; centro umbilicato; subtus plana, sulco rotundæ spirali inciso, revolutionibus stipate confertis plurimis; radiisque oblique arcuatis, impressis, decussantibus, marginalibus, ore centrali dehiscente.* Vielleicht—aber freylich nur vielleicht—hiengen einst von den äußersten Ringen des Umkreises dieses roth, oder gallertartigen Seewurms, wo die schief gebogenen Querstiche zu sehen sind, eine Menge langer und runder fleischiger Frangen, Härte, Fühler, Tasten, Haare, oder wie man diese, den Quallen sehr natürliche Theile, noch sonst heißen kann? — Und diese sind nun meine zufälligen Gedanken von dieser Art Qualle. Weder stolz, noch sehr eigensinnig darauf, überlasse ich dieselben mit ganz kaltem Blute meinen geehrtesten Lesern zur fernern reifen Prüfung.

a. Ohnmöglich konnte ich seither mit dieser Verfeinerung zurechte kommen. In Menge wird sie zugleich mit den vorerwähnten Insektsteinen ausgegraben. Sie ist, wie ihre Figur anzeigt, tellerförmig, in der Rundung ihres Umkreises ganz; nicht dicker, als etwa ein gedoppeltes stärkeres Papier; unten und oben platt; aber auch unten, und oben, gerade im Mittelpunkte, mit einer kleinen hervorragenden Drüse, oder Warze (*papilla mamillari*) versehen: für sich von kalkspatartiger Natur, und durchscheinend; außerhalb jedoch stets mit staubigem, lichtgelblichem Mergel beschmutzt, und daher matt, und undurchsichtig, auch ohne alle merckliche Zeichnungen. Ich habe sie von allen Seiten an- und abgeschliffen; sie war aber allenthalben von gleichförmigertem Gefüge, und unsichtbaren Theilchen, und ich trachtete vergeblich



lich, nur die mindeste Spur einiger Ritzel, Striche, Röhren, Sterne, oder Poren zu erblicken. Sollte sie nicht etwa gar ein bloßer Deckel des genabelten Sternencoralls, oder sonst irgend einer Schnecke seyn? — Der gemeine Mann zählt sie mit zu den versteinerten Linfen.

Die Sechste Figur.

Unwidersprechlich, dünkt mich, beweiset der mit lithophyten gefüllte Kalkstein von Sutaring, das einstmalige Daseyn des Meeres, vor undenklichen Jahrhunderten nämlich, dessen folglich keine Geschichte Meldung thun kann; zu geschweigen ein Mensch. Eben denselben Satz bekräftiget indessen, und zwar eben so überzeugend, der bereits zu hartem Steine gewordene Mergel dieser Gegend. Wir sehen ihn hier in der sechsten Figur nach der Natur gemalt. Er ist licht aschgrau, nur wo ihn mit Eisenoxyd gefchwängerte Wässer gefärbt haben, mehr oder weniger gelb; so hart klavieren, daß man ihn mit Eisen und Schlegel zerbrechen muß; doch schmilzt er beim Hydrophre für sich selbst zu einer aschgrauen Schlacke. Ein Stück davon warf ich in gutes Scheidewasser; mit Aufwerfung unzähliger Luftblasen, brauete dasselbe so stark auf, daß man das gewaltige Sieden mit dem Ohre hören konnte; dessen ohngeachtet ließ es einen starken Satz zurück, der sich, nachdem ich ihn ausgefüßt, und filtrirt hatte, zwischen den Fingern zwar sehr fein, aber doch spröde zeigte; das Vergrößerungsglas hat mich nachher überführt, daß dieser mit Thon innigst verbundene Kalk, zu gleich sehr stark gemischt sey mit schwarzer Stauberde (*Humus ruralis* L.), mit den allertfeinsten, und feinsten Fliesen von Kagensilber (*Mica laminosa* L.), dann mit weißem, durchsichtigem Quicksand von ungleichen Theilchen (*Arena mobilis* L. a. *Arena inaequalis* Wall.) Dieser Sand ist es auch, der unserm verhärteten Mergel im felsigen Bruche ein feinsandartiges Ansehen giebt, und ihn zuletzt zur Marga arenacea grisea indurata Wallerii macht; das ist, zu dem sandartigen Mergel, der, nach Ausflusse aller verflüchtigen Bestandtheile, so viel zur Fruchtbarkeit eines tiefen, schmerzlichen, nassen, oder doch feuchten Grundes beiträgt; und dem ohnfelsbar die in Kärnthens von ihrer Fruchtbarkeit so berühmten Aecker des Grappfeldes zwischen Wolfsbatt, Althofen, Silberegg, und um Sutaring, dieselbe zu danken haben. In diesem bereits verhärteten Mergel finden wir denn erstaunlich viele, und eben so verschieden versteinerte Schaalstiere, davon viele so klein sind, daß man sie erst mit dem Vergrößerungsglas sehen, und ihr Geschlecht und Art bestimmen kann. Groß oder klein, sind sie allezeit geschlossen, und inwendig mit eben demselben Mergel gefüllt, wodurch denn die genaue systematische Bestimmung bey vielen sehr erschweret wird — und man sie oft nur gleichsam rathselweise heraus bringen muß. Meine Leser werden es bestens entscheiden: ob? und wie sehr partheyisch das Glück (denn freylich muß hier bey der

offnen

offenbaren Ohnmöglichkeit das Schloß, oder die Mündung zu sehen, das Glück das meiste thun, und der Kunst zu Hülfe kommen) meine Mühe, und den angewandten Fleiß in Bestimmung derselben begünstiger habe. So glaube ich erstlich bey a. a. a. eine Dreiecksmuschel, und zwar den sogenannten linnéanischen Keil (*Donax cuneatus* L.) zu sehen. *Helmintholitus Donacis cuneati* L. Die beyden Schaa-
len, oder Klappen sind dreieckig, ungleichseitig, zweymal so lang in die Quere, als sie vom Schlosse bis zum Rande hin sind; sehr dick, von kalkspatartiger Natur, und aus der gelblichten zuletzt ins bräunlichte fallenden Farbe; es sey denn, daß sie ganz, oder zum Theile mit einer seichren, schon ganz verfallten, und daher bereits weißen matten Rinde überzogen sind. Der Angel der Einen steht denn der Andern gerade gegen über, und beyde nähern sich mit einer schwachen Krümmung einander sehr, ohne merklich sich dem Hinterzwinkel mehr als dem Vorderzwinkel zuwenden. Die keilförmige Gestalt kommt dieser Art Dreiecksmuschel mit ungleich größ-
serm Rechte zu, als dem *Donax trunculus*, sive *truncatus* L. denn von dem höch-
sten Buckel der beyden Angel, wo die Muschel am bauchigsten ist, laufen die beyden Schaa-
len sehr stark gegen den ganzen, ungezähnelten äußersten Rand in eine sehr
stark zusammengedrückte Schneide herab. Der Vorderzwinkel ist schief abgestümpft,
viel breiter als der Hinterzwinkel, rund ensfürmig, etwas eingedrückt, doch mit
ein wenig hervorstehender Vorderpalte (*rima*), und woforne er noch mit einer seich-
ren Kalkspatrinde überzogen ist, kann man an demselben die allerfeinsten Striche mit
dem Mikroskop wahrnehmen, die von den Angeln schief in die Quere ausgehen, und
quer über die Oberfläche der beyden Seiten fortsetzen, ohne daß hiedurch die Muschel
nach der Länge oder Quere geribbet, gerunzelt, oder geringelt genennet werden könne,
oder glatt zu seyn aufhöre. Was den Hinterzwinkel (*Anus*) anbelange, so ist derselbe
merklich schmaler, und länger, fast lanzenförmig, und gleicherdings etwas einge-
drückt.

Ganz von der Art beschriebenen unterschieden ist die versteinerete zwey- und dick-
schaalige Muschel bey p. p. Zweymal so breit, als lang, ist sie in die Quere
länglich ensfürmig, oder oval, und nach eben derselben mehr runderhaben, als zu-
sammengedrückt und flach; krumme, aber nicht sehr tiefe Quersstreife laufen mit dem
äußern Rande parallel, und concentrisch über derselben hin, und wenn man sie
mit dem Vergrößerungsglase genau untersucht, so sieht man noch überdem andere
nach der Länge vom Schlosse gegen den Rand hin gezogene seichre Striche. Nachend,
glatt, und von schmutzig gelber, oder auch bräunlichter Farbe ist sie mit gemelmiglich vor-
gekommen; es sey denn daß sie schon ganz verfallt war, denn in diesem Falle war sie ganz
weiß, und matt. Nach Bourguet *Traité des petrifications*, und Walchs *Steinreich*,
konnte sie anders nichts, als ein *Musculit*, das ist, eine Art von dem linnéanischen
Mytilus seyn. Aber, ich nehme die dünnschaalige, sehr zerbrechliche *Entenmiesmuschel*,



mit nacktem Angel, und häutigem Rande, (die es schwerlich seyn wird,) davon aus, welche könnte sie wohl seyn? Ich für meinen Theil wollte schon lieber unter den Klammuscheln die jedermann bekannte Malermuschel (*Mya pictorum*) daraus machen. Zwar (ich bekenne es) war allezeit stärkerer Hang bey mir, dieselbe unter den Tellmuscheln aufzusuchen; ich glaube auch, sie schon wirklich ausfindig gemacht zu haben, als ich des Argenville Tellmuschel, Tab. 21. Fig. I, das ist Vorn's Tellina Gari Tab. 2. Fig. 6. 7. ersah; aber Kumpf! je nun, ich lasse gerne handeln, und mich zuletzt alles belehren, sie soll auch Tellina Gari seyn, doch nur unter dem ausdrücklichen Beding, daß beyde, Vorn und Argenville klar erweisen, daß sie von einer und eben derselben mit Innern, und Kumpfen reden. Bis dahin will ich sie noch pro *Helmintholitho Mya pictorum* L. halten.

Es folget nun bey 2. 2. eine kleine kammartige versteinerte Herzmuschel, die, da ich derer eine Menge natürliche, größere und kleinere, vom adriatischen Meere, die ihr vollkommen gleich sehn, besize, ich mich nicht enthalten kann, für den *Helmintholithus Cardii striati diaphani* anzusehen, dessen Graf Ginanni im 2. Th. S. 30. Meldung thut mit folgenden Worten: *Conca piccolissima bianca, con qualche fascia di color pavonazzo chiaro, erigata à pettine, und auf der zwanzigsten Kupfertafel N. 140. die Figur giebt.* An der versteinerten ist weiter nichts zu sehn, als daß sie ganz verkalft, weiß, stark gewölbt, dann etwas ungleichseitig, nach der Länge gestrichet, und am Rande gezähnet ist. Da nun aber Ginannis Beschreibung nicht so abgefaßt ist, daß man davon einigen Gebrauch hätte machen können, so habe ich die adriatische nach der Natur malen lassen, und gebe hier die ächte vollständige Beschreibung: *Cardium striatum: testa suborbiculato-cordata, gibba, ad anum oblique declivi, bivalvi, aequalvi; valvulis diaphanis subaequilateris (regione an scilicet oblique declivi, et depressa) longitudinaliter striatis, striis viginti aliquot, ad latera tuberculosis, margine crenato-denticulato. Natibus recte inflexis approximatis. Color testæ albus, aut aqueose flavescens, interdum albus, fasciis tenuibus binis ternisve flavicantibus, aut et incarnatis; intus albidus, plica anali flavo rufescente: cardinis dentes de more generis.* Eine verschiedne versteinerte Schnirkelschnecke bekommen wir bey 2. 2. zu sehn, die ich fruchtlos, wiewohl lange, unter den linnéischen suchte. Wir sehn hier nur die eine Seite, die ganz verkalft, und folglich schneeweiß ist; die andere, ob sie erhaben, flach, oder genabelt sey? ist mir selbst unbekant, weil ich mich nicht getrauet habe, dieselbe, ohne sie ganz zu zerbrechen, heraus zu arbeiten. Ich würde sie ohngefähr so beschreiben: *Helmintholithus Helicis submarginalis. Testa anfractibus quatuor supra depressis, complanatis, margine sursum acute carinato, cum stria impressa submarginali, centro nonnihil dehiscente, umbilicato. Apertura suborbiculata. Soll sie wohl gänzlich schon verloren? oder noch irgendwo zu finden seyn?*

Drey

Drenmal wenigstens, wo nicht gar viermal größer und stärker, als in der Natur selbst, wird bey u. u. u. der verkalte, und versteinerte Turbo lacteus, L. vorgestellt. Und wie wäre es auch dem Maser möglich gewesen, denselben in seiner natürlichen Größe, und mit seinen noch genug sichtlich Kennzeichen zu malen, nachdem er sich ohnehin, um ihn nur einsgermassen, und doch noch kenntbar, auszudrücken, des Vergrößerungsglases bedienen mußte? Schon mehr als zwanzig Jahre sind verlaufen, daß ich ihn, sammt andern kleinen Schaalthieren, und Thierpflanzen, als Corallinen (Sertularia), Corallenmoosen (Corallina Opuntia Linnzei) u. s. f. von einem adriatischen Meerischwamme (Spongia. L.) theils ab, und theils gar herausgerissen habe. Ich will hier seine aus meinen Papieren gezogene Beschreibung anführen, und gütlich niederschreiben: Hordei minor grano testa, cancellata, turrita, conico-subulata, laevis, nitens, lactea, nisi super littoris arena in calcem albam opacam a sole excocta sit, etiam diaphana, et transparent; fragilis admodum, utpote tenera et subtilis anfractibus constat quinque, senisve, tectibus, contiguous, per obliquam spiram ab imo ad apicem usque magis magisque attenuatis, atque lucis, alternisve taniis longitudinalibus, non eequidem membranaceis, elevatis tamen et tectibus, conferte stipatis, et anfractuuum dudui contrariis, exaratis. Apertura obovata potius, basique coarctata, quam proprie orbiculata; labro integro; umbilico nullo. Zwar süßet kinn's des Grafen Ginanni Turbo minimo reticolato, sammt der Figur, an; S. Ginan. adriat. Tom. 2, pag. 7. litt. I. Tab. 6. Fig. 55. Aber ich glaube starke Gründe zu haben zu behaupten, daß diese Elation, wie wir denn bald weislauffiger sehen werden, nur zu dem Turbo striatulus L. gehöre. Wie konnte indessen kinn's, oder ein Anderer, mit einer eben so kurzen, als unheimtatschlichen Beschreibung und Figur besser zu Rechte kommen?

77. Schwerlich werde ich mit dieser verfeinerten Schnecke Ehre ma-
 chen; aber niemand soll mir auch wohl glauben, was für (viele, saure Mühe
 und Arbeit) sie mich gekostet habe. Schon ist das ganze unglückliche Geschlecht der
 Rinfhörner (*Buccinum*), oder wie man es sonst heißen mag, nichts als lau-
 tere Verwirrung, wenn es anders nicht der einsichtsvolle und unermüdete Chemnitz in
 Ordnung bringt; dessen ohngeachtet habe ich doch Herz gehabt, mit meiner Verfein-
 erung nach dieser gefährlichen Meeresklippe, die mir nicht unbekannt, und so
 vielen der berühmtesten Conchyliologen ein Stein des Anstoßens war, hin zu segeln,
 und sie als den Helmintholithum *Buccini auricularis* vorzutragen. Weder das trau-
 erge Beispiel des berühmten Iffers, noch das seines vorgebliebenen, aber um kein Haar
 glücklicheren Verbesserers d'Argenville, und des, zu frühe leider, verstorbenen Marti-
 ni u. waren vermögend, mich von meiner, vielleicht zu kühnen Fahrt zurück zu
 halten. Alles, was ich denn thun kann, ist, daß ich meinen vermeynten *Bucciniften*
 umständlich, und genau (woran meines *Eractens* auch das meiste gelegen ist) be-
 schreibe.



schreibe, und dann geduldig den Ausspruch dererjenigen abwarte, die auf diesem Wege besser, als ich, bewandert sind. Seine Beschreibung ist folgende: Helmintholitus Buccini auricularis anomali: Testa subumbilicata, imperfecta, ovata, obtusa; spira brevi, apertura obovata, ampliata, integerrima; anfractibus sex, obsolete striatis; infimo reliquos simul omnes magnitudine excedente; Labro integro, absque retusione, columellæ unito, continuo; Columella oblique striata; Labio super ventre tantisper effuso. Ich muß bekennen, daß, so oft ich die Oeffnung dieser Schnecke (bey der hundertsten ist sie entweder weggebrochen, oder so mit dem versteinten Mergel überzogen, daß man sie ohnmöglich wahrnehmen kann,) betrachtet, und zumal mit jener der *Helix Auricularia* Linnæi, verglichen und zusammengehalten habe, ich fast keinen Unterschied zwischen Beiden entdecken konnte, und gänzlich geneigt war, sie mit unter die Schnirkelschnecken (*Helices*) zu verwelsen. Allein welcher großer Unterschied ist wohl auch in Bezug auf die Oeffnung der Weinigen, und der des *Buccini variegati exotici Columellæ* (das Linne's *Buccinum spiratum* ist) wahrzunehmen? Daß die äußere Lippe (*labrum*) an dem obern Rande, gegen die Spindel hin, so ein wenig ausgeschweift, oder zurückgeschoben ist; vielleicht? aber freylich nur vielleicht, war sie auch an der Weinigen so beschaffen? Jedoch, das kann ich mit keiner Gewißheit sagen, und meine Wahrnehmung bey den wenigen Stücken, die mir an der Oeffnung noch unverletzt zu seyn schienen, hat mich des Mißverständes überführt. Je nun; *jacta est alca*. Meine Meinung habe ich aufrichtig gesagt; Andere mögen nun entscheiden. Wird ihr Ausspruch für eine *Helix* &c. ausfallen; so werde ich mich stille gefallen lassen; ich bin auf nichts, zumal in zweifelhaften Sachen, zu hartnäckig verfahren. Uebrigens habe ich noch von dieser versteinten Schnecke zu melden, daß sie eine der geringsten sey, die sehr häufig in der Gegend von Gutarling auf allen Aeckern gefunden wird. Es ist ungläublich, wie veränderlich ihre Größe sey. Bald so groß, als eine Faust, bald viel kleiner, als das Mäuseohr (*Helix Auricularia* L.). Ich besitze ein großes Stück, in dessen weitmündiger Oeffnung, mitten im Mergel, ein anderes von mittelmaßiger Größe sitzt; aber die systematischen Kennzeichen sind bey dem Einen, und den Andern allezeit eben dieselben, derer ich in meiner Beschreibung Meldung gethan habe; sie sind auch alle von mehr oder weniger gewässerter gelblicher Farbe; aber nur außerhalb, und so weit die Beize der eisenschüssigen Mergelguhr, ihr, aus weißem halbdurchsichtigen, kleinsten, wenigstens eine Linie pariser Maaßes dicken Kalkspat bestehendes Gehäuse durchdrungen hat. Eben diese Beize, zum Theile auch staubiger anfliegender Schmutz, sind Ursache, daß man oft die feinen nach der Länge hingezogenen Striche, die man bey frischen, und wohlbehaltenen Stücken allezeit wahrnimmt, nicht gewahr wird. Ich habe, zur mehrern Einsicht der ganzen Sache, von oben ben, bey 2. angezeigten Schnecken, sowohl eine große, als eine der kleinern, beson-

besonders bey *l. l.* malen lassen: bey (*u.*) hingegen ist der Abdruck einer von mittlerer Größe. Und nun genug, ja mehr als genug von einem noch zu bezweifeln den Rinkhorn; welches übrigens auch mit der *Bulla Achatina L.* große Aehnlichkeit hat. Um so viel willkommener ist mir ein paar verfeinerter Schaalchiere des adriatischen Meeres, weil ich sie im Innern nicht, oder gewiß nicht bestens beschrieben finde. Ich nenne die erste, die wir bey *u. u.* ganz verfallt, und weiß, mit dem Mergel fest zusammenhängend sehen, *Helmintholithum Mastræ variaz*, weil ich ihr Original, das an der Seite in verschiedner Größe, und Farbe zu sehen ist, *Mastram variam* nenne. Sie gehöret folglich unter die Korbmuscheln, da sie, in Bezug auf ihre Größe, wie ein Backtrog sehr tief ist, und hauptsächlich, weil der mittlere Hauptzahn ihres Schlosses, einem unter dem Angel (*natis*) liegenden, und über den beyden Schenkeln gerade aufwachsenden Winkelmaas gleichet, das zwischen beyden Schenkeln ein rundhöhes Grübchen einschließt, und noch ein dergleichen größeres außerhalb, doch hart an den längern Schenkel angeschlossen hat. Ich habe diese *Mastram* so beschrieben: *Testa lævi, nitente, subdiaphana, obtuse triangulari, bivalvi, æquivalvi, inæqualitera. Valvulis tenuibus, egregie gibbis, transverse striatis; striis confertis, subtilissimis, sæpe microscopicis. Umbonibus, natibusque lævissimis, glaberrimis, nec striatis. Vulva, anoque oblique divergentibus; subtruncatis, lanceolatis. Labiis longitudinaliter oblique striatis, rimam versus nonnihil assurgentibus. Natibus inflexis, approximatis. Margine laterali obtuse rotundato, integerrimo, edentulo. Cardinis dentes laterales remoti, elongati, compressi, plani &c.* Der Größe nach ist sie sehr unterschieden; die größten möchten einer Haselnuß gleichen. In Ansehung der Farbe, die meistens mehr oder weniger weiß ist, habe ich auch gelbe, graue, aschensfarbige, bläulichte, und schwärzlichte, auch fast wasserklare gesehen; an den letztern sieht man bläulichen beynahe keine Striche, aber wohl lichte, und weniger lichte, das ist, wasserklare, mit weißlichten sehr feinen Streifen abwechseln; so wie auch gemeinlich die schwärzlichten, weißlichte feine Streife, vielleicht nur von der angehenden Verfallung? zu haben pflegen. Ich hatte sehr stark vermutet, die *Mastra glabrata L.* möchte mit der Meinigen eine und eben dieselbe seyn; da aber Linne das afrikanische Meer zu ihrem Aufenthalt anzieht, und beim *Striatus* nicht hinzusetzt: in die Quere, so verstehe ich das nach der Länge hin; welches bey der Meinigen eben so wenig zutrifft, als sich zu derselben die Anmerkung schickt: *vulva, nulla carina distincta.* Die zwote gemeldete Verfeinerung, die bey *S. S.* größter, als in der Natur selbst, vorgestellt, und uns noch öfters vorkommen wird, nenne ich *Helmintholithum Turbinis striatuli Linnæi*, und zwar mit desto größerer Zuversicht, da ich sein ächtes Urbild, oder vielmehr ihn selbst in Natur, aus dem adriatischen Meerbusen vielfältig besitze. Nur diese gestreifte, oder vielmehr gestrichte, und vielleicht am allerbesten gestrichte, das ist nezförmig gegitterte Treppe ständens, möchte, wie ich bereits oben erinnert habe, des Grafen Ginanni Turbo



minimo reticulato seyn? wenigstens scheinen mir zu der ginnannischen kurzen Beschreibung, und nicht am besten ausgefallenen Abbildung, die Kennzeichen des Turbinis striatuli L. besser, als jene seiner milchweißen Treppe sich zu schicken. Ich will indessen dem Urtheile meiner Leser nicht vorgreifen. Sie sollen selbst entscheiden, und sprechen. Da mir übrigens der besagte Turbo striatulus L. nicht zum allergenauesten beschrieben zu seyn scheint, so bin ich im Stande davon eine so viel immer möglich vollständige Beschreibung zu geben. Sie ist diese: Testa rufo-cornea subdiaphana, subulata, turrita, decussatim striata, seu reticulato-cancellata, anastomosibus verrucosis. Anfractibus ut plurimum duodenis, contiguis, longitudinaliter sulcatis, alterneque carinatis, nec tamen carinulis membranaceis; sulcis præterea tribus, alternisque carinulis elevatis transversis; intersectionibus carinularum mutuis calloso-verrucosis. Apertura minus orbiculata; obovata potius, et basi angustata. Labro crenulato; Labio, columellaque oblique sulcatis, alterneque carinulatis; carinulis usque sex, vix nisi summum subcalloso-verrucosis. Umbilico nullo. Die natürliche Farbe dieser kinnannischen gestrichten Treppe ist folglich nichts weniger, als weiß; sie ist vielmehr, wie beym Turbo Terebra L., und fast noch mehr, röthlicht hornfärbig, und halbdurchsichtig; hat sie längere Zeit am sandigen Strande gelegen, dann wird sie weiß, wie Kalk, und undurchsichtig; und oft zuletzt ganz schwarz; dergleichen ich selbst besitze. Endlich sehen wir noch bey . . . eine verkleinerte Schnecke, deren Gewinde weder nach der Länge, noch in die Quere; weder mit Rippen, Furchen, und Strichen, noch mit eingedrückt Grübchen, und hervorstehenden Warzen bezeichnet, kurz: glatt, und ohne Zeichnung sind, auch etwas von einander abstehen. Da ich aber selber weder die Definition, noch die Zahl ihrer Windungen, zu erblicken und abzuzählen im Stande war, und entweder die Beyden, oder doch das eine Ende der Mündung weggebrochen war, so konnte ich mich unmöglich entschließen, dieselbe mit Bestimmtheit lieber zu dem einen, als zu dem andern Geschlechte zu verwiesen, und begnügte mich, sie Helmintholium Cochleæ indeterminatæ zu nennen, damit ich nur niemanden falsche Waare verkaufen möchte.

Die Siebente Figur.

Nicht nur allein wahre kumachellen, das ist, gleichförmigberbe, oder spatartige Kalk, steine, und zu Steine verhärteten Mergel, mit eingeschlossnen Ichthyophyten und Schaalthieren, heget das ehemalige Bette des Meers bey Gutaring in sich; sondern auch eine unglaubliche Menge einzelner dergleichen Seerhiere, die der Ackermann bey Westlung seiner Fruchtfelder noch heutiges Tags, aus dessen reichen Schoosse herausarbeitet, und wegwirft. Wer möchte sie alle beschreiben, zumal in einer Abbildung,
in



in die sie nur ganz zufälligerweise mit eingerückt worden sind, weil man dadurch hauptsächlich paritätsweise darthun wollte, wie ohngefähr die bleybergische Muschelschale entstanden sey, die gleichbedingts mit lauter Schaalstücken gefüllt ist. Von diesen losen einzelnen werde ich daher nur einige wenige, seltener anführen, die, wiewohl nach so viel Jahrhunderten, sich dennoch allezeit noch so ziemlich gut erhalten haben. Darunter ist vorzüglich bey a. der *Helmintholitus Tellinae Remies L.*, den es mich ungemein gefreuet hat in Kärnten gefunden zu haben. Er muß einmal in einem grauen gleichförmigberben Kalkstein eingeschlossen gewesen seyn, weil die einzelne obere Schale, die ich davon besitze, ganz mit demselben ausgefüllt ist. Ich hatte anfänglich geglaubt, sie selbst sey in Kalkspat verwandelt worden; aber nein! bey genauerer Besichtigung nahm ich wahr, daß sie zu eben denselben Kalkstein, den sie einschließt, versteinert worden ist. Sie ist, wie man aus der Figur ersieht, tellerförmig rund, nur daß der Angel (Natis) über dem Rande ein wenig hervorragt; stumpf erhaben, das ist, zusammen, oder vielmehr niedergedrückt, ohne alle Zeichnung, der Quere nach mit tiefen, con-entriscen, dem äußersten ganzen und ungezähnelten Rande gleichlaufenden Furchen, und wechselsweise mit stark hervorstehenden dicken Künzeln besetzt; übrigens dickschalig, und von drey bis vier Zoll im Durchmesser. Rumpfs Figur Tab. 43. lit. 1. und noch viel besser jene des Gualtieri Tab. 76. lit. F. trifft mit der Meinigen vollkommen ein; auch zweifelte ich nicht, daß Bourguets Fig. 38. Tab. 8. meine Versteinernng so ziemlich gut ausdrückte; allein er selbst hält sie für eine versteinerte Madrepore; mithin verantworte er es auch, er hat es auf seinem Gewissen. Was wird nun aber hiezu unser schätzbarster, und verdienstvoller Herr Hofrath von Born sagen? Seine *Tellina Remies* hat wohl gar keine Aehnlichkeit mit der Meinigen! Er wird, denke ich, sagen: So, wie ich meine guten, mir bekannten Ursachen gehabt habe, bey meiner *Tellinuschel* die gualtierische Eitaciton wegzulassen, so hat hingegen auch ein Anderer seine guten, ihm bewußten Gründe gehabt, meine Eitaciton bey der Seinigen wieder wegzustreichen. Er wird sagen: Keiner von Beiden hat dadurch das Vaterland verrathen, oder die Treue gegen seinen Landesfürsten verletzt. Er wird endlich, als ein wahrhaft gelehrter Mann sagen: Non eadem sentire alios in rebus iisdem, incolumi licuit semper amicitia: und das heißt, wie man soll, das heißt erhaben denken!

Mit eben demselben verhärteten, und schon oben erwähnten Mergel ausgefüllt, dann mit einem schmutzig weißen, spatartigen, halbdurchsichtigen Gewande überzogen, ist bey A. der *Helmintholitus Cardii Isocardii L.* zu sehen. Ich war, die Wahrheit zu bekennen, lange unschlüssig, ob ich daraus nicht lieber den *Helmintholium Cardii tuberculati L.* machen sollte? Aber nicht einmal die mindeste Spur von

einigen,



einigen, der Quere nach gezogenen Strichen, konnte ich bey meiner Herzmuschel erblicken. Es ist schon bey den natürlichen Muscheln *Cardiorum aculeati*, *echinati*, *tuberculati*, *Isocardii* L. so, wie auch bey jenen des *Fragi*, *Unedini*, *retusi*, *muricati* L. und *imbricati* *Bornii*, sehr hart, wenn man sie nicht alle besammen, und vor Augen hat, zu unterscheiden; nicht einmal ihre Figuren bey'm Bonant, Rumpf, v. Argenville und Born erleichtern uns jederzeit die Mühe, wenn nicht eine genaue systematische Beschreibung die besten Dienste dabey bisweilen thäre. Um so viel mehr muß denn die Schwierigkeit, sie mit Bestimmtheit aus einander zu setzen, bey ihren Versteinerungen wachsen. Um daher meine Leser auf keinen falschen Weg zu bringen, lege ich ihnen, zu ihrer Beurtheilung und Entscheidung, die Kennzeichen der Meinigen so vor, wie ich sie finde. Sie ist eine zwoschaalige Herzmuschel; ihre beyden Schaa-len zwar gleich, aber etwas ungleichseitig; sehr bauchig, das ist, stark gewölbt; der äußere Rand um und um gefelrt, oder gezähnel. Ihre Umkleidung ist ein abgenützter weißlicher halbdurchsichtiger, oder doch durchscheinender Kalkspat. Weder Striche, noch Furchen, oder Falten habe ich an ihr gesehen, die in die Quere glengen; nach der Länge hingegen, das ist vom Schlosse zum Rande, ist die ganze Rückenswölbung mit einer Menge, nicht sehr weit aus einander stehender, aber ungleich hoher, abgerundeter Ribben durchzogen; je zwischen zwe stärker hervorragenden Ribben, kann man zu drey, vier, auch fünf niedrigere zählen; aber nur auf den höhern nimmt man, der ganzen Länge nach, kleine Knoten wahr, die gegen den Rand zu gleichsam gerin-gelt sind.

Wieder eine versteinerte Tellmuschel bey γ. die unter die länglicht eckförmigen diatheaaligen linnéanischen gehöret; die ich indeffen sehr lange, und eben so fruchtlos als lange bey dem Ritter aufgesucht habe. In Rumpfs amboinischer Maritimenkammer S. 163. Tab. 45. lit. C. scheint es mir daß ich sie endlich gefunden habe. Er nennet sie die Sand-Tellmuschel, das ist *Tellinam Arenosam*, von wegen des häufigen Sandes, den ihr Bewohner mit gewissen röhrligen Werkzeugen stark einsaugt, und häufig wieder herausspritzt. Dieser Eigenschaft halber suchte ich die Meinige unter linnés'sen Klassmuskeln (*Mya*) und Scheiden (*Solen*), aber vergeblich; Seine *Mya arenaria*, die ich kenne, ist von derselben ganz unterschieden; und linné selbst hat meines Wissens nirgends die *Tellinam arenosam* *Rumpfii* angeführt. Sollte nicht etwa Bourguets *Coquille rhomboide* Tab. 26. Fig. 257. eben dieselbe seyn? Aber er verweist die Seinige unter die Kamm-Muscheln (*Ostrea*), und aus so graphischen Schilderungen, die aus einem Paar Worte bestehen, wenn man sich anders das übrige nicht hinzu denkt, kann man freylich nicht sehr gecheut werden. Bis ich daher meines Irrthums überführt werde, werde ich mich an Rumpfen halten, und die Kärnthensche; *Helmintholithum Tellinae arenosae* *Rumpfii* nennen. Sie ist diatheaalig;



schaalig; ganz in weissen durchscheinenden Kalkspat verwandelt; in die Quere länglich eiförmig; zwar erhaben rund, doch nicht sehr bauchig, vielmehr etwas zusammengebrückt, zumal vorneher, nach der Seite des Vorderzwinkels. Das Schloß steht nicht in der Mitte des Rückens der SchaaLEN, sondern stark nach der Ecke des Hinterzwinkels zu; daher auch die SchaaLEN sehr ungleichseitig sind, und die Rippen, die von dem zugesägten Angel nach dem Umlauf des Randes, über der Oberseite der SchaaLEN hinlaufen, eine schiefe Richtung haben. Sie sind übrigens rundlich; stehen nicht stark hervor, doch wechseln alleinal höhere mit niedrigeren ab; und ich habe weder einlge Rauhlgeit, noch Knoten, oder Warzen an ihnen wahrgenommen; es müßte denn seyn, daß sie je welche da gehabt haben, wo man noch iso sehr leichte krumme Querstriche erblickt. Der Rand ist nicht gezähnel, und die SchaaLEN schließen sich an demselben in eine scharfe Schneide. Besonders merkwürdig ist der Umstand, daß wir hier unter der obern SchaaLE der Muschel rechter Hand eine andere dergleichen Tellmuschel hervorragen sehen. Dleß hat nicht anders geschehen können, als daß, indem das Meer zurückgewichen, und diese Gegenden verlassen hat, beim letzten Anspülen ans Land, mehrere dergleichen Muscheln mit an dasselbe hingeschleudert worden sind, davon die Einen wenigstens halb offen gewesen, und geklafft haben, die Andern hingegen in dieselben bey der Oeffnung mit Gewalt hineingetrieben worden sind. Wenn sie nun in dieser unnatürlichen Stellung am trocknen Strande sitzen geblieben, und mit Erde ic. verschüttet, und begraben worden, so war es freylich nicht mehr möglich, sich von einander los zu wickeln. Als klein wird man mich nicht zur Rede stellen, daß ich so kühn, so dreiste seyn kann, Muscheln fremder Meere nach Kärnten überzusetzen! und die Einwohner der heissesten, brennenden amboinsischen und anderer Küsten, mit nur einfallen lassen kann auf trockenem, frostigem, festem Lande solcher Gegenden aufzusuchen, die dem Nordpole ungleich näher, als der Linie sind? Nein, solch eine Fehde besorge ich nimmer mehr von Selten gelehrter Männer; denn in der That übertrage ich ja nichts, wenn ich mich mit einem Linne', Wallerius und so viel andern Gelehrten, ohne das Räthsel aufzulösen, verwundere, wie doch die ostindische Perlenmutter (Mytilus Margaritifera) sammt den Kinnbacken der Crocodille ic. in dem Raßtrichter sandartigen Kalkstein gekommen sey?


So gewiß es ist, daß die Versteinernng bey d der Helmintholithus Echini Saxatilis Linnaei sey, eben so wenig wahrscheinlich scheint, dem ersten Ansehen nach, dieser Satz zu seyn. Man muß indessen sich nur erstens des alten lateinischen



schen Verles erinnern: Cortice deposito laevis Echinus erit; dann zweitens, daß wir hier nicht so wohl die Schale selbst des Meerapfels (so wie sie ausserhalb beschaffen zu seyn pflegt, und die schon ganz weg ist,) als vielmehr den ziemlich beschädigten Abdruck der untern rundhohlen Oberfläche der Schale desselben sehen. Nichts ist gemeiner im adriatischen Meere bey Durno, Trieste, Favos, Glume, als dieser daselbst so genannte Rizzo (Echinus Saxatilis. L.) Seine Grösse ist überhaupt die eines kleinern Dorstörfer Apfels. Er wäre kugelförmig, wenn der halbe Durchmesser (Semidiameter) seines untern Theiles, in dessen Mittelpunkt er sein Maul hat, nicht um die Hälfte kürzer wäre, als der, des obern Theiles, an dessen höchsten Wirbel, dem Munde gerade gegenüber, der After zu stehen kömmt. After und Mund, (dieser jedoch mehr) sind so etwas flach, und platt, und stellen eine Zirkelrunde im Umfange mit fünfzehn, wechselseitig größern oder kleinern, doch allemal stumpf, rundlichten Kerben ausgeschweifte, und folglich zugleich sternförmige Scheibe vor, die wieder aus eben so vielen kleinern und ungleich größern, theils herzförmigen, theils anders gebildeten, leicht zusammenhängenden Stücken, oder Blechschalen (assula) bestehen. Im Umfange des Afters habe ich fünf durch und durch gehende Löcher bemerkt, jedes an jeden der größern rundlicht fünfliniichten Blechen; wo hingegen die fünf kleinern und herzförmigen nur unterhalb ein eingedrücktes kleines Grübchen, das nicht bis auf die äussere Oberfläche der Schale offen ist, haben. Aus dem Mittelpunkte des Mundes ragt unterhalb eine weisse elfenbeinene fünfseitige Pyramide hervor, die aus fünf dreieckigpyramidalischen Zähnen des Thiers besteht, deren innere Seitenfläche mangelt, oder vielmehr der ganzen Länge nach, wie ein tiefer Canal ausgefurcht ist. Linne hat ganz recht, daß er die mehr oder weniger kugelförmige, zarte und leicht zerbrechliche Schale dieses Meerapfels in zehn Gänge (ambulacra) und eben so viel Felder (areas) einteilet. Die Felder, wären sie nicht gebogen, um dem Gehäuse eine kuglichte Gestalt zu verschaffen, würden lamperförmig seyn. Sie sind wechselseitig breiter oder schmaler; von innen weiß, glatt, ganz undurchsicht (p), bestehen alle aus zwei Reihen ungleich fünfliniichter, zwar flacher,

- (p) Mit Fleiß habe ich sie mit dem Vergrößerungsglase betrachtet, und zwar der Sonne entgegen, nicht die kleinste Spur noch so feiner offener Poren oder Haarröhren kann man wahrnehmen; wie daher die auf den Warzen aufgesetzten beweglichen Stacheln nach Willkür des Seewurms sich rühren, und allenthalben hinlenken können, sehe ich wirklich nicht ein; es müßte nur durch den After oder Mund das allerfeinste säterichte Häutchen oder Zell über der kalkartigen Schale sich ausbreiten, das an der Wurzel der Warzen mit gemeldeten Stacheln zusammenblenzt. Gewiß ist es, daß, wenn ein Stachel verlohren geht, oder das Gehäuse irgendwo eingebrochen wird, alles das bald

wie



her, aber sehr stumpf eingebogener Schildchen, oder Blechchen; die, damit keine Zwischenräume offen bleiben, sich nicht paar, und paarweise, sondern nur wechselseitig zusammen schließen. Da jederzeit ein schmäleres mit einem doppelt so breiten Felde abwechselte, so sind diese wechselseitig zusammengefügte Schildchen beyder Reihen eines Feldes, bey den breiteren in die Quere lang, bey den schmälern hingegen rundlich fünfseitig. Ein jedes Feld der schmälern ist beyderseits, der ganzen Länge nach, zwischen zwei kaum eine halbe Linie von einander abstehenden Reihen der allerfeinsten durchstochenen Löchchen eingeklammert; und diese sind die Linne'schen ambulacra dena, paribus approximatis, oder die zehn schmalen Gänge, beyderseits mit einer Reihe der kleinsten, die ganze Schale durchziehenden Löchchen umgeben. Ganz anders sieht nun eben dieselbe Schale von aussen aus. Schale und Stacheln sind bald schwarzroth, bald violetteroth; bald fällt das Roth mehr ins Spacienfarbige, bald schiebt es besser ins Amethystene; ich habe sie auch schwarz, grün, lichtgrün, blaß, und weißlichtgrün gesehen. Oder zeigt die Verschiedenheit der Farben nur etwa das verschiedene Alter dieses Seeigels an? Das überlasse ich Andern zu entscheiden. Die so schmalen, beyderseits mit einer wellenförmigen Reihe der allerkleinsten Löchchen eingeschlossnen Gänge, sind in der That oberhalb von eben derselben Beschaffenheit wie unterhalb, nur daß man sie wegen der dunklern Farbe nicht sogleich wahrnimmt. Dagegen sieht man auf den wechselseitig breiteren oder schmälern Feldern keine Schildchen (assulas) mehr; sondern lauter hervorstechende brüstenähnliche Warzen (papillas mamillares). Niemand glaube, die so vielen, und bald hätte ich gesagt unzähligen Warzen der äußern Oberfläche der Schale stünden auf derselben ohne alle Ordnung unter einander verstreuet; sie beaupten vielmehr eine jede nach der strengsten Symmetrie ihre gewisse gleichförmige Stelle, in Bezug auf den ganzen Ziergarten dieses Meerigels. Genug, sie sind die Gestelle, oder die Wurzeln der Gelenke und äußerlichen Glieder des Wurmes. Der Gestalt nach sind sie alle vollkommen gleich, und stellen eine Halbkugel, ohne alle Zeichnung, ohne concentrische Firkelstriche, ohne Glanz, vor, über deren Wirbel ein in die Halbkugel zur Hälfte vertieftes kleineres, fein polirtes, sehr glänzendes Kugeln

R 2

den

wieder hergestellt wird. Ein Stück der Schale mit noch aufstehenden Stacheln warf ich ins Seidewasser; mit Verdacht und Aufwerfung vieler hundert Luftblasen löseten sich Stacheln und Schale ganz auf; nichts blieb zurück, als ein rogartiges, fadenhaft-faserichtes, auf dem Seidewasser schwimmendes durchsichtiges Fell, das anfänglich röthlich war, nach kurzer Zeit aber gelbgrün wurde, und der *Conserva bullosa* L. völlig gleich sahe.



chen hervortragt. In Ansehung ihrer Größe habe ich deren viererley bemerkt; die größten, so groß als ein Hirsekorn; mittlere; kleine; die Allerkleinsten. Auf jedem der schmälern Felder wechseln zwei Reihen der mittlern, mit drei Reihen der kleinsten vom Munde zum After der ganzen Länge nach, ab, und jede Warze der mittlern ist überdem noch mit einem Kranz der allerkleinsten umgeben. Man sieht im Gegenfalle auf den fünf breiteren Feldern zwar nur abermal zwei Reihen der größten Warzen, deren jede jedoch beiderseits mit einer Reihe von mittlern gleichsam eingeklammert ist, und so wie jede der größten Warzen um sich einen Kreis von andern Warzen hat, in welchem die kleinen mit den allerkleinsten stets abwechseln; so besteht der knotige Kranz der mittlern bloß aus den allerkleinsten allein. Große und kleine, kleine und noch kleinere; kurz, eine jede der tausend Warzen ist, so lange der Seewurm lebt, mit ihrem Stachel bewaffnet. Aber so wie die Warzen ungleich groß sind, so eben sind die vielen Stacheln an ihrer Länge, Dicke, Stärke, Feste, Stiefe und Sprödigkeit oder Biegsamkeit gar nicht gleich. Je kleiner das Warzenchen, desto kleiner und feiner ist auch der Stachel; jene der Größten erreichen bald die Länge eines Follers. Indessen sind doch alle und jede dieser Stacheln darinnen gleich, daß sie nadelförmig, sehr spitzig, glänzend, rundlicht, und der ganzen Länge nach sehr fein gestrichelt sind. Eine halbe Linie über der Wurzel des Stachels (die weiß, walzenförmig und unterhalb rundhohl ist, um sich an das Köpfchen der Warze ganz anschließen, und nach allen Seiten hin drehen zu können) ist ein dicker, hervorragender Ring, mit vielen Einschnitten oder Kerben, angebracht. Zweymal so viele Striche, als der Ring Einschnitte, hat ein jeder Stachel. Vom besagten Ringe an geht allemal ein sehr feines und doch zähes Häutchen über die walzenförmige Wurzel des Stachels — ja, ganz über die Warze selbst, herab; und wer ist mir gut dafür, daß sich dasselbe nicht weiter ausbreite, daß es sich nicht mit dem Häutchen der rund herum stehenden übrigen Warzen etc. und so weiter vereinige, oder vielmehr eines und eben dasselbe sey? Das ist, wie ich vermuthete und bereits oben erinnert habe, ob nicht durch den Mund oder After, oder auch beide zugleich, ein mit dem Bewohner der Schale zusammenhängendes feines Häutchen über die ganze äußere Oberfläche sich ausdehne, und alle Stacheln, nach Belieben des Wurms, in Bewegung setze? Wenigstens ist es gewiß, daß man nichts von den Warzen, nichts von den Feldern etc. sieht, so lange alle Stacheln auf dem Meerigel aufgesetzt sind, und der Seewurm folglich noch im Leben ist. Nun wieder auf unsern Helmintholich zurück zu kommen, so ist derselbe nichts als der merkwürdige Kern eines in der Gegend von Gutarang zurückgebliebenen *Echini Saxatilis* L., an welchem

dem sonst nichts, als die kalkspatartigen Merkmale der Schilder der breitern Fels der, dann das offene Mundloch der untern Seite, zu sehen ist.

Verloren ist Mühe und Arbeit, die ich angewandt habe, um mit der muschelförmigen Versteinerung bey a. a. ins Reine zu kommen. Ein wahrhaftig seltnes Stück! aber eben so schwer zu entwickeln. Sie ist der steinhafte Kern einer in Körnen then einst zurückgebliebenen zwoschaaligen Muschel, die ich in keinem Conchyliologen mehr ausfindig machen kann. Ein gleichförmig derber grauer Kalkstein, der die Gestalt einer zwoschaaligen geschlossenen Muschel vorstellt, davon die beyden Schaa- len gleich, gleichseitig dick, rund enförmig, doch gegen den Angel stumpf zugespitzt und unter demselben sehr bauchig oder stark gewölbt, gegen den kielförmigen, ungedrük- nesten Rand hingegen zusammengeedrückt gewesen sind. May kann gar keine Zeich- nung an dem Rücken dieser Schaa- len erblicken, daher, denke ich, waren sie weder geribbet, noch gestrichet, weder nach der Länge noch in die Quere, folglich glatt. Was das Merkwürdigste dabey ist, sind die beyden Angel, die wenigstens ganze drey Linien Pariser Maasses über das Schloß hinaus laufen, zwar von einander abste- hen, aber doch bogenweise wieder bis auf anderthalb Linien sich gegen einander neigen; rima videtur clausa fuisse hymene prostante, deshalben sieht man über der ganzen Spalte hin einen kalkartigen Vorschuß. Fehle ich, oder fehle ich nicht, wenn ich diese Versteinerung Helmintholithum Arcae deperditae nenne?

Achte Figur.

Man wird sich erinnern, was ich oben gemeldet habe, daß, so wie im Bleyberg bey Zurücktretung des adriatischen Meeres, eben so in der Gegend von Maastricht, als Holland von der Nordsee entblößt worden ist, eine ungeheure Menge von Schaa- lthieren zurückgeblieben ist. Was für eine Menge Versteinerungen habe ich nicht mei- ner Anwesenheit auf dem Petersberge, ja in der ganzen dasigen Gegend gesehen! Alle Ei- kinetter Europens könnte man damit reichlich versorgen. Unter tausend verschiednen Stücken nahm ich nur einige wenige mit, die mir noch so ziemlich wohlbehal- ten schienen. Wir sehen sie hier auf der achten Figur bey a. und b. Der Stein, in welchem sie einbrechen, ist das Marmor Sectile L., oder ein sandartiger weißer gelblicher Kalkstein, der sich im Scheldewasser ganz auflöst, sich schneiden, auch zwischen den Fingern sehr leicht zerreiben läßt, und in freyer Luft für sich selbst zer- fällt;



fällt, folglich bloß hierinnen vom *Calcarco arenaceo flavescence Wallerii* unterschieden, und gerade das Widerspiel jenes weißaschgrauen Steines ist, woraus nach Linne's Vorhaben die Stadt Paris aufgebaut worden, der auch andernwärts in Frankreich einbricht, und, wo er flüchtig ist, öfters in große Klauten anschießt, die mit weißem kalkartigen Sande, als dem Niederschlage der darüber megträufelnden unterirdischen Wässer, übersintert sind, so daß man glauben sollte, sie wären krystallisirter Sand; wenn es anders nicht ein mineralogischer ausgemachter Satz wäre, daß Sand, so lange er Sand ist, weder zusammenhängen noch Krystall seyn könne. Ohnmöglich kann ich indessen begreifen, wie der unverschmerzliche selbige Linne diesen französischen, mit wahren Quarzsande gemischten Kalkstein, unter die einfachen Kalksteine habe verweisen können! Linne, sage ich, der das *Saxum Salbergense* den zusammengefügten Felssteinen zuzählet, einen Felsstein, der gleichbedingte sandartigen Gefüges ist, meistens aus Kalk besteht, und wesentlich weder von dem französischen, noch von dem Mittelsteine unsers Hacquets, eines so großen als unermüdeten Naturforschers, unterschieden ist? Ich möchte, wenn man doch beide, den Rainerischen und den Französischen, nicht unter die zusammengefügten Felssteine hat rechnen wollen, daß man ihnen wenigstens unter den Spielarten des Wallerischen Schmelde- oder Glimmersteins, das ist, *Cotis quadrae Wallerii, Linnæi et Cronstedtii* einen Platz eingeräumt hätte. Da mögen indessen andere denken, reden, thun und ordnen, wie sie nur wollen; der Mastrichter Kalkstein, der in freier Luft nicht fester sondern nur lockerer wird, ist voll verkalter Schaalthiere, und in Ansehung dessen kann man ihn zugleich mit Cronstedt als einen zusammengeleimten Felsstein, das ist, als eine aus verkalkten Schaalthieren und sandartigem Kalk, durch gelblichten eisenschüssigen Thon, locker zusammengefügte *Lumachella* oder Muscheltretsche betrachten, und wie sehen bey α in dem selben den ganz schon verkalten aber noch allezeit wohlbehaltenen, daher auch leicht zu erkennenden *Mytilus Margaritifer L.*, ich will sagen den *Helmintholithum Mytili Margaritiferi L.* so wie bey β den *Helmintholithum Cardii edulis L.* Freylich ist die *testa antiquata* nach so viel Jahrhunderten beym letzten nicht mehr so kenntlich als sie einst war; doch sind die sechs und zwanzig Rippen noch alle vorhanden, und unverletzt, an denen man, bey aufmerksamer Beschäftigung, die Merkmale der vielen in die Quere angefügten jährlichen Ringe, und durchs Vergrößerungsglas in den mit den Rippen stets abwechselnden Furchen, die besagten hervorstehenden Ringe selbst, noch heutiges Tages klar und deutlich sieht.

Neun



Neunte Figur.

Bisher haben wir Muschelbrettschen längst verstorbener Jahrhunderte gesehen, die unsere Vorfahren, vor deren Augen sie sich nach und nach gebildet hatten, ihrer Aufmerksamkeit nicht gewürdiget, oder es gewiß nicht für der Mühe werth gehalten haben, uns davon die mindeste Nachricht zurück zu lassen. Mit sonderbarer Lust lege ich nun meinen Lesern eine Muschelbrettsche hier vor, die noch gar nicht alt, erst vor sehr kurzer Zeit geböhren, noch in ihrer Kindheit ist; eine Muschelbrettsche, die sich von Tage zu Tage, wo nicht gar von Augenblick zu Augenblick, bildet, die ein jeder, der nach Cavorli sich begeben will, überraschen, und dabey das Vergnügen haben kann, ihr zuzusehen, wie emsig, wie unverdrossen, und ohne alles Aufhören, sie arbeite, um allen nur möglichen nöthigen Stoff und Vorrath von Materialien zusammen zu bringen, den zusammengetriebenen gehörig zu ordnen und zusammen zu fügen, dauerhaft zu befestigen, dadurch zum glücklichen Wachstume zu befördern, und künftig in der Natur ein Ding zu werden, das sie vorher nicht war. In der Absicht muß das Ungestüm des Meeres, ja gewaltige Stürme selbst, die nur in der Tiefe der See ruhig, vielleicht auch glücklich lebenden Geschöpfe der Meere, empor heben; Fluth muß welche mit Zwang weit an die Küste hinaus schleudern, die in sechs Stunden erfolgende Ebbe am trocknen sandigen Strande, aber in welcher Gesellschaft, in welcher Verwirrung, unnatürlicher Lage, mit unerträglich stinkendem Tang und andern in Häufeln gehenden Seegräsern überworfen! liegen lassen; Regengüsse, den von den nächsten Kalksteinen weggewaschenen staubigen Kalk herzuführen, die austrocknende Luft das ganze Gemenge zusammenheimen und zu Stein verhärten. Und da haben wir nun ein Stück jener zu Stein gewordenen Muschelbrettsche, von der ich schon oben Erwähnung gethan habe, und das man mit Hämmern von den lästigen Platten herabschlagen mußte, die man auf besagter Fischerinsel täglich sehn kann. Der Himmel bewahre die elenden Einwohner derselben für dem traurigen Schicksale Casabrians, der Stadt Messina, und so vieler anderer durch Erberschütterungen, Einstürzungen ganzer Berge u. zerstörter, verwüsteter und unter ihrem Schutte vergrabener Gegenden! sonst möchte es der cavorlischen Muschelbrettsche so, wie vielleicht vor undenklichen Jahrhunderten derjenigen vom Bleyberg, ergehen. Nicht so, wie in der Maffrichter oder Gutaringer Muschelbrettsche, findet man hier die verschiedenen Schalthiere schon ganz verkalst, versteinert, oder wenigstens so verkalstet, daß man ihre charakteristischen Kennzeichen, ihr Geschlecht, die Art und äußerliche Gestalt und



und Farben nur mit vieler Mühe und rathselweise entwickeln muß. Noch hat die Schaalthiere der Cavorilischen weder die stark darauf spielende Sonne zu Kalt gebrannt, noch andere Abwechslungen des Luftkreises abgenüßt und unkenntbar gemacht. Wenn ich die schwarze, oder ins Schwarze mehr und mehr fallende Farbe der meisten ausnehme, die ihnen die Beize des darauf verwiesenden Tangs u. vielleicht geben kann; sind sie in derselben noch in Ihrem natürlichen Zustande, mit den unlängbaren Merkmalen Ihrer Geschlechter, kurz, mit dem unverletzten, sie von allen übrigen unterscheidenden Gepräge Ihres Schlosses oder Ihrer Oeffnung bezeichnet, und wir können in Ansehung derselben, als zu einer und eben derselben Zeit lebende Augenzeugen, unsern spätesten Nachkommen, wenn wir sie jetzt genau beschreiben, einen Dienst thun, den, selber! unsere nachlässigern Vorfahren ermangelt haben uns zu leisten. Dieses bin ich nun im Begriffe zu thun. Meine Leser erwarten indessen umsonst eine Beschreibung der verschiednen Versteinerungen des spanatischen und istranischen Meerbusens; dies mag der Zeitvertreib einer andern Zeit und bequemern Muße werden; die Schaalthiere selbst des östereichischen Littorals (freystich nicht alle; wer würde auch dieses hier verlangen? nur bloß, die wir auf gegenwärtigem Stücke besagter Muschelbretsche erblicken,) beschreibe ich allein. Die ganze cavorilische Muschelbretsche ist denn überhaupt nichts als ein plattenwelse zu Stein gewordenes Gemenge von allerhand muschel-, und schneckenförmigen Schaalthieren, und weißlichem halbdurchsichtigen Quack, sand von ungleich großen abgerundeten Theilchen (Arena inaequalis albida Wallerii,) zusammengeleimt theils durch sehr feinen Kalksand der zerstörten Muscheln selbst (Calx testacea Linnaei, Arena calcarea Wallerii) theils durch einen geringen Theil flebrichtigen Bodensandes des Meeres, und durch die bindende Kraft der Luft verhärtet. Wir sehen darinnen folgende Schaalthiere:

a. Turbo replicatus Linnaei. Testa turrata laevi: anfractibus sursum imbricatis. Es thut mir sehr leid, daß der größte Theil dieser so eben seltenen, als seither noch nicht genug und gut beschriebenen geglätteten Trommelschraube, da sie bis zur Spitze, das ist, bis zum äußersten nadelförmig zugespitzten Wirbel hin, ganz über der Muschelbretsche hervorragte, durch Unachtsamkeit weggebrochen worden ist. Den Conchyliologen zu Gefallen werde ich mirs angelegen seyn lassen, dieselbe unverlarvt und mit eben dem Kleide, das ihr die Natur gegeben und gemalt hat, anzuthun, von Cavoril herben zu schaffen; bis dahin aber müssen sie sich schon mit der von einem andern dergleichen Stücke geborgten und einzeln gemalten, dann mit den
drey

dren lebigen mittlern Gewinden derselben zufrleben stellen, die glücklicherweise noch auf der Muschelbreitsche zurück geblieben sind. Fuß und Kopf, sammt dem obern nabelförmig gethürnten Rumpfe, gehen ab; die Gewinde sind geglättet (laevibus anfractibus). Weder Ribben noch eingeschnittene Querstrieche sind an denselben, auch durchs Vergrößerungsglas, zu sehen; sie scheinen walzenförmig zu seyn, doch ist die untere Hälfte jedes Gewindes (anfractuum pars aperturam respiciens, vertici opposita) etwas bauchigter, als die obere; daher denn auch jederzeit das untere Gewinde, wo es sich an das obere daran stoßende anschleßt, niedriger ist, als das in der Ordnung darauf folgende höhere. Soll das etwa anfractibus sursum imbricatis heißen? Und so viel für diesmal davon. So wenig indessen auch dieses ist, so ist es dennoch allemal genug, um daraus zu schließen, daß der ächte Turbo replicatus Linn. (ich verstehe den Bonanni'schen Musci Kircheriani pag. 451. N. 24. Claf. 3. Turbinatorum fig. 24. dann den D'Argenvillischen Conch. Tab. 11. fig. E.) von dem Franquebarschen, den uns Martini Th. 4. S. 248. Tab. 151. fig. 1412. unter eben demselben Namen vorstellt, sehr unterschieden sey. Der einsichtsvolle Ehemitz konnte ohnmöglich bey diesem wesentlichen Unterschiede getäuscht werden; er zeigt seine gründlichen Anstände unmaßgeblich an.

ß. Cardium edule, Linn. Testa antiquata, fulcis viginti sex, obsolete recurvato - imbricatis.

Sammt dem Cardio Rustico L. ist diese, nach kinnelscher Sprache esbare Herzmuschel, eine der gemeinsten des adriatischen Meeres. Beyde werden häufig gegessen; ich selbst habe vor dreßßig, und wieder vor drey und zwanzig Jahren zu Brä mit gegessen. Außer allem Zweifel ist es daß sie unterschieden sind, aber so groß ist zuletzt der Unterschied zwischen beyden nicht; und am allerwenigsten würde ich denselben von der Zahl ihrer Ribben herleiten. Diese ist, meiner Beobachtung gemäß, weder ein gewisses noch beständiges Kennzeichen derselben. Das Rusticum soll ihrer stets zwanzig haben; und ich wüßte mich nicht zu besinnen derer unter zwey und zwanzig gezählt zu haben. Beym Eduli hingegen habe ich bald sechs und zwanzig, bald etliche weniger gezählt. In der That aber ist es sehr schwer, die beyderseits äußersten mehr und mehr ersterbenden Seitenribben, auch durchs Vergrößerungsglas, zusammen zu zählen. Sie sind beyde, aber das Rusticum ungleich mehr, dickschalig; wie denn überhaupt diese letztere an allen Theilen stärker als das erstere ist. Wenn ich die Wahrheit gestehen will, so muß man, um zwischen bey-



den bestimmte Unterscheidungszeichen fest zu setzen, nur Bezugs- und Vergleichungsweise von ihnen reden. Die Länge des Rustici gegen seine Breite ist beynähe unkenntlich, ja fast hätte ich gesagt, dasselbe sey breiter als länger; kurz, es ist als lenthalb sehr gewölbt und rundlicht herzförmig, wo im Gegentheil das Edule ungleich länger als breit ist. Ob schon beyde, gegen den Angel hin, stark gewölbt sind, ist jedoch die Wölbung bey dem Eduli ungleich mehr zusammengezogen in Bezug der ganzen übrigen Schale, als bey dem Rustico; und man kann einigermaßen sagen, daß das Rusticum, in Vergleichung gegen das Edule, lateribus cardinis alatum, oder geflügelt sey, und daher stehen auch die Seitenzähne bey dem Eduli von den Mittelzähnen seines Schloßes nie so weit weg, als dieses bey dem Rustico geschieht. Zudem sind die Rippen des Rustici viel höher, stärker und mit vielen groben, hoch hervorstehenden Knoten, zumal gegen den Seitenrand hin, besetzt, wo hingegen bey dem Eduli die appositiones annotinae viel niedriger sind, gedrängter benammen stehen; und ziegelweise über einander liegen. Im übrigen sind sie beyde am Rande tief gezähnt, beyde in- und auswendig weiß, oder doch gelblicht weiß. Bey dem Eduli merkt man seltner, oder gewiß wenigere und fast ganz abgestorbene Querbinden; hingegen hat das Rusticum allemal stark gefärbte Querstreifen; bey der weißen Spielart habe ich gelbe, bey der gelblichten gelb, oder rothbraune, gesehen, bey manchen wechselften auch weisse und gelbe mit aschgrauen ab.

7. Arca Glycymeris Linn. Testa suborbiculata, gibba, substriata, natibus incurvis, margine crenato.

Ich muß bekennen, daß ich mit keiner selbster gesehenen Abbildung dieser schönen Arche sehr zufrieden bin, deßhalb habe ich sie in dem verschiedenen Fuß ihres Alters malen lassen. Der Geschmack ihres Bewohners soll süß seyn, das glaube ich nicht; aber das weiß ich, daß die griechischen Dichter das Beywort γλυκός, so wie das ἰσός, bey allen schmelzhaften, lieblosen, zärtlichen Ausdrücken zu gebrauchen pflegen: so z. B. singt in dorfcher Mundart Theocrit: ἀδὲ τοι τὸ ἰσχυρὸν καί. Einige, wie Linne selbst, sehen zwischen der Arca pilosa und Glycymeris, eine sehr starke Aehnlichkeit; dieß ist allerdings wahr, zumal in Ansehung der Bauart, und der tellerförmigen rund erhabenen Gestalt; indessen sind sie dennoch in mehreren Stücken genug unterschieden. Die Pilosa (des Bonanni Nux pilosa 2. tab. 79.) ist allemal merklich größer, drey bis viermal dicker, sehr schwer, außerhalb gelbbraun, in die Quere und noch viel seltner der Länge nach; gestrichet, und entweder
über

über dem ganzen stark gewölbten Rücken, oder wenigstens längst dem ganzen Rande, (der unterhalb stark gekerbt und gezähnt ist,) mit röthlichem oder schwarzbraunem, kurzhaarigem, dichtem Sammet bewachsen. Die Angel sind umgebogen, und stehen gerade gegen einander über, jedoch eine gute oder anderthalb Linien von einander ab, indem sie eine lange, kelförmig ausgeschnittene Querspalte einschließen, die mit einer schwarzbraunen lederartigen oder knorplichten, und inwendig beyderseits schief gestrichten dicken Haut ausgefüllt ist. Die innere tief rundhohle Oberfläche ist weiß, hat aber vorwärts an der Seite einen grossen schwarzrothen Fleck, der sich bisweilen über dem größten Theil der untern Schale ausbreitet. Ihr Schloß hat der ganzen Länge nach viele dicklichte Zähne, die auswärts gebogen sind. Des Ginnanni Conca di guscio forte, ed assai pesante etc. Tom. 2. pag. 31. lit. C. Tab. 21. fig. 144. ist eben die, die ich nun beschrieben habe. Ich darf hier nicht vergessen, daß bey der Arca Pilosa beyde Ränder, der Margo anterior und posterior, kelförmig rund bis unter dem Angel zusammenlaufen; denn hierinnen besteht auch vorzüglich, nach meinem Erachten, der Hauptunterschied zwischen derselben und der Arca glycymeris, als bey welcher der Rand der Schale, sobald er beyderseits die Höhe des Angels erreicht hat, sich gleichsam endigt, als wäre er über dem Schlosse hin in die Quere abgekürzt, und die Schale selbst links und rechts des Angels mit kurzen Ohren versehen. Man sieht dies Kennzeichen derselben bey allen grossen, kleinen, unterschiedlich gestreckten Spielarten meiner Figuren klar ausgedrückt; man nimmt es gleichfalls an den Ginnannischen Figuren wahr; denn die Fig. 145. et 146. Tab. 21. was sind sie anders, als Linne's Arca glycymeris? Knorr (seinen 5ten und 6ten Theil besitze ich nicht,) selbst, hat es im 2. Theil Tab. 23. fig. 6. nicht ermangelt anzuzeigen. Aber Rumpff! Je nun, Rumpffs Figur Tab. 47. N. 1. ist doch mit den meinigen in keinem wahren Widerspruche; nur scheint es, daß die ambrosische A. Glycymeris, so groß auch unsere mit der Zeit werden, S. Gualt. Tab. 82. fig. C. D. etwas größer, als überhaupt die adriatische, seyn möchte. Mit den Ginnannischen Figuren Class. 2. Fig. 58. 60. 61., sage ich aufrichtig, bin ich nicht ganz zufrieden; zumal mit der letzten; die nach Linne's Vorgeben beyde, die Glycymeris und undata ausdrücken soll, und vielleicht weder die eine noch die andere getreulich ausdrückt. Uebrigens ist die wahre Beschreibung der A. Glycymeris L. folgende: Testa crassa bivalvi suborbiculata, gibba, laevi, nitente, ad cardinem utrinque subaurita, transversim subtilissime, confertaque, striata, longitudinaliter lineata potius, quam proprie striata. Natibus incurvis; rima intermedia dehiscente, transversim cuneato-canaliculata, hymene clausa, ad dimidium li-



neam sejunctis. Margine crenato - denticulato; Cardinis dentibus ad viginti crassiusculis, extrorsum arcuatis, intermediis minimis, in obtusum arcum dispositis. Color intus albus, sub vulva atro - purpurascens; extus ex albo itidem fundo, plus minusque rufo maculatus, praepremis ad umbones et nates. Molecularum numerus, magnitudo, forma, situs, varia: sunt eae jam plures, jam pauciores; rotundatae, angulatae, aut oblongae; nunc in undulas acutangulas ordinatae, velut characteriformes; alias in plures majores, aut etiam in unam maximam, dorsum omne insternentem, confluentes; flaventes; rufae; flavo-rufae; rufo - brunescentes; obsolete hyacinthinae; etiam subcinerascens. In aetate adulta valvularum dorsum ut plurimum aquosissime aut roseum, aut lilaceum evadit, a parentibus tum semper quam distinctissime alternis fasciis saturatioribus, striisque sive lineis longitudinalibus plurimis, cardiorum, aut ostrearum pectiniformium more. Vielleicht wird jemand denken, wie ich selbst gedacht habe, die kleine Spielart sey nicht sowohl des Linne' A. Glycymeris, als vielmehr seine Arca Nummaria? ja vielleicht hat auch wirklich Linne' keine andere darunter verstanden. Dem sey, wie ihm wolle, und wenn denn Linne' selbst so gewöhnet haben sollte; so kann ich gleichwohl meine Leser versichern, daß ich allezeit bey den kleinen hier abgebildeten, eben dieselben Kennzeichen richtig gefunden habe, die der Glycymeris eigen sind. So lange sie klein sind, scheinen sie zwar sowohl geglättet (laeves), als glatt, das ist, ohne Querstriche, und nicht einmal der Länge nach, fadenhaft gestrich zu seyn. Man sehe sie aber nur recht genau, oder durchs Vergrößerungsglas an; mein Wort ist dafür, man wird Querstriche, und noch viel feinere Striche, vom Schlosse nach dem Umkreise hin erblicken.

- (d) Vetus inconstans. Testa crassiuscula, laevi, subcordata, transversim ex membranis foliaceis, retrorsum imbricato incumbentibus conferte striata. Ano retuso; cordiformi. Vulva oblongo - ovali canaliculata. Margine crenulato.

Bei der grossen Zahl und Verschiedenheit der mannigfaltigen Venusmuscheln, und bey dem eben so grossen Mangel echter systematischer Beschreibungen derselben, muß es allezeit einem, nur nach gewissen kunsimäßigen und in der Natur selbst gegründeten Kennzeichen zu arbeiten gewohnten Conchyliologen überaus schwer und sauer werden, von denselben mit Bestimmtheit zu reden, oder wenigstens dieselben allezeit richtig bey den verschiedenen Autoren zu entwickeln und für gewiß anzugeben, welche sie bey diesem oder jenem seyn. Man hat Linne' vieles zur Last gesetzt, und sich oft gegen die unsterblichen

Wert,

Werden sie dieses unermüdeten, und so zu sagen schöpferischen Mannes sehr unerkennlich bezeuget; indem man seinen zwar sehr kurzen, aber meisterhaften Beschreibungen, Abbildungen vorgezogen hat, die zwar prächtig und kostbar, aber nicht allemal eben so richtig und lehrreich waren. Mich hat er indessen unter allen am wenigsten irre geführt, und sehr oft gebauert, daß, wo er selbst gefehlt haben mag, er nur von andern irre geführt worden ist. Ich habe die gegenwärtige Venusmuschel indessen inconstans genennet, weil ich an derselben gewisse Merkmale wahrgenommen habe, die man an ihr nicht allemal, wenigstens nicht sogleich siehet; und weil ich mich ohnmöglich entschließen konnte, mit Bestimmtheit anzugeben, welche sie beym Linne' namentlich sey. Sie ist eine der gemeinsten des adriatischen Meers, und ohne allen Zweifel hat sie Gualtieri auf der 75 Kupfertafel zweymal vorgestellt, als Fig. N. Chama aequilatera transversim striata, subviridis ex albo fasciata; und wieder Fig. S. Chama aequilatera transversim striata, ex fulvido rubescens. In der That besitze ich deren selbst weisse, heile, oder hornfarbige, pomeranzengelbe, olivenfarbige, aschgraue, schwarze; jedoch ist ihre natürliche Farbe, so lange sie dieselbe am Strande nicht geändert hat, die weisse. Ich hatte stark vermuthet, und stehe von meiner Vermuthung noch nicht ganz ab, sie sey die Venus Cassina L. Aber Linne' führt bey einer eben nicht sehr seltenen (habitat in O. Europaeo, frequenter etiam fossilis) Muschel gar keinen Conchyliologen an, woraus ich meine Vermuthung zur Gewissheit bringen, oder davon ganz absehen könnte. Die Venus Gallina Linn. schien mir gleicherbings von der meinigen eben nicht sehr entfernt zu seyn. Hätte Linne' bey derselben des Bonanni Tellinam cl. 2. Fig. 44. angezogen, die die meinige und die Qualiterische zu seyn scheint, so würden wir darüber nimmermehr in Zweifel stehen; so hat aber mein besser Linne' (warum? das weiß ich nicht;) für eathamer befunden, bey seiner Ven. Gallina die bonannische 63. und 64. Figur anzuführen, eine Muschel, die ich allezeit für eine kleinere Unterart seiner Venus Chione gehalten habe, und die uns Ginanni viel treffender Tom. 2. Tab. 22. Fig. 148. abgebildet hat. Freylich will unser liebenswürdiger Vorn behaupten, Linne's Chione sey nur durch die bonannische 63te Figur angezeigt worden. Aber da wollen wir ihn auch allein dafür sorgen lassen, wie er eine dickschalige herzförmige Venusmuschel mit einer Muschel vereinigen wird, die nach dem Vorgeben ihres Beschreibers subtili, teretique (ich verstehe subrotunda aut obovata) est testa, in parte concava cyanea etc. Bey so bewandten Umständen ist zuletzt nichts anders zu machen, als daß ich meine Venus inconstans so genau beschreibe, als es nur möglich ist. Sie ist von der Grösse, die wir in der angezeigten Figur sehen; bisweilen etwas größer, auch



auch kleiner; gehört unter die dickschaligen, hat, wie die Venus Dione, Dysera, und verrucosa L. eine fast dreieckig herzförmige Gestalt, mit glatten Winkeln; zwar bündig, doch nicht so stark als die letzte. Die innere höftrunde Seite der Schalen ist weiß, hat vorwärts an der Seite, unter dem Vorderwinkel, einen kleinern oder größern schwarzweißenblauen, ins hyacinthrothe sich verlienden Fleck; und der ganze untere Rand ist fein gefeibt. Die drei Zähne des Schloßes sind schlechterdings so beschaffen, wie es das Geschlecht der Venusmuscheln erfordert; wovon der hintere, der gerade unter den Hinterwinkel zu stehen kommt, der kleinste ist; ein Umstand, der meines Erachtens auch bey andern Venusmuscheln sich ereignet. Die Angel (nates) sind nackend, und gehen jählings gespißt zu, mit einer starken Krümmung seitwärts gegen den After oder Hinterwinkel hin. Der After selbst (anus) ist zurückgeschoben, oder eingedrückt, herzförmig und der Länge nach doch schief, sehr fein und fadenhaft gestrichet, dessen ohngeachtet nichts weniger als platt, sondern vielmehr gegen den Umfang hin, (der gefeibt ist,) tiefer als in der Mitte: soll das etwa so viel als *marginis postici crenulato, pone anum canaliculato* heißen? So ist der Hinterwinkel beschaffen. Der Vorderwinkel hingegen ist gewiß vier, bis fünfmal länger, nach Art einer länglichten ey, oder lanzettförmigen Hohlkehle ausgeschnitten; *labiis longitudinaliter oblique striatis, ac signaturis arcuatis rufis - fuscescentibus notatis, margine obtusissime carinatis; Rima lineari lanceolata, hiantes; Nymphis nudis, hymene prostante tectis.* Der äußere Rücken der Schalen ist nun geglättet, und mit gedrängt concentrischen Querstichen durchzogen. Bey genauerer Betrachtung finden wir aber, daß über den ganzen Rücken derselben lauter blättrige, scharfkantige, zurück gegen das Schloß hin geworfene, fast ziegelförmig über einander liegende concentrische Querrungen aufstehen, die mit eben so vielen Querschnitten stets abwechseln. Das sind die wahren beständigen Kennzeichen meiner Venusmuschel der ganzen Länge nach, sie sey nachher von welcher Farbe sie wolle. Bey manchen Stücken nahm ich fadenhafte Striche wahr, die über der höchsten Wölbung des Engels, gegen den äußern Rand hin, gezogen waren. Schon mit unbewaffneten Augen, noch deutlicher aber durchs Vergrößerungsglas, sah ich, daß daselbst die blättrigen Falten stark abgenützt, oder weggewaschen waren. Dieser Umstand veranlaßte mich, diese Art Muscheln mit mehrerer Aufmerksamkeit durchs Mikroskop zu untersuchen. Dadurch erkannte ich denn, daß, so scharfkantig und glatt auch besagte Falten sonst scheinen, sie dennoch gleichsam als sehr fein gefeibt herauskommen; daß wenigstens die untere Haut des Rückens der Länge nach sehr fein gestrichet, und daß endlich die innere oder Rückenseite

der



der aufstehenden Falten, der Quere nach mit matten dunkelröthlichen Punkten stets getüpfelt sey, die von allen Falten zusammengenommen, nach allen Seiten hin, wie der Buchstab V, in quincuncem geordnet sind. Ich zog aus meiner kleinen Sammlung jene hervor, die wir einzeln bey ϵ sehen, und die Gualtieri Tab. 75. Fig. F. angezeigt zu haben scheint, *Concha marina valvis aequalibus aequilatera, notabiliter umbonata, et oblique incurvata, subrotunda, vulgaris, striis densissimis et profundis transversim striata, candida, leviter ex fusco variegata et radiata.* Soll sie wohl Linne's *exfoleta* seyn? Sie war in allen Stücken mit der *Venus inconstans* vollkommen gleich, nur daß man die Lüpfeln auch auf der äußern Rückseite der Falten zugleich sahe. Ich gieng weiter, ich untersuchte die, die wir bey χ sehen; ist sie nicht die wahre *Venus Gallina* Linn.? Sie traf mit der *Venus inconstans* gänzlich überein, nur waren die Lüpfeln in lange Strahlen geordnet, und wo man an dem weißen Rücken keine Lüpfeln sahe, nahm man sie doch, oder wenigstens ihre halb verloschenen Merkmale wahr. Nicht einmal jene ließ ich mehr ununtersucht, die wir bey ψ und ω erblickten; in gar keinem der angezeigten Kennzeichen meiner *Venus inconstans* waren sie von derselben unterschieden, nur waren die sichtbaren Lüpfeln derselben anders geordnet; indessen konnte man dennoch durch das Vergrößerungsglas auch an den weißen Plätzen noch allemal die abgestorbenen übrigen Lüpfeln sehen. Die bonannische 42. Figur Pl. 2. dann die Gualtierischen Tab. 77. F. C. und Tab. 75. F. G. scheinen mir die meinigen auszudrücken; der Beschreibung nach ist nicht einmal ein Zweifel. Sollen sie daher auch Linne's *scripta* und *fimbriata* seyn? Ich rede zu meinen Lesern mit aller Aufrichtigkeit, trage ihnen meine gemachten Wahrnehmungen mit aller Genauigkeit und Wahrheit vor, doch dringe ich ihnen nichts auf, und bitte sie allein mir zu sagen, ob nicht zu sehr die *Venus Casina*, *Gallina*, *Scripta*, *Exfoleta*, *Fimbriata* Linnei, dann Born's *Venus Sinuata*, eine und eben dieselbe, und zwar von meiner *Venus inconstans* in nullo caractere specifico; aetate duntaxat, et aetatis vicissitudinibus, unterschieden sey?

(e) *Mactra Varia*. Vid. Fig. 6. lit. γ . γ . γ .

Da ich diese Korbmuschel bereits oben a. a. O. weitläufig beschrieben, auch die Originale selbst hinzu habe malen lassen; so habe ich davon hier weiter nichts zu melden, als daß sie in der cavortischen Muschelbretsche sich sehr häufig einfinde, und zwar von sehr unterschiedner Größe, oder soll ich sagen Kleinheit? Uebrigens sind die fadenhaften Querstriche (die niemals mangeln) oft so fein, daß man sie kaum, wenig,



wenigstens nicht mit flüchtigem Auge, wahrnimmt, und deshalb hat man sich wohl in Acht zu nehmen, daß man dieselbe mit einem Paar anderer Muscheln, die gleichherdings im adriatischen Meere, und auf der cavorischen Muschelbretsche zu sehen sind, nicht etwa verwechsle, oder gar vermenge. Diese sind eine noch nicht beschriebene Klammuschel (*Mya*), dann eine eben so unbekannte Tellmuschel (*Tellina*), die ihr dem äußerlichen Ansehen nach sehr gleich, aber in der That und in Bezug auf das Schloß, von derselben wesentlich unterschieden sind. Jedoch ich muß alle Weitläufigkeit, so viel nur möglich, vermeiden; und daher für diesmal kein Wort davon.

(?) *Cardium Striatum*. Vide Figuram 6tam lit. γ. γ. γ.

Auch diese Herzmuschel habe ich schon oben am angezeigten Orte mit Gelegenheit ihrer Versteinerung beschrieben, und davon manche Abänderungen in natürlicher Größe und Farbe malen lassen. Es giebt derer sehr viele. Ich besitze gewiß zweimal kleinere, als die kleinsten der gemalten sind. Je kleiner sie sind, desto schöner pflegen sie gemeinlich zu seyn, und die oft nur mikroskopischen Warzen der Seitenrippen kommen durchs Vergrößerungsglas überaus schön, und wie so viele Kugelfründe, schneeweiße und glänzende Perlen heraus. Sie sind halb durchsichtig, oder wenigstens durchscheinend, die Rippen fein, rundlicht, glatt, in quibus futuras annotinas testae antiquatae haud dignoscas, und wenn anders die Schalen am Strande durch die Sonne nicht halb zu Kalk gebrannt worden sind, glänzend. Ihre natürliche Farbe ist die weiße, oder ein Gelb, das mehr oder weniger ins Röthlichte übergeht, und an den erstern erscheinen bisweilen einige wenige, weit aus einander stehende röthlichtgelbe oder auch milchbläulichte Querstreife.

(?) *Dentalium Entalis* Linn. Testa tereti, subarcuata, continua, laevi.

Woll den obersten Theil und Stipfel dieses fein geglätteten Hundezahns sehen wir hier auf der Muschelbretsche aufsitzen, der seines Bewohners, des Steinhörners, Schwanz ausmacht, und da er offen ist, wiewohl er nur in eine Haarröhre ausgeht, demselben dient, sich des Unraths zu entladen. Es ist dieses Meerzähnychen (welches in Menge, sammt dem gleich zu beschreibenden, im adriatischen Meere zu Hause ist,) nicht leicht über einen ganzen Zoll lang, und hat an der untersten dicksten Mündung kaum eine ganze Linie im Durchmesser. Seine Gestalt gleicht einem Zahnstöcker, oder auch einer rundlichten Schuhspähle, und es besteht dasselbe aus einer röhrenförmigen, einfachen, zwar geraden, doch ein wenig eingebogenen, unter

unterhalb dicken, dann aufwärts mehr und mehr sich verschmälernden, zugespitzten und beyderselts offenen kalkartigen Schale ohne Kammern, die sehr fein, und eben so fein geglättet und glänzend ist; von Farbe weißer als Elfenbein, ganz, oder doch halb durchsichtig, ohne Ribben, ohne Striche, ohne noch so feine ringelförmige Querstriche.

9. Dentalium Dentalis. Linn. Testa vigintifriata, subarcuata, interrupta.

Es ist diese Art der Meerzähnechen, oder der sogenannte Wolfszahn, wesentlich von der vorigen unterschieden; aber nicht sowohl weil sie um so und so viel Linien länger oder dicker und stärker, oder so und so gefärbt ist; nein, sondern weil der vorigen Oberfläche beides, glatt und geglättet, das ist superficie glaberrima, laevigatissima, aequabilissima, impalpabili, ist, so, daß man an derselben nichts, als höchstens durchs Vergrößerungsglas, wenn man sie gegen das Licht ansieht, ein und andern klaren Streif (lineam, non striam impressam) sieht; da im Gegentheil die Oberfläche des Wolfszahns jederzeit, der ganzen Länge nach, wechselweise fein gestrichet und fein geribbet ist. Wie viele Striche oder Ribben an der Zahl nun da seyn müssen, um diese und keine andere Art auszumachen, dürfte ich so wenig für gewiß angeben, als ich im Stande wäre für gewiß zu sagen, ob ein jeder besonderer Turbo turritus, nur bloß so und so viel Gewinde (anfractus) haben müsse, und nicht mehrere haben könne? Linne' giebt dem Dentalio Dentali zwanzig Striche! Die wechseln jederzeit mit den hervorstehenden Ribben, so niedrig dieselben auch sind, ab, und können folglich nie, als höchstens um einen mehr oder weniger, seyn. An der untern dickern Mundöffnung sahe ich dasselbe durchs Mikroskop an, und zählte bald zehn, zwölf, funfzehn u. aber nicht leicht zwanzig. Bisweilen schienen mir die Ribben zweispaltig zu seyn; ich untersuchte sie mit dem Vergrößerungsglase, und dasselbe überführte mich meines Betrugs; die Ribben waren alle einfach, ganz, rund, leicht, aber gedrängt beisammen, und die einen wechselweise höher, als die andern. Nichts ist daher aus diesem Grunde auf die Verschiedenheit der Art (Species) zu schließen, und eben so viel, das ist, nichts, aus jenem der Farbe. Da ich etliche Hundert von diesen beyden Meerzähnechen gehabt und untersucht habe, so habe ich klar gesehen, daß bloß das Alter die Farben verschafft. Anfänglich sind sie beyde weiß, dann wird beym Dentalio so gut als beym Dentali das dünne Ende rosenfärbig, oder auch noch höher roth als rosenroth; diese Körpe breitet sich immer tiefer herab aus, und überzieht bisweilen die ganze röhrenförmige Schale; liegt diese länger am sandigen



Strande, so bleicht sie sich, wird leichter, dann dunkler, hornfärbig, endlich aschgrau oder gar schwarzgrau und undurchsichtig, zuletzt kaltweiß und matt. Vermuthlich, ja ohne allen Zweifel, bauet sich der Steinhörner (Terebella), so wie alle übrige Bewohner der Schaalthiere, je nachdem er selbst wächst, sein eignes Haus, und bauet sich solches, nach Art seiner Conforten, aus eigenem mit Kalktheilchen vermischtem Saft, durch jährliche oder monatliche, ringelförmige Zusätze. Die Mischung des Saftes und der unfühlbaren Kalktheilchen muß vollkommen seyn, da man, so lange der Seewurm lebt und sein Gehäuse frisch ist, keine Spur dieses durch Zusätze geschehenen Wuchses wahrnehmen kann. Nach erfolgtem Tode des Erstern, und nach im Sande oder am Strande vor sich gegangener gänzlichen, oder anfangenden Abnützung, Zerkallung, Verkalkung u. des letztern, ist das in die Quere ringelförmige Gefüge dieses Schaalthieres allezeit beym Dentali, und noch mehr beym Entali, klar und deutlich zu sehen: anfänglich glaubte ich die meisten kanaanischen und noch einige Arten mehr, der Meerzähne aus dem adriatischen Meere zu haben, als das Dentalium corneum, politum, eburneum, striatum, bistriatum etc. Nachdem ich aber die gemeldeten Wahrnehmungen gemacht hatte, sah ich, daß die Zahl aller meiner Meerzähne bloß auf die zwei Arten des Dentalis und Entalis herabgesetzt werden mußte, und konnte demnach ohnmöglich mich entschließen, dem Beyspiele eines Martini hierinnen nachzufolgen. Recht hat indessen dieser unvergeßliche Gelehrte, wenn er sagt, daß die Schale dieser röhbrigen Zahnhörner, im Verhältniß mit ihrer Größe betrachtet, überaus stark und feste sey. Dessen ohngeachtet ist dieselbe doch nicht sicher genug für tausend Gefahren; auch unter dem Meere selbst zerbricht sie, bald nahe am dünnern, bald nicht weit vom dickern Ende. Wird dadurch der Steinhörner selbst wesentlich an seinem Leibe beschädigt, dann ist alles unwiederbringlich weg; geschleht hingegen bey so einem Unglücke dem Hausherrn kein besonderes Leid, so zieht sich derselbe in das größere Stück zusammen, und ergänzt dasselbe sogleich wieder. Daher sehen wir bey manchen Hunds- oder Wolfszähnen testam iterum, iterumque interruptum; aber eben deshalb würde ich diese zufälligen interruptiones nie als Kennzeichen der verschiedenen Arten mit einfließen lassen.

2. *Mytilus unguatus* Linn. Testa laevi, subcurvata; margine posteriore inflexo; cardine terminali bidentato.

Es ist recht sehr zu bedauern, daß die ältern Conchyliologen oft so ziemlich seltsame Abbildungen ihrer Schaalthiere — und allemal ungleich mehr, daß sie gemeinlich nur dergleichen wörtliche Beschreibungen derselben uns zurück gelassen haben,


ben, die sich mehr auf manche zufällige, als auf wesentliche und charakteristische Kennzeichen beziehen. Zwar lassen es die heutigen neuern an Fleiß, Kosten und Genauigkeit ihrer Zeichnungen und Malereien gar nicht ermangeln; da sie indessen die Originale dieser Seegeschöpfe oft nicht so wohl aus dem Meere selbst, als vielmehr aus den Cabinettern borgen, wo sie schon zu sehr verschönert, zu oft und zu viel gewaschen, gepußt, und dadurch vieler eigenthümlichen natürlichen Kleinigkeiten beraubt worden sind; und was die Hauptsache ist, da sich derer viele ohnmöglich an die ächte unter den Gelehrten allenthalben angenommene Linne'ianische Muttersprache gewöhnen können, oder wollen, so läuft es zuletzt allemal eben dahin aus, die Schwierigkeit, mit Bestimmtheit von den verschiedenen Schaalthieren zu reden, bleibt bey Anfängern noch stets eben dieselbe, und wir werden oft, leider durch eben dieselben, in noch weit mehrere und größere Schwierigkeiten verwickelt, durch die wir uns mit Grunde geschmeichelt haben, uns aus wenigern und kleinern Schwierigkeiten heraus zu helfen. Das adriatische Meer heget in sich allerhand Linne'sche Mieschuscheln, darunter insonderheit eine Menge des *Mytilus Edulis* und *Ungulatus*. L. ist Sie sind beyde, je nachdem sie jünger oder älter, frisch aus dem Meere gefischt, oder am Strande gefunden worden sind, von sehr verschiedener Größe und Farbe, auch haben sie beide manche gemeinschaftliche Charactere, nach denen man sie dann nicht unterscheiden würde, wenn sie nicht nach manchen andern sogleich und sehr leicht von einander zu unterscheiden wären. Alles kommt nur darauf an, daß man die einen so wohl als die andern getreu und genau anzeige. So wohl die eßbare, als die Klauen, Mieschuschel ist in die Quere verkehrt länglicht eysförmig, *valvulis cymbiformibus hinc, ex natium parte, admodum ventricoso gibbis, acuminato - convergentibus, inde ex opposita parte dilatato - ampliatis, rotundatis, compressiusculis*. Die obere Seite des Schaalthiers, ich verstehe den Rand der Schalen, an welchem das Schloß angebracht ist, läuft nicht von einem Ende zum andern, so wie bey *Mytilus Lithophagus*, oder wie bey den Streckmuscheln (*Pinna*), gerade fort, sondern sie ist mehr oder weniger rundlichterhaben gebogen, ragt gegen die Mitte zu mit einem zusammengedrückten Buckel hervor, und läuft beiderseits wieder ab; gegen den Angel zwar in gerader, doch schiefer Richtung und Linie, gleichlaufend mit dem ungezähnelten Schlosse, gegen das entgegen gesetzte Ende hingegen mit einem zirkelmäßigen, oder länglicht eysförmigen Bogen. Nun ist der untere, dem Schlosse entgegen gesetzte Rand, (worinnen hauptsächlich zwischen beyden der wahre Unterschied besteht,) bey dem *Ungulato* L. *postice*, das ist ohnweit des Angels, stark einwärts zurückgeschoben, mit einer winkelmäßigen Krümmung, und die



ganze über dem Rande daselbst aufstehende Schale von außen rundhohl eingebrückt oder ausgeschweift, so, daß wenn man die beyden Klappen neben einander auf ihre hohle Seite legt, sie die Figur eines gespaltenen Hufs machen, und zwischen denselben ohnweit der beyden Angel, die sich schließen, ein länglicht ovaler leerer Raum bleibt, welcher Umstand bey dem Eduli L. nicht statt hat; und dieß aus der Ursache, weil der untere Rand der Schale bey demselben, von dem einen Ende der Angel zum andern hin, gerade ohne alle Ausschweifung und Krümmung fortläuft, et quia latus testae inferius, posteriori margini imminens, extrorsum potius protuberat, als daß es hineinwärts zurückgeschoben seyn sollte, weshalben auch die beyden Angel sich nicht schließen, sondern vielmehr von einander abstehen. Linne' sagt zwar im Mus. L. U. p. 541. gerade das Widerspiel; des Ungulati nates sollten basi divaricatae seyn, und jene des edulis basi conjunctae; da aber alle Figuren seiner Litaten, ja selbst seine kurzen Beschreibungen Syst. Nat. T. I. Part. 2. nur mit meinen Beobachtungen übereinstimmen, so will ich vermuthen, daß die Anmerkung des besagten Musci nur verwechselt worden, und παρα μισασιμον geschehen sey; zumal da nach seinen eigenen Worten bey dem Ungulato nicht minder als bey dem Bidente, testae sit subcurvata, margine posteriore inflexo, und diese Beschaffenheit des untersten, ohnweit des Angels hineinwärts zurückgedrückten Randes, allezeit mehr geschieht, als die beyden Angel zu vereinigen, als sie von einander zu entfernen. Houttunn bey dem Statius Müller giebt eine sehr genaue Abbildung des Edulis, so wie Gualtieri (Tab. 91. lit. E. wo die beyden Schalen besonders ausgedrückt werden) eine gute des Ungulati L. Die eine und die andere dieser Miesmuscheln ist übrigens sehr glatt und glänzend, inwendig gegen den äußern Rand hin verschönbou und weiß mit silberigem Glanze in der Mitte. Von außen sind sie hingegen beyde, aber wohl verstanden, in ihrem hohen Alter, in welchem sie nimmermehr dünn, sondern dickschalig und schwer sind, leichter oder dunkler verschönbou. So sieht man sie nach vielfältigem Waschen, Reiben und Putzen in Cablietteren. Frisch aus dem Meere gefischt, und zwar in der Blüthe ihrer Jahre, sind sie ausserhalb mit einer feinen Haut (Epidermis) ganz überzogen, die bey dem Ungulato aus dem olivengrünen ins schwarze fällt, bey dem Eduli aber ganz schwarz ist, der noch überdem in seiner Jugend, zumal gegen die Angel hin, ins rothviolette spielt, und mit lauter, vom Angel gegen das entgegen gesetzte breitere Ende zu, ausgehenden lichten Strahlen bemalt ist, die man allemal zu sehen bekommt, wenn man die Schalen dem Lichte entgegen hält. Je nachdem man übrigens bey dem Ungulato die äußerste feine Epidermis, und mit ihr die dickere blaue Haut oder Rinde weg arbestet, kommt man auf einen Ueberzug, der von außen

augen wie das Silber der Perlmutter glänzt. Weder bey der einen, noch bey der andern habe ich je Striche gesehen, deren Zug vom Angel gegen das breitere Ende gerichtet gewesen wäre; ihre Striche, die den jährlichen Wuchs ihres Gehäuses andeuten, sind bogenweise gekrümmt, concentrisch, mit dem breiten äußersten Rande parallel, und setzen mit der rundhüblen Krümmung gegen den Angel hin, welcher zugeseht, und unterhalb, nicht auf der Seite des Schlosses sondern auf dem entgegen gesetzten Rande, beym Eduli mit drey, beym Ungulato mit 2. 3. 4. 5 Rädchen ausgekerbt ist. Ich besitze ein dergleichen Stück vom *M. eduli*, auf dessen Rücken der *Lepas balanoides* L. sich recht häufig, und mit ihm die *Sertularia Scruposa* L. angefest hat, und weder ein anders vom *M. unguato* L. das ganz mit der *Cellepora hyalina* L. überzogen ist, und beyde, der *Mytilus* und die *Cellepora*, sind mit der *Serpula Spirorbi* L. allenthalben bewachsen. Auf der Muschelbretsche sehen wir bey x. x. bloß das breitere Ende des *Mytilus unguatus* L. hervorragen, die übrige blaue Niesguschel steckt ganz in derselben vergraben.

2. Niemand sehe sich hier die Augen aus, um das Schaalthier zu erblicken, welches ich anzeigen will und nicht habe malen lassen, oder vielmehr, davon ich einige Plätze angemerkt habe, an denen es auf der Muschelbretsche zu sehen ist, und seiner außerordentlichen Kleinheit wegen eben nicht so leicht, wenigstens nicht genau und deutlich genug hat gezeichnet werden können. Es ist dasselbe der wahre *Nautilus Beccarii*, der sämmt Corsorten ic. nicht allein bey Rimini, sondern allenthalben im feinen Sande des adriatischen Meeres in Menge zu finden ist. Klein, wie ein Stäubchen besagtes Sandes, wird ihn schwerlich ein ungewohntes Auge, und noch viel weniger seine vielen Kammern, die Mundöffnung, die Nervenröhre ohne Vergrößerungsglas sehen und unterscheiden, und ich würde ihn gewiß in vergrößerter Gestalt haben malen lassen, wenn dieses nicht schon vor mir Plancus, Gualtieri, Adolph Murray ic. gethan hätten. Die, welche ihre kostbaren Werke nicht besitzen, können sich, um sich einen Begriff dieses kleinen Schiffsboots zu machen, mit meiner 2ten Figur lit. J. J. behelfen. Seine Beschreibung ist indessen folgende: *Nautilus Beccarii*. Testa minuta, lentiformis, supra obtuse convexiuscula, subtus in centro ipso subumbilicata, laevis, candida, nitens, spiralis polythalamia, Apertura obovata, anfractibus contiguis, tribus, quatuorve, aut quinis etiam, torulosis, geniculis insculptis, lunatis, parallelis, totidem internis diaphragmatibus, sive parietibus transversis concavo-convexis respondentibus. Siphunculo laterali, ad marginem spiratum interiozem sito, et ipso spirali, terete, tubuloso,



capillari, communi, concamerationes omnes pervadente. Nur muß ich noch anmerken, daß die mikroskopische Schiffsboot (vermuthlich wenn es nach dem Absterben des Bewohners lange am Strande gelegen hat,) bisweilen olivengrün, schmutzig gelblich, auch schwärzlich ist.

μ. *Serpula Spirillum* Linn. Testa regulari, spirali, orbiculata, pelliculosa, anfractibus teretibus, sensimque minoribus.

Soll ich mich blos an Cinnanni, den Linne' bey der *Serpula spirorbi*, und *spirillo* anführet, halten, denn des Plancus Wert besitze ich nicht, so wenig als jene des Listers, Basters und Verters, das Qualitersche hingegen kan ich nur bisweilen im fremden Hause, in'sgeheim und verstoßenerweise, nicht so wohl nützen als anschauen; dieser sonst so fleißige und wahrhaft gelehrte Graf beschreibt sie zwar beyde, aber diesmal so, daß man keinen wesentlichen Unterschied zwischen beyden aus seinen Beschreibungen borgen kann, und sein unglückseliger Kupferstecher scheint sich nicht einmal darum bekümmert zu haben, um auf einen aufmerksam zu seyn, oder doch solchen auszudrücken. Ich setzte mein Vertrauen auf den verdienstvollen Martini, bey dem ich denn auch die Beschreibung der übrigen Conchyliologen so glücklich war zu finden. Ich mußte sie alle, und ihn sammt ihnen, mit Schmerzen verlassen. Sie halfen mir wenig oder nichts, ja sie führten mich beynahe irre, da keiner von allen meldet, daß die Gewinde der *Spirorbi* oberhalb längst des innern Randes mit einer feinen Hohlzelle gestrichet oder ausgefurcht seyn, und Martini gleichsam für das Hauptkennzeichen des *Spirilli* die Querrunzeln annehmen will, die er doch nur im höhern Alter, nach meinen Wahrnehmungen, zu bekommen pflegt, weil bey der veraltenden Schale die jährlichen Zusätze des Wachses erst zum Vorschein kommen, vere rugae seniles. Ich blieb daher beim Linne', dessen Beschreibungen mit den Röhrschnellen vollkommen übereinstimmen, die ich so oft, und nicht selten beisammen, auf der *Ulva latissima* L. auf dem *Fuco vesiculoso* L. *Mytilo unguolato* L. und am häufigsten auf Cinnanni's Abete marino di Teosfrato, meines geliebtesten Scopoli *Conserva nodosa*, die ich, so lange ich nicht eines bessern belehret werde, für Linne's *Fucus concatenatus**) halte, gefunden habe. Hier unter μ sehen wir auf der

cavort.

*) Ich verstehe Johann Bauhins Cremenci Istris Abrotani — sive Thymi foliis. Tom. 3. parte 2. pag. 798. Cap. 16. welches unter allen mir bewußten Autoren Lobelius Oberv. p. 652. unter dem Namen *Quercus Marina* seu *Fucus marinus* foliis Abrotani maris am besten ausgedrückt hat. Ob nun Caspar Bauhins *Fucus folliculaceus* foliis abrotani zu Linne's *Fucus*

cavortschen Muschelbretsche die *Serpulam Spirillum* L. jedoch in etwas vergrößelter Gestalt, nicht mehr durchsichtig, nicht mehr weiß, sondern schwarzaschengrau, wie die meisten übrigen Schaalspiere, doch noch allezeit glatt und geglättet (laevis, et nitens). Sie mag sich, denke ich, auf die Muschelbretsche gelagert, und darauf festgesetzt haben, nachdem diese bereits gebildet war, und ist überhaupt kleiner, als die *Spirorbis* L. so klein auch diese ist, doch habe ich auch öfters gerade das Widerspiel gesehen. Alles kommt auf das Alter der einen oder der andern an. Ist die *Serpula Spirillum* noch klein, (so als der Kopf einer kleinen Stecknadel,) ist sie weiß, halbdurchsichtig, fast wie Elfenbein geglättet, besteht aus einem einzelnen Schnitzel, oder spiralem Gewinde, wächst sie, oder bauet sich ihr Bewohner sein Gehäuse ganz aus, bringt sie es bis auf deren drei; dann ist ihre Schale unterhalb zirkelförmig und flach, klebt fest an ihrer Aftermutter an, die Gewinde sind walzenförmig, fest an einander angeschlossen, geglättet, ohne alle Striche, Furchen, Ribben oder Querringe, und die äußern verhältnißmäßig dicker und höher, so daß die ganze Köpfensnede oberhalb nabelförmig vertieft ist; ihre Mundöffnung ist zirkelförmig. Nie wüßte ich mich zu befinnen eine größere gesehen zu haben, als die ist, die wir hier auf der Muschelbretsche sehen. So bald sie älter wird, und zumal wenn der Steinbohrer mit Tode abgeht, und sein Haus mehr und mehr verkalte, werden die ringelförmigen Merkmale seines vormaligen Wachses kenntbar und zu Querrunzeln, sie aber selbst schmutzig weiß, grau, oder anders gefärbt und durchsichtig; sie ist also wesentlich von der *Serpula Spirorbi* des Ritters linne' unterscheidbar, die gemeinlich größer ist, nie ganz oder nur halb durchsichtig, allezeit oberhalb längs des innern Randes der Gewinde (ergo non in medio dorso, nec ad marginem anfractuum exteriorem) mit einem, bisweilen mit zwei concentrischen Strichen ausgefurcht. Sonst ist zwischen ihnen kein Unterschied. Es hat also der verehrungswürdige Martini auch die *Spirorbis* ganz anders als ich und linne' gesehen. Sie ist den ihm glatt, er weiß nichts von einem canalartigen concentrischen Strich, oder verdolmetzcht ihn mit seinen Quersalten. Je nun.

2. *Trochus Varius*. Linn. Testa oblique umbilicata; convexa, anfractibus submarginatis.

Schade! daß linne', (stets meine sicherste Zuflucht in der Geschichte der Natur,) bisweilen auf gar keinen andern Naturforscher sich bezieht, und wo ers dann nicht

Salaginoides Mant. 2. p. 509. mit Recht angeführt werde? steht dahin. Gewiß ist es, daß das Istriatische *Cremenei* vom *Fucus crispus* loricatus nigricans Barrelier. ic. 1290. N. 1. einer mir bekannten Pflanze, sehr unterschieden ist.



nicht thut, noch über dem gerade die kürzesten Beschreibungen selbst bleibt. Es scheint kaum glaublich zu seyn, daß Bonani; Ginanni, Gualtieri etc. jene Schaal-
 thiere, die so häufig im mittelländischen Meere sich einfinden, nicht sollten berührt
 haben; ein Mann, der, so wie Linne, ganze vollständige Sammlungen solcher Besch-
 pfe zugleich vor Augen hatte, hatte freylich nicht nöthig, weder mehrere Umstände
 zu melden, als die hinlänglich waren ein jedes Einzele von allen übrigen zu unter-
 scheiden, noch Aurore anzuführen, deren Beschreibungen nicht die treffendsten sind;
 aber ein Anfänger, so wie ich, und zwar so ängstlich und behutsam wie ich, wo
 soll der Rath und Hülfe suchen, um auf einem eben nicht am stärksten bewanderten
 Pfade nicht irre zu gehen? Eine größtentheils in der Muschelbretsche vergrabene Kräu-
 selschnecke haben wir bey v vor Augen, sie ist gar nicht seltsam im adriatischen Meere.
 Mich dünkt, ich könnte sie so ziemlich sicher Linne's Trochum varium nennen, wie
 wohl mir zugleich scheint, daß sie beynähe in den letzten Zügen ihrer Schönheit liegt,
 wenn sie die Kennzeichen, oder vielmehr die matten und halbabgestorbenen Zeichnun-
 gen des besagten Trochi hat. Linne mag so etwas selbst vermutet haben, wenig-
 stens ohne alle Ursache wird er ihr schwerlich so einen schwankenden Namen, als
 Varius bedeutet, gegeben haben. Die bleiche Farbe ihrer Schaal kann ja weiß,
 so wie die ins Aschgraue übergehenden, und vom Gipfel bis zum untersten Bewin-
 de der Länge nach schief herab laufenden Streife, lichter oder dunkler, roth gewesen
 seyn. Jedoch ich will für diesmal nicht forschen, ob nicht etwa meine und Linne's
 gebänderte Kräuselschnecke mit Bonani's Nerita maculis sinuosis tessellata. cl. 3.
 Tab. 202. eine und eben dieselbe sey? Auch will ich für diesmal noch nicht gerade her-
 aus sagen, es scheine mir, Ginanni habe sie in ihrem mittlern Alter Tom 2. p. 9. lit. e.
 Tab. 10. Fig. 70. nicht am schlechtesten beschrieben, wenn er sagt: Trocolo di fon-
 do cenerino chiaro, con machie ondate pel lungo di color sanguigno, che lo ren-
 dono molto vago. Dann p. 10. lit. c. Tab. 11. Fig. 78. ohngeachtet diese letzte
 Figur sehr unglücklich ausgefallen ist, indem sie mehr einem Murex als einem Tro-
 chus gleich siehet. Wir wollen überdem diesmal gelten lassen, daß die vielen ginan-
 nischen Troccoli, und auch manche Linne'sche Kräuseln, wirklich specificis unter-
 schieden seyn. Endlich will ich auch alles gebührende Vertrauen in die tiefen Ein-
 sichten unsers unermüdeten Vorne setzen, und seinen so genannten Herrenmeister nicht
 einmal bezweifeln. Folglich ist mir nichts anders übrig, als daß ich meinen vermeh-
 nten Trochus Varius L. so beschreibe, wie ich ihn hier aus der cavortischen Muschel-
 bretsche finde. Magnitudine Trochus varius admodum est varia; Nuce Avellana
 nunc minor, multo alias eadem major: Testa illi spiralis, univalvis, ovato-co-
 nica,


nica, duplo fere latior, quam alta, anfractuum quinque ad sex, transverse striatorum, striis, lineisque elevatis alternis senis, septenisve; margine, binos quosque inter anfractus, intercedente, horizontali, depresso, plano. Pars testae inferior, seu aperturae regio, orbiculata; non concava, nec plana, obtusissime immo convexuscula; striis spiralibus concentricis plurimis exarata. Apertura ipsa rotundato-tetragona, intus argentata. Columella sub apice unidentata, id est denticulo obtuso simplice notata. Umbilicus centralis, hians, et communicans cum canali oblique lunato, seu arcu canaliculato columellae lateri extus adrito. Color testae extus albido griseus; fasciis longitudinalibus undatis a spirae apice ventrem versus, oblique, et arcuatim defluentibus, ac magis magisque latescentibus fuscis pictus. Meine Vermuthung ist nun, daß seine matten, dunkeln Farben ehemedem viel lebhafter gewesen, und folglich blos durch die Zeit, das Alter, oder andere Ursachen und Umstände abgenüßt worden, und bey nahe gänzlich abgestorben sind; denn ich besitze in der That viele dieser Art Kräuseln, die von der gleich beschriebenen in keinem Stücke abgehen, nur daß sie ganz weiß, die besagten Strahlstreife hingegen bald karmin, bald blut; oder rosenroth sind; habe ich die dunkel und schwärzlichgestreiften naß gemacht, so hat man die ehemalige dunkelrothe Farbe derselben deutlich annehmen können: gemeinlich habe ich dieser Streife nur fünf, bisweilen sechs, seltner aber doch auch mehrere gezählet; sind ihrer weniger, dann sind sie auch viel breiter, zumal am untersten bauchigern Gewinde. Der weisse Zwischenraum pflegt auch bisweilen mit mehreren oder wenigern blaßrothen Tüpfeln gesprenkelt zu seyn, und dann würde man dem ersten Ansehen nach glauben, die mit den Querstreichen abwechselnden lineae elevatae wären klein gefeßt (crenolatae), ob sie es schon in der That nicht sind. So bald das äußerste, gemeldetermassen gemalte Häutchen für sich selbst wegfällt, oder mit Fleiß abgeschält wird, erscheint besagter Kräusel in ganz neuem Puge; er ist, als wäre er ganz versilbert, weißglänzend, noch kann man die mit den Querstreichen abwechselnden feinen Querribben deutlich abnehmen, aber dieselben scheinen nicht mehr gefeßt zu seyn; sie sind ungezählet; sie sind ganz, wodurch denn der angezeigte Augenbetrug klar erwiesen wird. Anfanglich war ich der Meinung, sie könnte Linne's Trochus Magus seyn; vielleicht ist sie es auch? Nein; so schen mit Indessen Born zu denken, und Born's Gewährung ist freylich bey mir von starkem Gewichte; aber ich habe zuletzt bey der Medicinigen die anfractus supra obtuse nodulosos, oder wie es Linne' im Museo Ludovicae auslegt: anfractus gibbos, supra longitudinaliter nodosos, nie gefunden, nie gesehen.



ξ. *Turbo striatulus*. Linn. Testa subcancellata, turrata, anfractibus con-
tinguis, cingulisque varicosis interceptis. Ist bereits oben, und zwar Fig. 6. lit.
s. s. unter den gutartinschen Versteinerungen vollständig beschrieben worden; dahin
verweise ich dann meine Leser, um alle unnöthige Weitläufigkeit zu vermeiden.

π. *Murex clathratus*. Linn. Testa oblonga, caudata; plicis longitudinali-
bus submembranaceis sulcata. Angenehm war die Ueberraschung, mit der ich diese,
seither blos im isländischen Meere gefundene Stachelschnecke, oder soll ich sagen Splin-
del, oder gefaltene Schraube? auch in unserm adriatischen Meere gesehen habe. Es
ist meines Erachtens gar kein Zweifel, daß, wie die verschiedenen heissern oder frosti-
gern Länder ihre verschiedenen und eigenthümlichen Pflanzen hervorbringen, eben so
die verschiedenen Meere ihre gewissen eigenen Schaalthiere in sich hegen können. Daß
indessen alle, so wohl Pflanzen als Thiere, denen die verschiedenen Naturkündiger gewisse
von gewissen Ländern, Bergen oder Meeren geborgte Beynamen gegeben haben, blos
denselben, mit Ausschließung aller übrigen, elgen seyn sollten, das glaube ich so wenig,
als ich glaube, daß das *Erigeron Canadense* L. blos durch Verpflanzung cana-
discher und virginischer Saamen so allenthalben in Europa soll verbreitet worden
seyn. Wahrscheinlicher ist es, daß manche Pflanzen, Thiere und Fossilien, wo nicht
überall, doch an mehreren Orten zu Hause sind; nur hat man es nicht zu einer und
eben derselben Zeit überall gewußt, oder sich beflissen, es zu wissen. Wären keine
Elusius, Kramer, Scopoli, und Jacquin, keine Vorn, Hacquet und Schrank u. sei-
ne Voda, Orsellini, Ischardting, Müller und Ruprecht in den kaiserlichen Erbländern
gewesen, was wüßte man von den Schätzen der Natur dieser glücklichen Staaten?
Sind sie auch schon erschöpft? Welche reiche Welde wird die Wißbegierde unserer
Nachkommen auch nur in Kärnthén noch finden! Der *Murex Clathratus* L. sey
nun zu Hause wo-er will, so ist er ohngefähr so groß, als der *Turbo striatulus* L. oder
die kleinern *Turbines Clathri*; seiner Gestalt nach habe ich hingegen nichts ihm ähnl-
cheres gesehen, als den *Turbinem lacteum* L., wohl verstanden, bis auf die Mundöf-
nung und Größe. Testa spiralis, univalvis, oblonga, fusiformis, turrata, laevis,
plicis longitudinalibus exstantibus, alternisque sulcis impressis percursa, anfracti-
bus sex aut septem; apice subglobofo, glabro; apertura oblongo-ovata, integra,
inferne coarctata in caudulam brevem, rectam, tereti-canaliculatam, integram.
Plicae ad anfractuum marginem superiorem, apicem testae respicientem, infractae,
sive incurvae. Coloratum aliter nondum vidi, quam ex griseo magis magisque
nigrescentem. Nullus tamen dubito, aliter a natura ipsa coloratum quondam fuisse.

σ. Ech-



- σ. *Echinus saxatilis*. Linn. *hemisphaerico-depressus: ambulacris denis, paribus approximatis; areis longitudinaliter verrucosis.*

Nichts als ein kleines Stück eines bereits zertrümmerten, und seiner Stacheln gänzlich beraubten Seeapfels, oder Meerigels, des *Echini saxatilis* L. ist hier mit in die zusammengelesimte Mischung dieser Muscheltreische gekommen. Ich habe denselben bereits in der siebenten Figur d d nach aller Weitausdehnung beschrieben, mithin hier kein Wort mehr.

τ. *Cellepora hyalina*. Linn. *Cellulis subglobosis diaphanis, ore obliquo simplici.* Linné scheint diese Glascoralle bloß auf der untern Oberfläche seiner lederen coralle (*Millepora coriacea*. L.) gefunden zu haben; ich aber häufig auf allerhand Schaalthieren u. Hier hat sie sich auf der untern hölzernen Seite der oben beschriebenen Venusmuschel festgesetzt. Gleich einem feinpapiernen Häutchen, breitet sich diese zwar kalkartige, jedoch bis zur Durchsichtigkeit dünne, zellenförmige Stielrinde über dem fremden Körper, nach Beschaffenheit desselben, unordentlich aus, auf dem sie aufliegt. Sie ist kaum einen vierten Theil einer Linie hoch, dessen ohnerachtet besteht sie doch in der That aus zwey sehr zarten kalkartigen Häutchen, die weislich, beynahe wasserklar, und wie in Del getränkt gewesenes Papiert halb durchsichtig sind; davon das untere fest an dem fremden Körper anhebt, das obere hingegen in lauter länglicht halbkuglichte zusammengewachsene Erhöhungen eingetheilt ist, in so viel nämlich, als der Zwischenraum zwischen beyden, krug- oder eysförmige, umgestürzte, leere und nirgends communicirende Höhlen enthält. Das sind die besondern Fächer oder Gehäuse der Polypen, in denen jedem sein Bewohner sein eigener vollkommener Herr zugleich ist. Da nun aber diese Gehäuse nicht sowohl kugelförmig, als vielmehr länglicht eysförmigen umgestürzten Krügen ähnlich sind, so haben dieselben auch ihre zirkelförmige ungerandete Mundöffnung, nicht in der Mitte am Wirbel, sondern in der Vertiefung des Umfanges nach dem einen Ende oder Polus des ellipsoideischen Wohnsitzes hin. Wäre es hier nicht außer seinem Orte, und um alle überflüssige Weitausdehnung zu vermeiden hauptsächlich zu thun, so würde ich meinen Lesern ein Paar viel schönere, viel künstlichere und viel feinerere dergleichen Zellencorallen, als diese Glascoralle ist, vorlegen.

φ. *Ostrea pusto*. Linn. *Testa aequalvi, radiis 40. filiformibus, uniaurita.* Nichts ist wohl schöner zu sehen, als die so verschiedentlich gefärbten, und so prächtig gezeichneten kleinen Kammuscheln, oder Mäntelchen, alle beisammen. Das adre-




attische Meer heget Ihrer eine sehr große Menge in sich; sie sind bläswellen kaum so groß als eine Pfaisole, überhaupt etwas kleiner, oder größter, als eine gemeine Haselnuß, nur nie so gewölbt und bauchig, wie diese, vielmehr flacherhaben. Hier sehen wir eine mit in der Muschelbretsche von dunkler Granatenfarbe, aber auch der geht bereits das einzelne Ohr ab, das sie allein zu haben pflegen. Ich besitze die aller schönsten von allerhand Farben, einfarbige und buntschekichte, Blut-, Zinnober- und Rosenrothe, Gold- und Strohgelbe, Bleich-, und Dunkelgranatenfarbige, auch Roth-, hyacinthene, lichter gelbe mit pomeranzenfarbigen länglichten, und nach allen Seiten wellenförmig hinschlingelnden Flecken, Weißlichte mit dergleichen dunkelgranatenfarbigen Flecken, Mennigrothe mit schwarzrothen bänderförmigen Flecken, Weißgrau mit lauter kleinen vierlinichten granatenfarbigen Flecken gesprenkelt, dergleichen mit gelben Angeln ic. Ihre beyden Klappen oder Schalen sind gleich groß, gleichseitig und gleich flacherhaben, so ziemlich dünne, und gegen das Licht durchscheinend; hätten sie gar keine Ohren an der Seite des Schlosses, so würde ihre Gestalt vollkommen verkehrt länglicht eysförmig seyn; denn der zirkelrunde, feingekerbte äußerste Rand derselben, nachdem er beyderseits gegen die Mitte gekommen ist, läuft gähling beyderseits in gerader schiefer Richtung, gegen das Schloß hin, zusammen, und bildet den so genannten Angel. Fünf bis sechs und dreyßig (vielleicht auch bisweilen, wie Linne vermeynt, vierzig) feine Striche gehen von besagten Angeln strahlenweise über der niedern Wölbung des Rückens gegen den äußersten Rand aus, und wechseln mit eben so vielen walzenförmigunden feinen Ribben ab, die allezeit weich und glatt, nur bläswellen an der Seite des herausstehenden Ohres, wegen mancher aufgestösperten Schuppen, rauh anzufühlen sind. Bis hieher ist an der einen und der andern Klappe gar kein Unterschied. Das Schloß besteht bekanntermassen, wie bey allen Austern, in einem verkehrt eysförmigen Grübchen. Nun ist bey den Kammuscheln weder ein Vorder- noch ein Hinterzwinkel (vulva, anusve nullus) sondern statt derselben ist sowohl die Hinter- als Vorderseite (latus anticum et posticum) mehr, oder weniger geflügelt, das ist mit einem herausstehenden Ohrläppchen versehen, wodurch sie denn unsere Einbildungskraft entweder mit einer Tobacksdose, oder mit einem größern oder kleinern Mantel vergleichet. Die Hinterseite unserer Zwergkammuschel (des Mäntelchens) ist gekümmelt, das ist, besitzt blos einen Anfang eines Ohrläppchens, oder besser zu reden, es scheint als wäre das linke Ohrläppchen derselben abgebissen, oder abgekürzt worden, so, daß am Hinterrande blos ein mit demselben gleichlaufender Wulst oder Striem hervorragt. Hingegen ist die Vorderseite des Mäntelchens allezeit mit einem herauslaufenden plattgedrückten Kragen oder



oder Ohrlappchen versehen; doch mit dem Unterschiede, daß dasselbe bey der untern Klappe ein schiefes flaches Dreieck bildet, das am Rande ganz und ungeteilt ist, und sich unausgeschweift an die Vorderseite anschließt, wo im Gegentheile jenes der Oberklappe zwar weiter hinausläuft, aber doch etwas schmaler ist, und nachdem es sich mit einem zirkelförmigen Bogen hinunter gekrümmt hat, sich nimmermehr an den Vorderrand anschließt, sondern vielmehr mit einer rundhohlen Ausbuchtung hineinwärts sich wieder zusammenzieht; deshalb lassen auch jederzeit das selbst die beyden noch so gut geschlossnen Klappen, und damit den Feinden des Bewohners das Thor zu demselben daselbst nicht ganz offen und unbewahrt verbliebe, so hat die Natur den Vorderrand dieser Klappe mit einer sägeförmigen Palisade von fünf bis sechs hervorstehenden Zähnen bewaffnet. Und nun genug von der cavortischen Muschelbretsche! Denn wollte ich alle darinnen befindlichen Schaalhiere beschreiben, wann würde ich damit fertig?

Zehnte Figur.

Den Mergelschiefer, (*Marga tophacea nigro-caerulescens. Wallerii,*) der die bleybergischen Gruben überhaupt, und die St. Oswaldsgrube insonderheit schon zum drittenmale durchqueret hat, habe ich bereits oben beschrieben. Seine Eigenschaften, zumal im Feuer und mit Scheidewasser, zeigen genug an, daß er nicht sowohl unter die Schiefer des Wallerius, als vielmehr unter desselben Mergelarten verwiesen werden müsse; und ich bekenne es aufrichtig, ehe ich mich hätte entschließen können daraus einen Schiefer zu machen, bloß weil er ein schieferartiges Gefüge hat, würde ich ihn allezeit eher unter den Arten des Margodes Waller. aufgesucht haben, wenn ein wahrer wesentlicher Unterschied zwischen dem Margode *argillaceo tophaceo*, und der *Marga tophacea Wall.* ist. Hier bey α lege ich nun meinen Lefern ein Stück desselben vor, so wie er aus der Grube kömmt: liegt er einige Zeit auf den Halben, und daß die steten Abwechselungen des nassen und trocknen Wetters auf ihn gewirkt haben, so blähet er sich auf, zerspringt, bestimmet unordentliche Risse, und steht ohngefähr so aus wie bey β , bis er in einen Thonmergel zerfällt. Er ist es, in welchem der sogenannte opalsirende bleybergische Muschelmarmor in der 116. Lachter des St. Oswaldskolles eingebrochen ist. Er, in welchem vom besagten Stollen, auf 178 Lachter im Morgen, zwischen dem Drensfaltigkeit's. und St. Christoph's. Stollen im innern Bleyberg, im äußern hingegen bereits in der 26 Lachter des Franciscus. Stollen, allerhand Schaalhiere, wie wohl nie mit dem opalsirenden,



den, oder vielmehr pfauenschweifigen Glanze, einzeln oder gewöhnlich in sehr seichten Lagen, gefunden worden sind. Um auch diese nicht ganz mit Stillschweigen zu übergehen, wiewohl sie meistens dünnschalig, und so durchgebeugt sind, daß, wenn sie naß geworden, und darauf austrocknen, sie alsogleich sich spalten, zerpringen und wegfallen; so habe ich zum Muster ein Stück gewählt, auf welchem wir folgende sehen: Bey γ γ eine, und zwar sehr dünnschalige Muschel; zart und fein wie Papier, zerbricht sie sehr leicht; sie ist von weißer Farbe; ohnfehlbar wird sie auch mehr oder weniger durchsichtig gewesen seyn, geht dann ins Bräunliche und so fort ins Schwarzgraue über, bis sie ganz verkalft und mattweiß wird. Ihrer Gestalt nach stellt sie ein längliches verkehrtes Eγ vor (oblongo-obovata), ist runderhaben (convexa), und der ganzen Länge nach mit sehr feinen, seichten, fadenförmigen oder haarförmigen Strichen durchzogen; da nun diese Striche vom abwärts umgebogenen und unterhalb durchlöcherten Angel bis zum äußersten Rande hinreichen, ist es ganz natürlich, daß derselbe sehr fein gefeibet, oder gezähnet seyn müsse. Wenn ich die wahre Linne'sche *Anomia Terebratulam*, die ich sehr gut kenne, und die von der *Anomia caput Serpentis* L. nicht anders unterschieden ist, als daß sie hinten an der obern Klappe dreγ, an der untern aber nur zwey sehr feine und niedrige Falten in die Länge hin hat, sonst aber ganz glatt und geglättet ist, ohne alle Striche, wenn ich, sage ich, die *A. Terebratulam* L. mit ins Gedächtniß zurück führe, und die Linne'sche wörtliche Beschreibung der *Anomia caput Serpentis* reiflich überlege, so sage ich ganz aufrichtig, daß ich an der Meinigen hier beschriebenen Muschel keine andere erkennen könne, als die Bastardmuschel, die Linne's *Anomia caput Serpentis* genennet, und unser schätzbarster Born, durch Linne's falsche Etatation des Qualiters irre geführt, unter dem Namen der *Anomia truncata*, abgebildet hat. Ein tomentum, Wolle, oder feinhaarichtes Wesen habe ich freilich an der Meinigen nicht wahrgenommen; aber wer wird es auch an Schaalstieren suchen, die Jahrhunderte unter der Erde gelegen haben?

Zweitens sehen wir bey δ δ abermal eine zwoschallige, ziemlich dünne, aber doch steife, außerhalb stark gewölbte, von innen hingegen eben so stark vertiefte, rundlicht drepeckige und mit concentrischen Querstichen durchzogene Muschel, soll sie nicht etwa meine oben beschriebene Korbmuschel (*Macra varia*) seyn? So wenigstens denke ich.

Bey ε sehe ich eine in die Quere länglicht ovale, mit concentrischen Querstichen durchzogene zwoschallige Muschel, die ich nicht im Stande war zu bestimmen.

men. Ich sann und sann lange, sann auf Alles, aber vergebens, entschließen konnte ich mich nicht, wenigstens mit keiner Gewissheit oder doch starken Wahrscheinlichkeit nicht. Andern aber für Gewissheit verkaufen, oder nur anbieten was mir selbst ungewiß ist, schämte ich mich. Ich hatte Gründe, eine kleine junge *Arcam barbatam* L. zu vermuthen, aber ich hatte auch noch stärkere Gegengründe dawider. Der *Mytilus anatinus* L. fiel mir gleicherbings ein, auch die *Mya pictorum* L. doch konnte ich nie was Kluges, vielweniger was sicheres herauswiskeln; mithin weg damit! *Musculus*, oder *Musculit* war zuletzt freylich mit Vielen leicht zu sagen; aber so willkührliche, und, damit ichs recht deutsch sage, so unbestimmte Bestimmungen helfen bey mir nichts, und wer hat auch seither daraus etwas gelernt? Gewisser als der vorigen, ja ganz gewiß ist der Geschlechtsname der Muschel bey ζ ; außer allem Zweifel ist sie eine Tellmuschel, (*Tellina*) die Vorderseite der Schalen ist schief nach der Länge hin, gleichsam umbogen, die Klopfen in die Quere länglich und oval, ganz flach erhaben, als wären sie platt und zusammengedrückt, übrigens sehr dünn, schaalig, mit sehr feinen concentrischen Querstücken durchzogen, und die Spitze des Angels ragt so etwas über den Vorderrand hervor; wäre sie an der Vorderseite nicht eben so breit und abgerundet, als an der Hintern, so würde ich gar kein Bedenken haben, daraus die im adriatischen Meere so häufig sich einfindende fleische oder rosenrothe Zungfer (*Tellina incarnata* L.) zu machen. Nur die Abbildung der bornischen scharfrandigen Tellmuschel, oder wie sie Andere nennen Rosenduplett, schrecket mich ab, daß ich auf die linne'schen *Tellinam planatam* nicht denken darf, und sonst finde ich in Linne'n keine, die der Meinigen gleich sähe. Zwar kam mir stark zu Sinne, Borns Scharfrandige könnte etwa nur eine Abänderung der linne'schen *Tellina albida* seyn? Aber die unumschränkte Hochachtung, die ich gegen so einen Gelehrten hege, als Born ist, läßt kaum zu, daß ich seine Gewähre rüge.

- „ *Helmintholithus pyritasaneus* Nautili bifurcati, marga argillacea indurata nigro caerulescente Wallerii factus. Linn. Varietas *Helmintholithi* Hammonitae Nautili deperiditi? an uspiam adhucdum existentis? Syst. N. T. 3. pag. 162. No. 1.

So wenig die Schaalthiere der cavorschen Muschelbretsche (wenigstens bis zur Stunde) wahrhaft versteinert sind, eben so wenig verdienen in der That selbst jene der bleybergischen, den Namen wahrer *Helmintholithe*. Ganze Jahrhunderte mögen sie bereits unter der Erde gelegen haben; gräbt man sie indessen noch heut zu Tage aus, so sind ihre Gehäuse größtentheils noch unverfälscht, Gestalt, Farbe, Befüge und



und was nicht noch alles, ist an denselben noch deutlich zu erblicken. Wir können sie daher für die wahren Urbilder und Originale jener Schaalthiere ansehen, die das Meer belebt haben, daß einst Kärnten unterteufet hat. Unterdessen da sie meistens theils ganz zertrümmert sind, ihre einzelnen Trümmer aber mehr absteifen, zu Kasse zerwittern, und zerfallen; zum Theile auch wo sie noch unverweset vorhanden sind, ihre äußere Oberfläche mit anflügligem, oder zu seinem Bleche gleichsam geschlagenen Eisenkies, die innere hingegen mit vielfarbigen sogenannten pfauenschweifigen Ueberzug mineralischer Dünste verlarvet ist, und sie folglich nicht mehr allerdings den Namen echter natürlicher Schaalthiere verdienen, und behaupten können, zumal da sie, statt des verstorbenen Hausherrn, mit Thon, Mergel, Kalkspat oder Kalkstein gefüllt worden sind; so können wir sie allemal noch in die Zahl der versteinerten Schaalthiere aufnehmen, und für Helmintholithen gelten lassen. Solch ein Helmintholith ist nun der hier abgebildete. Er stellt ein vollkommenes Schiffsboot vor, das dem Nautilus Pompilius L. gleich sieht, wenn es schon von demselben gänzlich unterschieden ist. Ich will nicht sagen, daß seine ehemalige Schale zu Schwefelkies geworden sey, das möchte ein zu starker (wo nicht gar unmöglicher) Sprung der Natur, ein salto mortale seyn. Der Kies konnte doch allemal noch die vormalige Schale des Schiffsboots, bevor sie verweset ist, mit einem dünnen Plättchen oder Blech überziehen, und so lange er noch weich war, im Augenblicke des Uebergangs vom flüssigen in den festen Stand, die ganze Gestalt und Zeichnung des Schiffsboots selbst annehmen; dann haben wir ganz natürlich das Petrificatum pyriticum conchyliorum, cornu Ammonis referens Waller. Tom. 2. p. 134. N. 8. lit. d. das ist ein dünnschaliges tiefiges, mit Mergelthon gefülltes Schiffsboot, das dem Pompilius zwar gleich sieht, aber beiderseits im Mittelpunkte sehr tief genabelt ist, am Rückenrande des äußersten bauchigern Gewindes zwei gleichlaufende, und mit dreyn erhabenen feinen Ribben abwechselnde Furchen hat, dessen Nervenröhre hart an den äußern Rückenrand angeschlossen, parallel mit demselben durch alle Kammer fortläuft, und dessen innere Querblätter wellenförmig, die äußere Oberfläche hingegen beiderseits theils mit seichten Querrunzeln, theils mit feinen, schlängelnweise fortlaufenden Querstrichen durchzogen sind. Diese vom Mittelpunkte des Nabels beiderseits strahlenweise ausgehenden und sich wellenförmig über den Gewinden fort schlängelnden Querstriche, je mehr sie sich vom Mittelpunkte entfernen, desto größer und geräumiger werden zugleich ihre wechselweise rundhohlen, und runder habenen Krümmungen, doch sind sie noch stets ganz und ungekerbt, so bald sie aber dem äußern Rückenrande sich einmal mehr nähern, so werden dieselben länglich



ey, oder auch lanzettförmig, und beyderseits sägeförmig gezähnt. Die systematische Beschreibung dieses metallisirten Schiffsbootes könnte etwa folgende seyn: Nautilus testa pyritacea spirali polythalamia aurato nitente, cornu Hammonis circumscriptione orbiculatum, integerrimum, centroque utrinque umbilicatum, referente, Apertura ovato-subcordata; Anfractibus contiguis, teretibus, transverse subcostato-rugosis, undulatoque striatis, spiraliter intra extimum convolutis, confepultisque; Margine dorsali extimi (non reliquorum) lineis tribus elevatis, sulcisque intermediis binis exarato; siphunculo laterali ad marginem exteriorem sito, communi, undata concamerationum diaphragmata permeante omnia.

«. Eine der gemeinsten, in dem bleybergischen Mergelschiefer am öfsteren und häufigsten vorkommenden zwoschaaligen Muschel, ist wohl diese; zum Unglücke ist sie gerade auf diesem Stücke nirgends als bey » zu sehen, und auch da nicht so wohl die Muschel selbst, als vielmehr der rundhohle zurückgelassene Eindruck derselben. Sie ist unstreitig eine Bastardmuschel (*Anomia*); aber welche? Wer wird dieß mit Bestimmtheit sagen? Listers Werke, das tessinische Musäum und die meisten, auf die Linne'sich bey seinen *Anomii*s bezieht, besitze ich nicht, und andern, ich sage es offenerzlig, traue ich nicht ohne Mißtrauen, weil ihre Abbildungen oft nicht weit her, und die Beschreibungen nach keinem systematischen Geschmacke abgefaßt sind. Ich pflege die Beschreibung des Naturforschers der Abbildung des Malers allezeit vorzuziehen; aber die traurige Erfahrung hat uns doch schon gelehret, daß man bisweilen mehr Vertrauen auf den Pinsel des letztern, als auf die Sprache des Erstem setzen könne. In den bloß zum Ersäunen grossen Sammlungen, zumal der verschiedenen Versteinerungen, welche Hülfsmittel zur Aufklärung oder zur Fortpflanzung der Wissenschaften, oder endlich zur Ergänzung der Erdbeschreibung und zur Aufnahme der Geschichte der Natur finden wir? Kurze, zu sehr allgemeine, willkührliche, unsystematische und nicht leicht, wie sie sollten, bestimmte, eher bloße Namen, als wahre Beschreibungen. Ein glatter Discit, ein sehr kleiner Phacit, wunder schöner Vorzeianit, quergestreifter Globosit, Coquille differente, Boucarde ventruë, Moule ouvert, Petit moule, Petoncle rhomboïde!! Hat mich das Unglück in dergleichen Cabineten geführt, so schauete ich freulich groß darein, und wünschte bey mir in'sgeheim: o, hätte es nur lieber gehelfen, die und die Linne'sche, oder bornische *Cypraea* insonderheit! Rumpfs, Bonannis oder D'Argenvilles dieser, und diesen Pecten, Mytilus, Turbo! oder daß man nur zu lesen hätte: *Helmintholichus hujus* aut *illius Cardii L. hujus* aut *illius Helicis L. etc.* Nun diesem Unwesen wird sicherlich noch

D

durch



durch den unermüdeten Fleiß, Einsicht und Genauigkeit der heutigen Gelehrten abgeholfen werden. Unsere Vastardmuschel ist dünnschalig, schiebräunlich, mag eher dem weißlich gewesen seyn; nicht tellerförmig, auch nicht vollkommen eysförmig; am abwärts umbogenen Angel mehr zusammengezogen, breitet sie sich mehr und mehr in die Quere aus, so (ich rede wie sie gemeinlich beschaffen ist, nicht bloß wie sie bey dem gegenwärtigen unvollkommenen Abdruck erscheint) daß sie gegen den äussern Rand hin zweimal so breit, als übrigens lang ist. Gewölbt unter dem Angel, verschächt sie sich je mehr und mehr am Rande, der ganz und zusammengebrückt ist. Fein ist die Rückenseite, und zwar stets in die Länge hin gestrichet. Bin ich recht daran, wenn ich sie für die *Anomia striatulam* L. halte? Doch muß ich noch der Wahrheit zur Steuer bekennen, daß ich bey manchen durchs Vergrößerungsglas sehr feine, und noch feiner gekerbte Ribben, und gegen den Rand zu auch fadenhafte Querstriche (vielleicht nur *ex appositionibus annuis*?) wahrgenommen habe. Soll sie deshalb die *Anomia crispa* L. seyn? oder befinden sich etwa beyde in unserm Mergelschiefel?

§ 9. Hat derselbe unter freiem Himmel eine Zeitslang auf der Halbe gelegen, daß er bey den steten Abwechselungen des Dunstkreises anfang mehr oder weniger zu zerfallen, so habe ich in demselben öfters ganz deutliche Abdrücke einer kleinen, der Länge nach stark geribbten Herzmuschel (*Cardium*) angetroffen, aber nie die Schalen selbst. Hat nicht etwa das Original davon die ginnassische *conca minore fina bianca lucida* etc. Tom. 2. Tab. 20. fig. 135. seyn können?

Fiffte Figur.

In dem dritten, und folglich Hauptmergelschiefel des St. Osvaldsfollen ist endlich nach 116 Jahren der große Keil des berühmten bleybergischen so genannten opalifirenden Muschelmarmors eingebrochen. Hier ist er nach der Natur gemalt. Bey α sehen wir die eine, bey β die andere Seite. Sehr wenig frappantes feiher. Auch saßen unsere guten Bergknappen so wenig schönes, und so wenig sehr kostbares daran, daß sie ihn sammt dem Mergelschiefel über die Halbe hinstürzten. Bey $\delta \delta \delta$ ist der schwarze oder blaulichtschwarze gleichförmig derbe Kalkstein von unfühlbaren Theilchen zu sehen. Sein Strich und Pulver ist welschschgrau. Dem frischen Bruche nach $\delta \delta$ würde man ihn für einen Kieselstein halten, denn dieser ist, wie beyh Zapis, oder Chalcedon, muschlicht. Aber genug hievon, ich habe ihn schon oben beschrieben. $\delta \alpha$ zeigt die Mächtigkeit dieses Stücks an, die zween gute Quersfinger dick.



dick ist. Die weissen Querstreife, die an der Höhe oder Mächtigkeit des Stückes zu sehen sind, sind der senkrechte Durchschnitt der Blätter der verschiedenen eingeschlossenen und gemeinlich schon zertrümmerten Schaalthiere. Sie sind häutigen, das ist, blättrigen Gefüges, wie mans durchs Vergrößerungsglas leicht sehen kann, und die Natur der Schaalthiere mit sich bringt; dessen ohngeachtet opalsiren, ich will sagen, spielen sie nie mit schielenden prächtigen goldgrünen oder goldrothen Feuerfarben. Bey α bricht körniger Schwefelkies ein. Die entgegengesetzte Seite bey β bietet gleichfalls dem Auge nichts sonderlich schönes dar. Wir sehen hier den im vorhergehenden bereits beschriebenen Thon, manche in demselben halb vergrabene und ebenfalls schon beschriebene Schnecken und Muscheln, dann eine Menge allenthalben zerstreute, theils verkalkte, theils abgestorbene, schmutzig weisse lichte Blättchen zerbrochener Schaalthiere, und mithin ist zuletzt dieses ganze merkwürdige Fossile nichts anders, als, wie ich gleich Anfangs gesagt habe, ein aus Kalkstein, Thon, Kies und zertrümmerten Schaalthieren zusammengeleimtes Gemenge, eine wahre Muschelbreitsche. Begierig zu sehen, was doch endlich hinter diesen weissen Querstreifen stecken konnte? zumal wo sie in derbem dichtem Kalkstein selbst eingeschlossen waren, wie hier bey γ , nahm ich meine Zuflucht zum Eisen und Schlegel, spaltete den Kalkstein damit, hart an so einem Streife, sogleich sprang mit muschellichem Bruche ein Stück desselben weg, und dann sah man das darunter vergrabene, und mit goldbrother Feuerfarbe glänzende Blat eines Schaalthiers, dessen Beschlecht und Art man ohnmöglich erkennen, ja nicht einmal errathen konnte. Bey nachher öfters wiederholtem Versuche bekam man nicht nur allein goldbrothe, sondern auch goldgrüne, bisweilen auch aus goldrothen in goldgrüne, und hinwieder übergehende, oder wenigstens sich verlierende dergleichen Blätter.

Zwölfte Figur.

Nur mehr dadurch noch gereizt, ließ ich einige Stücke dieser Muschelbreitsche der Quere nach in Messerdicke Plättchen schneiden, und fein poliren. Nun sah man erst im vollen Glanze die majestätische Pracht und Herrlichkeit dieses für sich selbst elenden Muschel, Kalk, und Thongemengfels; grössere oder kleinere, breitere oder schmalere, längere oder kürzere, (je nachdem der Durchschnitt glücklicher ausfiel) aber lauter, zwar nicht wahrhaft opalsirende, sondern goldgrüne, goldgelbe, goldbrothe, aus dem goldrothen durchs goldgelbe ins goldgrüne gleichsam übergehende, und mit flammendem Feuerglanze flimmernde Flecken kamen zum Vorschein. Meistentheils war wohl nichts



an denselben zu sehen, das nur die mindeste Aehnlichkeit mit einem Schaalschlere angezeigt hätte; bisweilen waren sie aber dennoch so einigermaßen gebildet, und man sieht bey *γγ* und wieder bey *δ* so ziemlich deutlich eine gewisse bestimmte Zeichnung, die uns allemal berechtigt, nicht ohne allen Grund zu mutmaßen, daß das, so nachher immer mit diesen prächtigen Farben spielt, figurirt seyn, und folglich eine gewisse bestimmte Gestalt und Zeichnung haben müsse. Ich werde bald viel klärer und mit unumstößlichen Gründen beweisen, daß zum Beispiel das herrliche Blatt bey *γ* nicht so wohl ein Theil eines so genannten Meerohrs (*Haliotis*), als vielmehr ein Theil des innern Central-Wandblats, und der spitzwinkliche Haken bey *δ* der schiefe Durchschnitt des äußersten vielschrägigen Gewindes eines Schiffsbootes sey, das ich *Nautilum redivivum* genannt habe. Die übrigen gerade oder krummlinichten weißen Zeichnungen sind nichts als die verschiedenen Durchschnitte anderer in der Muschelbreite mit eingeschlossener kleinerer Schaalschlere, zumal verschiedner Bastardmuscheln, und Mondschnecken. (*Anomia et Turbo*.) So sehen wir Zeichnungen von den letztern bey *εε*, wo der Durchschnitt durch die Spindel, das ist durch den Mittelpunkt aller Gewinde geschehen ist; bey *ζ* hingegen, wo er nach einer zwar excentrischen, aber doch parallel mit denselben fortlaufenden Richtung geschehen ist.

Dreizehnte Figur.

Es war nun vorzüglichst darum zu thun, zu wissen, und mit einiger Gewißheit sagen zu können, welche denn die Schnecke oder Muschel wäre, deren Schale mit diesen überaus schönen Farben, und so sehr glimmernden Glanze versehen, und ausgeschmückt ist. Ich ersuchte einige meiner Freunde in Bleyberg, mir, da ich die Absicht hatte, von diesem Fossil zu schreiben, davon einige lehrreiche Stücke zu schicken, auf welchen, so viel es möglich wäre, noch so ziemlich wohlbehaltene Schalen sich befänden, sollten sich gleich in denselben eben nicht sehr viel oder sehr prächtige sogenannte opalsirende Blätter einfinden. Hannstadt, dann Durmer waren gewiß die ersten, die, um meinem Verlangen Genüge zu thun, so edelmüthig waren, sich selbst der ihrigen zu berauben, um mich damit zu beschenken. Man spaltete ein dergleichen Stück, hier ist es: Einige mit besagten Farben und Glanz spielende Blätter sind daran zu sehen, aber ohne alle bestimmte Bildung eines Schaalschleres; bey *αα* erblicken wir wieder die oben beschriebene *Anomia caput serpentis* L. so wie bey *β* das gleichfalls im vorhergehenden schon geschilderte *Cardium striatum*. Allein bey *γγ* ersah ich zum erstenmale in unserer Muschelbreite eine wos-

schaalige



schaalige Muschel, die ich darinnen selbster noch nie gesehen hatte. Lange gerbrach ich mir den Kopf, bis ich mit derselben zurechte kam. Sie ist nach meinem Bedünken die Bernsteinaußter, das ist *Anomia electrica* L. Niemand ärgere sich an meinem Vorgeben, bis er mich gehört hat. Sie ist sammt der *Anomia Ehippium* und *Anomia Cepa* L. eine der allergeeinsten des adriatischen Meeres, und so häufig sie dajelbst zu haben ist, (ich besitze ganze Schachteln davon) so wenig sehen oft die einen den andern gleich. Nicht nur der Bauart nach allein, sondern auch in Bezug auf die äußerliche Gestalt und Bildung sind die verschiednen Spiel, oder Unterarten derselben so sehr unter einander unterschieden, daß man glauben sollte, sie wären nicht mehr bloß unterschiedene Abänderungen einer und eben derselben Art, sondern wirklich unterschiedene Arten; unterdessen kommen sie allezeit darinnen vollkommen überein, daß sie dünnschaalig, ganz, oder doch halbdurchsichtig, und von eben der gelben glänzenden Farbe sind, die dem Bernstein (*Succinum electricum* L.) eigen ist. Das war auch hauptsächlich die Ursache, daß schon Rumpf, die Ursache, daß Linne' selbst derselben den Beynamen *Electrica*, das ist: gefärbt wie Bernstein, beygesetzt haben. Der letztere behauptet, ihr Gehäus sey beynahe rund, das ist rundlich, (*testa subrotunda*) gelb, geglättet und die obere Klappe stark gewölbt und bucklicht (*convexo-gibbosa*). Treffend, aber nur in Bezug auf eine einzelne Abänderung derselben, auf jene Abänderung sage ich, die Linne' allein mag gesehen haben, auf jene, die Born beschrieben, und die ich hier bey *ss* habe malen lassen, allein nicht eben so treffend in Beziehung auf jene Abänderung, die Rumpf Tab. 47. fig. L. abgebildet, Linne' bloß frageweise angeführt, Born, aus Linne's spätern Auflagen, sehr ungeschicklich mit der groben dickschaaligen Faltentlappe (*Spondylus plicatus* L.) vermengt, (folglich unter die starken Lazarusklappen, deren Bewohner ein Seehaase ist, verworfen,) und die ich bey *ss* vorstelle. Nicht eben so treffend wieder auf jene Abänderung die ich bey *ζζ* nach der Natur gemalt, vorlege, und die ich die sammarig gefaltete Bernstein Bastardmuschel, so wie die Abänderung *ss* die runzlicht gestrichte und schuppicht gekrauste Bernstein Bastardmuschel zu nennen pflege. Auch nicht allerdings treffend in Bezug auf meine tellerförmige, flach erhabene, in die Quere gleichsam sehr fein gestrichte, sonst glatte Bernstein Bastardmuschel, die wir bey *ηη* sehen, und eine und eben dieselbe mit der Blebergischen zu seyn scheint. Endlich auch nicht so sehr treffend in Ansehung der mehr oder weniger olivengrünen Abänderung dieser Bastardmuschel, die ich bey *ss* vortrage, und die meines Erachtens von den vorigen Abänderungen bloß in der Farbe unterschieden ist. Ich denke, je jünger die bernsteinfarbige Bastardmuschel ist, desto rundlicher, ge-



wölbtet und bucklichter umbogen wird sie zugleich segn; aber auch frischer gelb gefärbt, glänzender und mehr geglättet. Nimmt sie an Alter mehr zu, so breitet sie sich mehr und mehr aus, die bucklichten Krümmungen runden sich besser ab, sie wird niedriger, fällt der Länge nach ein, in Falten, Furchen, oder mit Ribben abwechselnde Striche, oder Runzeln, und da, so dünnschaalig sie auch ist, ihre Schaaale doch immer aus über einander liegenden jährlichen Häuten besteht, so lösen sich diese im Umfange zuerst ab, und geben derselben ein in die Quere schuppicht gefaltetes runzlichtes Ansehen; bis sich wieder die aufstehenden Schuppen nach und nach abstoßen, und die Klappen fein nach der Quere gestrichet zu seyn scheinen. Die untere davon ist beynahe flach, aber weder die eine noch die andere durchlöchert, es sey denn daß sie eingebrochen, oder von andern Seewürmern durchfressen werden. Sie sind übrigens beyde gelb, nach allen Stufen der gelben Farbe und mehrern oder wenigern Durchsichtigkeit des Bernstein; von aussen schielen sie etwas ins Perlmutterfärbige, und erstarken zuletzt in ein mattes gelblichtes Weiß.

Vierzehnte Figur.

Man spaltete ein anderes dergleichen überschicktes Stück besagter Muschelbretsche: wir sehen es hier im frischen Bruche, und auf demselben ein ziemlich großes Blatt mit glänzenden Feuerfarben. Als ich dasselbe sahe, erkannte ich sogleich die ganze Zeichnung des *Mytilus edulis* L. das ist der eßbare Miesmuschel; sie ist zwischen $\alpha \beta \gamma \delta \epsilon$ gleichsam eingeklammert. Von den innern mit theils goldgrünem, theils goldbrothem Anfluge mineralischer Dünste überzogenen Häuten ist bloß ein Theil zwischen $\gamma \delta$ zurück geblieben, das übrige weggesprungen, oder auf dem andern Stücke der Muschelbretsche sitzen geblieben. Ich darf hier eine kleine Anmerkung, die ich gemacht habe, nicht ganz mit Stillschweigen übergehen. Ein Theil dieser Miesmuschel zwischen $\gamma \delta \epsilon \zeta$, nämlich jener des äußersten, dem Angel bey α entgegen gesetzten Randes, liegt in der Muschelbretsche um anderthalb Linien höher als der übrige; klar, denke ich dabey, sieht man hier, daß bloß die Drückung des sinkenden oder einstürzenden Gebürges den größern Theil des Schaalthieres zwischen $\alpha \delta \gamma \beta$ abgebrochen, und um die Höhe $\gamma \delta$ tiefer niedergedrückt habe. Es ist dann entweder die Last des auf diesen Theil aufstehenden Gebürgs stärker und schwerer gewesen; oder der Stoß der Erschütterung hat sich über die ganze Miesmuschel nicht gleich vertheilet, sondern *minore tantillo celeritate in segmentum $\gamma \delta$ eadem irruiat massa*. Ein anderes eben so sehrreichtes Stück war das bey $\tau \upsilon \phi \lambda$. Eben derselbe, wenn ich nicht

nicht irre, *Mytilus edulis* L. ist hier bey $\lambda \mu \nu \xi$ verschüttet, und seine innere runde hohle Seite mit Thon und kleinern bereits angezeigten Schaalstücken ausgefüllt worden. Die Zeichnung ist wenigstens eine und eben dieselbe mit der vorigen, und so auch bennähe eine und eben dieselbe mit der, die ich hier bey $\sigma \pi \varphi$ ansetze. Aber hier ist in der That nicht so wohl die Miesmuschel selbst, als vielmehr der bloße bereits beschriebene, gleichförmig derbe schwarzbläulichte Kalkstein von unspürbaren Theilschen, und über demselben der darauf zurückgelassene länglicht runderhabene Abdruck der Muschel zu sehen, und zwar von eben derselben Substanz des nämlichen Kalksteines, jedoch ganz feste mit Mergelthon überzogen.

Funfzehnte Figur.

Ein Stück, das alle meine Aufmerksamkeit rege gemacht hat, war gewiß das gegenwärtige, nebst einigen andern, zwar viel kleinern, aber demselben dennoch sehr ähnlichen, und weil sie aus der Muschelbretsche so ziemlich glücklich herausgeschlagen waren, auch viel leichter zu erkennen und systematisch zu bestimmen. Dieses zween Quersfinger dicke Stück unserer Muschelbretsche gelüstete mich zwar sehr stark in schöne Platten zerschneiden zu lassen, weil darinnen schöne grosse Blätter mit — wie man zu sagen pflegt — prächtig opalisirenden und glänzenden Farben, in Menge zu sehen sind; aber ein so sehrreiches Cabinetstück, wegen so einer Ländelei zu zerstückten, wollte in meinen Kopf nicht. Gleich einem starken, grossen und an der Spitze, oder vielmehr Schneide, abgekürzten Kelle dringt sich bey $\alpha \beta \delta \epsilon \gamma$ ein mit blümlicher Decke eines Schaalstücker umgebener, und mit derbem Kalkstein gefüllter Körper in die Muschelbretsche ein. Sowohl der Durchschnitt oder Bruch desselben nach der Quere, zwischen $\gamma \alpha \beta$, den mancher nicht sehen kann, bald aber aus der Abbildung ganz deutlich zu entnehmen seyn wird, als die einzelnen von der Muschelbretsche losgerissenen größern oder kleinern, noch so ziemlich wohlbehaltenen, und einem kieförmigen Rahne gleichsehbenden andern Stücke, gaben schon genug zu verstehen, daß derselbe ein noch nicht zu Stein gewordenes, sondern nur mit Stein gefülltes Schaalstücker, eine Schnecke, und zwar vielsammerige Schnecke, kurz ein wahres Schiffsboot, ein Nautilus sey. Ein Blättchen der schaalchen Decke vom Steine losgerissen, glänzte an der innern Oberfläche mit goldrother Feuerfarbe, und verlor sich ins Goldgrüne. Besides zu wissen, daß es in unserer Muschelbretsche Schiffsboote gebe, und daß deren Verhaufe an den innern Wänden mit den prächtigen Farben prangten, ward für mich eine erquickende Luft. Ein Nautilus! aber welcher? und wessen Schaafe ist außers?



äußerlich blumlicht? wo mag er seine Nervenöhre haben? wie sind seine Kammern? wie die Querblätter beschaffen? hielt er sich etwa stets in dem Abgrund des Meeres, in dem jähnen Bodensage desselben auf? ward vielleicht dieser schlammichte Seegrund mit einer krausen Art Meermoses (*Ulva* L.) bewachsen, das sich an ihn angeliebt, das mit ihm verschüttet worden, das sich an ihm abgedrückt, sodann verworfen und seine Zeichnung an ihm zurückgelassen hat? Dieß waren nun meine Betrachtungen, und das Verlangen nach mehrern dergleichen Nautilen, um sie ganz vergliebern zu können, desto brennender, je sehnlicher voller die Begierde war, alle meine mir selbst gemachten Fragen systematisch und vollständig zu beantworten. Zum Glück befand sich verflorenen Sommer hier in Klagenfurt der damalige bleybergische Bergrichter, und nun Oberbergichter in Rotten, auch k. k. Appellationsrath in montanisticis, Herr von Moryen, mein schätzbarster Freund. Ich entdeckte ihm mein Verlangen, und batß ihn, wenn es möglich wäre, mir so einige kahnförmige Schnecken von der St. Oswaldgrube zu verschaffen. Mit Muschelmarmor, sagte er, könnte er mich nicht bedienen, weil die Zugänge zu demselben auf allerhöchsten Befehl vermauert worden wären: blätterlose, mit Stein gefüllte dergleichen Zimmernöhner, die man aus eben der Ursache wegwarf, wollte er mir genug schicken. Ich nahm ihn bey seinem Worte mit der Versicherung, daß mir an diesen leeren Stücken ungleich mehr, denn an der ganzen Eitelkeit des blättrigen opalisirenden Muschelmarmors selbst, läge. Er wiederholte sein Versprechen, hielt es getreulich, und zeigte sich werththätig als einen wahren warmen Freund nicht allein von mir, sondern auch von den Wissenschaften selbst. Nun auf unser gegenwärtiges Stück Muschelbretsche zurück zu kommen, so ist dasselbe auf der sichtbaren Oberfläche mit dem schon oben beschriebenen Thon überzogen, und wir sehen in demselben erstlich bey ?? die gemeine Wendeltreppe, das ist den linne'schen *Turbo Clathrus*, den ich sonst sehr häufig im adriatischen Meere gefunden habe, und eben so häufig am Strande der Nordsee bey Schwenning, *Testa cancellata turrita exumbilicata, anfractibus contiguis laevibus*. Sie ist geglättet und glänzt, gemeinlich habe ich sie mit zehn Gewinden, und eben so viel nach der Länge hin fortlauenden und gebogenen Klammern, oder Ribben gesehen. Ihre Mundöffnung ist beynahe zirkelrund, mit einem dicken zurückgebogenen ungezähnelten Rand, ohne Nabel. In Bezug auf ihre Farbe, besitze ich folgende Abänderungen: ganz weisse, licht aschenfarbige, ganz braune, weisse oder auch (selten) fleischfarbige (*coloris incarnati, sive pudorini*) mit rosenrothen, braunrothen, oder dunkelröthlichen Querlinien, dann aschgraue mit weissen Klammern, braune mit weissen Klammern, bräunlichte mit wechselweise röthlichten und weißlichen Quers

linien,

linien, woben allemal wohl zu merken ist, daß diese gefärbten Querslinien nie ununterbrochen über den Gewinden und Klammern zugleich fortsetzen, sondern wechselseitig absetzen, das ist, einmal die Gewinde, dann die Klammern, und wieder die Gewinde u. höher oder tiefer durchlaufen. Zweitens kommt bey 7, abermal diese Wendeltreppe, und zwar so ziemlich klein, aber mit angefliegenem Schwefelsteine vor. Ein Umstand, der sich in der bleybergischen Muschelbreite sehr oft eräugnet; nicht allein den *Turbinem clathrum* L. sondern auch den *striatum* L. und die verschiedenen Nautilen habe ich in derselben gemeintlich ganz, oder zum Theile, mit Kies angefliegen, angetroffen. Drittens ist bey 8 & 8 abermal eine Bastardmuschel zu sehen; sie erinnerte mich, wo sie mehr von Thon, oder Mergelletten entblößt war, der kleinen Herzmuscheln, die ich bereits oben beschrieben, und gestrichte Herzmuscheln genannt habe. Aber sie ist sehr dünnshaalig, mehr flach erhaben, als sehr stark gewölbt, und nicht bloß in die Länge hin, sondern auch nach der Quere zugleich fein gestrichet, so, daß ihre Rückenseite nicht so wohl gestrichet, als vielmehr sehr fein und zart netzförmig gestrichet ist. Darf ich es wagen, sie für die *Anomia reticularis* L. zu halten? Freylich kann ich von der untern flachen Klappe, und ob ihr Angel über die Wölbung der obern hervortritt, nichts sagen, da ich es nicht gesehen und wahrgenommen habe; aber wer kann auch verlangen, daß man bey versteinernten, oder wenigstens bey sehr lange unter der Erde vergraben gewesenen Schaalthieren noch heute zu Tage alle bis auf die mindesten Kennzeichen richtig finden, oder nur suchen sollte? Viertens ersehe ich bey 11 eine kleine, in die Quere länglicht, eyförmige, sehr dünn- und zwoschaalige Muschel; sie ist flach erhaben, ihr Rand ganz und ungezähneht, und aus dem längst des äußersten Randes allein zurückgebliebenen Rand der Schaafe sehe ich, daß dieselbe wenigstens der Länge nach nicht gestrichet sey. Mehr verlange man von mir hievon nicht zu wissen; ich weiß selbst davon nichts mehr: der größte Theil der Muschel ist weggebrochen; genug davon gesagt wenn ich sage, ich mutmaßte, sie sey eine dünnshaalige Tellmuschel (*Tellina*), dergleichen man allershand im Meersande zu finden pflegt.

Sechzehnte Figur.

Nachdem verstandete mir, wie ich gesagt habe, sein Wort; er ward auch der Rechtschaffene, ich will sagen, der Mann seines Wortes, und überschickte mir mit erster bester Belegenheit einige, weil sie keine opalsirende Blätter hatten, oder nicht zu haben schienen, verachtete, verurtheilte, verworfene Stücke. Stücke, an denen das Au



ge des Eitels weder Farbe noch Glanz, weder Opallisation noch Wollust fand, die ich aber, wie man zu sagen pflegt, mit beyden Armen umfasse; weil ich schon sah, daß ich dadurch in den Strand kommen würde, hinter das Geheimniß der Natur zu kommen. Einige dieser Stücke werde ich denn meinen Lesern hier vorlegen, (und wie könnte ich sie alle anführen, ohne die Geduld derselben zu mißbrauchen, wenn sie schon überhies nichts dabey verlieren würden) damit sie das Schaaltier näher kennen lernen, welches hauptsächlich und am meisten mit den bewußten Farben und Glanz zu prangen pflegt. Es ist dasselbe, wie aus der 16ten Figur bey a und 17ten bey b d e y n zu sehen ist, ganz unstreitig ein Schiffsboot, oder Nautilus. Wäre seine Schale zu Spat, zu Kalk- oder Hornstein geworden, würde ich ganz dreuste sagen, daß es Linne's Helmintholithus hammonites Nautili sey, testa spirali, lentiformi, polythalamia, centro utrinque umbilicato: Apertura sinuoso-sagittata; anfractibus contiguis; ambitu carinato, truncato, integerrimo, lateribus obtuse convexiusculis, subcompressis, a centro peripheriam versus confertissime undulate-striatis; undulis foliorum instar orbicularium crispiorum, per oras crenatis; diaphragmatibus concamerationum undatis; siphunculo laterali ad marginem exteriorem; so aber, da dieselbe noch unverkehrt ist, von aussen zwar lichter oder dunkler braun, von innen hingegen statt des weissen silberichten Perlmutterschmelzes mit pfauen-schweifigem Anflug mineralischer Dünste von goldrothen und goldgrünen Farben und Glanz überzogen, muß ich dasselbe als das Original und Urbild desselben betrachten, und nenne es indessen das blumichte Schiffsboot, Nautilum floridum. — Wunderbar ist es in der That, daß alle in dieser Muschelkreise eingeschlossene Baskar-Muscheln, Mondschnecken und Schiffsboote u. durch tausend und tausend Jahre, wenn sie schon mit verhem Kalkstein ausgefüllt, äußerlich mit Thon, Mergel oder Kiez überzogen, und ihre Hienellen noch offen und leer gebliebenen Kammern mit drußiger Kalkspatrinde (Aërites marmoreo-spatosus L.) wenigstens incrustirt sind, sich noch allezeit in ihrem natürlichen Stande erhalten haben können. Dieß blumichte Schiffsboot, das ich mit zu unten stehender Mundöffnung habe malen lassen, ist nicht so wohl mit anhängigem Schwefelkiese, als vielmehr mit einem sehr dünnschaaligen Kiezgehäuse überkleidet und umgeben, und darüber mit Thon überzogen. Damit man nun seine innere Beschaffenheit erkannte, hat man dasselbe schief nach der Quere s z durch den im Mittelpunkte befindlichen Nabel gerschlagen. Wir sahen es an der Seite im frischen Bruch, es ist mit dichtem, verhem Kalkstein gefüllt, den ich schon oben beschrieben habe, und manche seiner Kammern mit leucht himmelblauem Kalkspat. Abet ungleich deutlicher sehen wir die Beschaffenheit seiner Kam-

Kammern und deren Zwerchblätter, sammt dem Laufe der Nervenröhre, in einem glücklicher ausgefallenen Bruche, den ich bey β vorstelle; die äußersten Kammern bey γ sind hier nicht mit Kalkstein gefüllet, sie stehen noch offen, nur sind ihre Wände (parietes) mit drossig krystallisirter weißblausicht, und rother Kalkspatrinde überzogen. Gleicherdings ist die mit dem äußersten Rande gleichlaufende, und an demselben hart angeschlossene Nervenröhre bey δ sichtlich, steht bey dem äußersten Gewinde offen, bey dem innern im Gegentheile mit Kalkstein ausgefüllet.

Siebenzehnte Figur.

Uebermal ein Schiffsboot, oder Nautilus, und abermal ein kieförmiges, im Mittelpunkte tief genabeltes, beyderseits blumichtes Schiffsboot mit flach abgeschliffener Schärfe des schneidigen Randes, und einer hart an denselben angeschlossnen, und mit demselben gleich fortlaufenden Nervenröhre. Ein Schiffsboot, sage ich, das mit dem vorigen in allen Stücken gleich ist, praeterquam, quod anfractuum latera transverse sint flexuoso-fulcata, alterneque plicis exstantibus, teretibus, parallele sinuosis, et duplicato-nodosis, exarata, dann daß die blumichten Zeichnungen folia referant oblongo-ovata, aut et ovato-lanceolata, pinnatifido-incisa, pinnulis integris, rotundatis. Zwo Abänderungen sind mir von demselben in die Hände gekommen. Die eine stelle ich bey α , die andere bey β vor. Der ganze Unterschied besteht aber nur darinnen, daß die zwischen zwey hervorstehenden Falten eingeklammerten breiten Furchen sehr vertieft bey der letztern, bey der erstern hingegen nur gleichsam flach niedergebückt sind, dann daß die blumichten Zeichnungen jener von α länglicht und gleichsam zugespitzt, die aber von β mehr abgerundet sind. Wenn ich je geglaubt habe, daß dieselben nichts als Abdrücke, das ist: zurück gelassene Merkmale eines Farrenkrauts, oder eines noch nicht entdeckten Wassermoses (Ulva) seyn könnten, war es gewiß, als ich diese Schiffsboote zum erstenmale sah; der oben beschriebene Nautilus bifidus überführte mich meines Irrthums. Seine vom Mittelpunkte des vertieften Nabels strahlenweise gegen den Umkreis hinausgehenden Striche sind, wie wir gesehen haben, nichts weniger als gerade gezogene Linien, sie sind vielmehr wechselweise rundhole und runderhabene fein eingedrückte Schlangenzüge, nur daß die äußersten Krümmungen nicht mehr wahren Wellen, sondern schmal lanzettförmigen, beyderseits gezähnelten Ausläufern gleichen. Was bey α N. bifidus erst vor dem Rande des äußern kieförmigen Gewindes, eben das eräugnet sich bey β gegenwärtigen Schiffsboote, (das ich Nautilus nodulosum nenne,) sogleich



am Mittelpunkte der nabelförmigen Vertiefung, die aus dem Mittelpunkte ausgehenden Striche krümmen sich wechselweise links und rechts in länglicht en, oder lanzettförmige beyderseits tief eingeschnittene Verzweigungen, und hierinnen besteht zuletzt das ganze Geheimniß dieser blumlichten Zeichnungen. Ich habe diese Art des Schiffsbootes das Knotichte genannt, wegen der doppelten Reihe hervorragender Knoten, davon an jeder hervorstehenden Falte bey *aaa*, dann bey *bb* zweyen zu sehen sind, als nämlich zwischen *γγ*, zwischen *dd* und *ηη*. Seine Nervenröhre ist bey jenen unter *a* bey *ζζ* zu sehen, aber nicht bey jenem unter *β*, weil sein kiel förmiger Rand, sammt der Nervenröhre, und der zwoten Reihe Knoten weggebrochen worden ist. Beyde waren mit sehr dünnschaaligem geglättetem und glänzendem Schwefelkiese überzogen, der jedoch bey *β* fast ganz, bey *a* größtentheils weggefallen, und bloß an einem Theile der blumlichten Zeichnungen zurück geblieben ist.

Achtzehnte Figur.

Eine andere, in der blenbergischen Muschelbretsche sehr oft sich einfindende Art Schiffsboote, die beyden, dem blumlichten und dem knotichten sehr ähnlich, ja bis auf manche unterscheidende Kennzeichen, vollkommen gleich ist, nenne ich Nautilum redivivum. Ich besitze davon mehrere, meistens halbzerschrochene Stücke, habe jedoch keines mahlen lassen, weil sie der Gestalt nach jenen der vorigen Figuren vollkommen gleich sind. Ein einzelnes Seitenblatt seines schaaligen Gehäuses, (auch dieses nicht ganz,) stelle ich bey *a* vor, weil es noch wohlbehalten genug verblieben ist, um daraus weiter auf seine äußerliche Gestalt und Zeichnung schließen und den Unterschied einsehen zu können, wodurch sich dieses neuerdings auflebende, vom knotichten sowohl, als dem blumlichten Schiffsboote hauptsächlich unterscheidet. Mit dem knotichten kommt dasselbe darinnen gänzlich überein, daß aus seinem genabelten Mittelpunkte krummgebogene, wiewohl nicht sehr hoch herausstehende Falten oder Ribben, quer über den Gewinden desselben, nach dem kiel förmigen Rande hin, sich herumschlingen, und zwar noch überdem mit abermal zwey Reihen runderhabener eiförmiger Knoten, die an der innern Oberfläche der Schaal e jederzeit rundhohl sind; es unterscheidet sich im Gegentheile von demselben, daß zwischen seinen Quersalten weder so breite, noch so tiefe Furchen, sondern höchstens sehr seicht niedergedrückte, viel schmälere, an der Zahl aber mehrere (wenigstens zweyen) Streife parallel mit besagten Querribben sich fortziehen. Ein anderes nicht weniger wesentliches Unterscheidungszeichen zwischen beyden, ist der gänzliche Mangel aller blumlichten Zeich.

Zeichnungen, das ist, der schlangenartigen, wellenförmigen, oder laublichten Striche, die ich bey dem wieder auslebenden nicht, wohl aber bey den knotichten und blumichten wahrgenommen habe. So wie übrigens der Mangel dieses gekrauschten Laubwerks, und hingegen die Anwesenheit der Quersalten, sammt den paar Reihen knotichter Erhöhungen den ganzen Unterschied, so macht die nicht, oder gewiß nicht merklich in die Quere gefurchte äußerliche Oberfläche der Gewinde die ganze Uebereinstimmung zwischen dem gegenwärtigen und dem blumichten Schiffsboote aus. Und das ist so ohngefähr die äußerliche Beschaffenheit, Gestalt und Zeichnung unserer kiel förmigen Schiffsboote. Eine sehr glücklich gerathene Spaltung eines Stückes bleybergischer Muschelbretsche, wo zum Glück ein schönes Blatt des Nautili redivivi eingeschlossen war, zeigte desselben innere Oberfläche, die ich hier meinen Lesern im frischen Bruche bey β vorlege. Es stellt dieselbe die innere Wand der Schale vor, und zwar wo diese vom genabelten Mittelpunkte gegen den kiel förmigen Rand hin mit krumgebogenen, doch sehr seichten Furchen durchzogen, sich mehr und mehr ausbreitet; wäre das Blatt größer gewesen, so würde man auch die zwei Reihen eyförmiger rundhoher Strüßchen auf demselben gesehen haben, die ich auf einem andern eben so schönen, aber bloß goldrothen dergleichen Blatte sonst gesehen habe; bey dem gegenwärtigen gefiel mir indessen die prächtige Mischung der pfauenschweifigen goldrothen, goldgelben und goldgrünen Feuerfarben besser. Noch nicht befriediget mit der Gestalt, äußerlichen Beschaffenheit und Zeichnung unserer Schiffsboote, drang meine Wissbegierde weiter; ich wollte, und zwar mit Zuverlässigkeit, mit Ueberzeugung wissen, wie der innerliche Bau, und zumal die Zwerchblätter, ihre Richtung, Zug u. beschaffen wären. Sechs, theils blumichte, theils knotichte und wieder auslebende Schiffsboote ließ ich daher sogleich mit einer dünnen Kupferscheibe mitten entzwey schneiden, ich will sagen, nach der Richtung des kiel förmigen, an der Schärfe abgekürzten äußersten Randes der Gewinde, bis über den Mittelpunkt des ganzen Schaalstückeres hin. Bey γ sehen wir im Durchschnitt die zwei Hälften eines Nautili redivivi, (Der andere Durchschnitt war gleicherdings so beschaffen), dessen Gewinde von außen die vollkommene Zeichnung des oben bey α angeführten Blattes hatten, nur daß zugleich an denselben die beyden Reihen der knotichten Erhöhungen deutlich zu sehen waren. Kann man noch ferner zweifeln, ob diese mit Kalkstein, mit Kalkspat, und wie der Durchschnitt der andern darthut, zum Theile auch mit körnigem Schwefelkies, und kleinen Trümmern von Bastardmuscheln und Epon gefüllten schneckenförmigen Schaalstücker, die von außen das ganze Gepräge der Schiffsboote an der Seiten tragen, es auch wirklich, nach den innerlichen vieltammerigen und mit einer



einer Nerventröhre versehenen Gefüge zu urtheilen sey. Der Gewinde habe ich drey gezählet. Die Nerventröhre ist nicht dicker als eine starke Stecknadel; läuft hart angeschlossen an den Rand der abgekürzten kieförmigen Schärfe der Gewinde; die Zwerchblätter, wodurch der innere leere Raum des Schaaltpheres in lauter Kammern eingetheilt wird, sind wellenförmig, und die Kammern selbst mit gleichförmig dertem schwärzlichem Kalkstein entweder ganz ausgefüllt, oder wo sie ganz, zum Theil, oder in erbsengroßen Zwischenräumen leer und offen geblieben, mit weißem, milchblauem oder röthlichem Kalkspat incrustirt, der oft in drüsigen Krystallen anschießt, und dann eine Spielart des linne'schen *Aëtiae marmorei*, *embryonibus fixis crystallinis Natri Hyodontis*, das ist, *Spatum drusicum concretum Cronstedti* ist. Nicht minder prächtig sind bey *d* und *e* ein paar Stücke ausgefallen, die Graf Engenberg schneiden und abschleifen ließ, das eine zu einer Tobaksdose, das andere hingegen für sein Naturalienkabinet.

Neunzehnte Figur.

Nautilus Redivivus Testa spirali polythalamia naviculari, compressa, truncato-carinata, nuda, laevi, umbilicata; lateribus transverse costato-nodosis; costis elevatis, teretibus, flexuosis, e centro radiantibus, serie nodorum ovalium protuberantium duplici, parallela notatis. Anfractibus tribus, contiguis, compresso-carinatis, acie marginali truncatis, introsum spirallyter convolutis, atque intra extimum amplissimum conspuitis. Apertura triangulari-sagittata. Diaphragmatibus concamerationum internarum undatis, et ipsis triangulo-sagittatis. Siphone communi, laterali, ad marginem anfractuum exteriorum sito. Color testae extus saturate, aut dilute magis brunescens; intus indubie primum margaritaceus, seu argentatus, cum nitore fugace roseo, alterneque viridescens; tum ex mineralibus subterraneorum locorum vaporibus viridi-rubroque aurato. In Mediterranei quondam abisso maris, nunc Bleybergensisbus in fodinis orphanus infelix. Prototypum Helmintholithi Hammonitae Linnæi Variet. *g* ambitu depresso, lateribus nodosis. Freylich habe ich diese Art Schiffsbootes, so wenigstens wie ich dasselbe bey *a* habe malen lassen, nirgends in dem ganzen Keil der Bleybergischen Muschelbretsche gefunden. Dessen ohngeachtet wage ichs doch mit kaltem Blute, und mit der zuversichtlichsten Dreistigkeit, zu behaupten, daß dasselbe eben so beschaffen gewesen sey, wie wir es hier vor Augen haben. Bey Vorgesetzt der Beschreibung der vorhergehenden Figuren habe ich getreulich angezeigt die verschiedenen Schiffsboote
die



die lange, sehr lange in der bleibergischen St. Oswaldsgrube vergraben lagen. Wir haben ihre Größe, ihre Gestalt, ihre äußerliche Beschaffenheit, den innerlichen Bau, den Lauf der Nervenröhre, die Mundöffnung sammt den Zwerchblättern, so gar die Farbe von aussen, die Zeichnung, kurz, Alles! wo nicht jederzeit beisammen, doch einzeln, in Trümmern, aber doch jeden Theil der Zusammensetzung insonderheit gesehen; aus meinem Kopfe habe ich nichts hinzugebracht, als allein daß ich nicht ohne Grund mutmaße, die innerliche Oberfläche mag mit einem Perlmutterschmelz überzogen gewesen seyn. Warum sollte ich nun dieß seither bloß in Versteinerungen dunkel bekannt gewesene Schiffsboot nicht haben ganz zusammen setzen können? Bey β stelle ich dasselbe im Durchschnitt vor, damit man mit einem Blicke seine innerliche Bauart, die Zahl der Gewinde, die Beschaffenheit der Kammern und der Zwerchblätter sammt dem Laufe der Nervenröhre sehen könne.

Zwanzigste Figur.

Als auf den oben angezeigten kleinen Nautilus bifurcatus waren alle seither in der bleibergischen Muschelbreitsche entdeckten Schiffsboote kiel förmig, mit abgefürzter oder weggeschliffener schneidiger Schärfe des äußersten Randes (ambitu truncato-carinato). Uebermal habe ich ihr Gehäuse, das ist ihre Blätter, wenn sie nicht schon verkalte und verwittert waren, von der innern Seite mit den feurigen goldrothen und goldgrünen Farben prangen gesehen. Außerhalb war hingegen die Schale, so oft sie noch wohlbehalten und unverweset war, lichter oder dunkler braun, nur ein paarmal fand ich auch diese äußerliche Oberfläche derselben mit den benannten Farben und Glanz spielen; welche Erscheinung mich denn abermal in meiner Mutmaßung um so viel mehr bestärkte, daß dieselben eine bloße Wirkung mineralischer Dünste, ein bloßer unterirdischer pfauenschweifiger Anflug seyn müßten. Nun lege ich noch zum Beschlusse meinen Lesern einige wenige, etwas anders gebildete, aber sehr seltene Schiffsboote vor, die in unserer Muschelbreitsche sich gleicherdings einfinden. Floren spaltete von ohngefähr ein großes schönes Stück derselben, und war so glücklich ein ganzes Schiffsboot, und zwar mitten durchgespalten, darinnen anzutreffen. Er zeigte es mir, und ich war entschlossen alles, was er verlangte dafür zu geben, wenn er nicht so edelmüthig gewesen wäre, sich die Ehre vorzubehalten es mir unentgeltlich zu überlassen. Hier ist es bey α nach der Natur gemalt. Wir sehen noch die Dicke seiner Schale, die Gewinde, die an den äußern Rand angeschlossene und mit demselben gleichlaufende Nervenröhre, die Zwerchblätter, ja die noch ganz oder zum

Ω

Theil



Theil offenen Kammern, davon einige mit Kalkstein, andere mit weißem Kalkspat gefüllt, und wieder andere zwar leer, aber an den Wänden mit einer dünnen, druckfesten Kalkspatrinde, (die für sich weiß und halb durchsichtig, aber mit einer rothen Eisenguhr gefärbt ist,) incrustirt sind. Wären die Zwerchblätter halbkugelförmig gebogen, und nicht ganz, wie sie sind, wellenförmig; ließe überdem die Nervenöhre mitten durch die Gewinde und Zwerchblätter, nicht wie es geschieht, an den äußern eiförmigen Rand angeschlossen, und parallel mit demselben, so würde ich in der That keine Schwierigkeit haben, dasselbe für den Nautilus Pompilius L. anzusehen und zu halten; so aber nenne ich Nautilus cymbiformem: testa spirali polythalamia cymbiformi; apertura rotundato-cordata; anfractibus contiguis, obtusis, siphunculo laterali, marginis exterioris; diaphragmatibus concamerationum undato-flexuosis. Ob seine Schale von innen mit eben den prächtigen Farben und Glanz sei? ob er genabelt sey? zweifle ich zwar nicht, doch weiß ich für gewiß auch nicht, weil ich das einzige lehrreiche Cabinetstück mich ohnmöglich entschließen kann zu zerbrechen. Eben so zweifelhaft und unentschieden war ich Anfangs, ob ich das Schiffsboot bey β und γ , und das unter dem Namen des Nautili cymbiformis beschriebene, für ein und eben dasselbe halten sollte? bis ich nach vielem und reifem Denken klar erkannte, daß sie keineswegs unterschieden sind. Es ist dasselbe gerade zu der Zeit, als ich mich in der Wiege unserer Muschelbretsche befand, aus der St. Osvaldsgrube ausgegraben worden, aber der obere (ich sollte lieber sagen der untere) Theil desselben war schon weggebrochen und verloren; doch sah ich gleich ein, daß dieß, wiewohl schon verletzte Stück, ein lehrreiches Stück sey, und allerdings geschickt, und das Geheimniß des innern Baues dieses seltenen Schiffsbootes aufzuschließen, weil zumal seine Kammern noch offen, und leer geblieben sind. Jenes bey α ist dann mitten in der Muschelbretsche eingeschlossen, und beynahe ganz mit Kalkstein oder Kalkspat gefüllt; dieses bey β und γ hingegen ward ganz in dichtem, dertem, mehr als fingerdicke, aschgrauem, von aussen aber schwarzem Kalksteine, der seine Gestalt annahm, vergraben, und seine Kammern stunden noch offen, nur daß deren Wände mit einer seichten Kalkspatrinde incrustirt waren. Bey β stelle ich das halbe, von innen hohle Schiffsboot mit offenen Kammern vor; und wie sehen bey δ ganz deutlich, daß dasselbe nichts weniger, als kleeblättrig sey, oder einen scharfen, und in eine Spitze zusammenlaufenden, sondern vielmehr eiförmig gerundeten Rand habe, und folglich eine rundherzförmige Mundöffnung; apertura rotundato-cordatam. Bey γ im Gegentheil lege ich die Halbschale des vorigen, nach dem man es mitten durch, nach dem Durchschnitte δ η zerklüftet hat, vor.

Gleich



Gleich fällt uns dabei die Dicke $\alpha\lambda$ seines Kalksteinartigen Ueberzugs in die Augen, die einen guten Quersfinger stark ist. Das erste und äußerste Gewinde mit offenen und leeren Kammern sehen wir bey $\mu\nu$, und dabei die eine Kammer π mit weißem Kalkspat ganz gefüllt, die übrigen aber bloß an den Seitenwänden, und folglich längst der wellenförmigen Zwerchblätter, mit dünner Kalkspatrinde incrustirt, die anfänglich weiß und durchsichtig war, aber nun abgescbmuzt und schwärzlich ist. Da übrigens der mittlere Kern dieses Schiffsbootes beynahe ganz weggebrochen, und bloß von dem zweyten und mittlern Gewinde die eine Kammer ξ , zurück geblieben ist; so wiederfährt uns das unerwartete Glück, die Richtung und den Schlangenzug seiner wellenförmigen, noch bis auf eine Linie pariser Maaßes hervorstehenden Zwerchblätter $\sigma\sigma$, die die Kammern oder Fächer einklammern, zu sehen. Es sind dieselben hier bereits in weißen, aber mit ziegelrother Eisenguße überfinterten Kalkspat übergangen. Bey σ ist der Mittelpunkt des ganzen Schiffsbootes, gefüllt von innen mit weißem brüßigen Kalkspat, (*Aëtites marmoreo-spatosus* L.) aber von außen stark genabelt. Hart an den äußern Rand der Gewinde angeschlossen, läuft die Nervenröhre mit demselben parallel bis in den Mittelpunkt hinein.

Ein und zwanzigste Figur.

Endlich soll ich noch eines Stückes unserer Muschelbretsche, und des darinnen eingeschlossen sonderbar seltenen Schiffsbootes gedenken. Herr Ignaz Marx, k. k. Bergverwalter im Bleyberg, hatte die Güte, mir, da er wußte, daß ich mit dieser äußerst beschwerlichen Arbeit mich abgab, dasselbe zu überschicken. $\alpha\beta\gamma\delta$ stellt das Stück Muschelbretsche selbst vor, mit schönen, den verben Kalkstein durchkreuzenden opalisirenden Blättern, und oberhalb mit schwarzblauem Thon überzogen, auf welchem bey $\zeta\zeta$ einige bereits abgestorbene dergleichen Blätter, bey ϵ hingegen ein Theil des kleeblättrigen äußersten Randes, eines der oben beschriebenen Schiffsboote zu sehen ist. Dähe klebt an dasselbe das Schiffsboot $\delta\eta$, $\alpha\lambda\mu$, das ich von dem Mutterstein ν weggebrochen, auf der entgegen gesetzten Seite einzeln bey $\xi\epsilon\sigma\tau$ vorlege. Schade, daß ich mit demselben nicht frey nach Willkühr handeln konnte, um es der Länge nach zerschneiden lassen zu können, daß man die Zwerchblätter würde gesehen haben; wie wohl ich gar nicht zweifle, daß dieselben der rirkelrunden Mundöffnung ähnlich, rund, hohl und parallel unter einander sind. Aber doppelt Schade, daß von diesem ganzen Schiffsboote nichts als das einzige letzte Trum seither zu sehen und zu haben war. Als ich dasselbe von der Muschelbretsche losriß, konnte man noch die theils auf Ω 2 und



und theils bey σ zurückgebliebenen Blätter seiner Schaafe, zumal wenn man sie naß machte, in das Goldrothe schielen und spielen sehen, woraus ich denn mit Grund und Recht folgerte, daß diese so genannte Opalisirung nichts als ein bloßer so genannter pfaunenschweifiger Anflug unterirdischer mineralischer Dünste seyn müsse; den ich auf so verschiedenen Schaalthieren unserer Muschelbretsche, auf so viel andern Erzarten u. gefunden hatte, und der zuletzt eben keine so sehr seltene Erscheinung in der Natur ist. Dem sey indessen wie ihm wolle; genug, so klein auch das gegenwärtige Stück des mit so gefährten und glänzenden Blättern versehenen Schaalthieres ist, so ist es doch allemal groß genug, und allemal deutlich genug gezeichnet, um sich an desselben Geschlecht nicht zu verkennen; kurz, es ist dasselbe ein wahres Schiffsboot, aber nicht etwa von der Art der vorigen, das ist ein rundes, zusammengedrücktes und spiralgewundenes, sondern ein länglichtes, walzenförmiges, sanft gebogenes und ohnfehlbar an dem einen Ende einem Hirten- oder Bischofsstäbe ähnliches Schiffsboot. Ich habe es indessen, bis ein anderer besser denn ich hinter das wahre Geheimniß kömmt, *Nautilus lituiformem* genannt; und erwarte, daß mit unsere heutigen gelehrten Conchyliologen den Zweifel lösen wollen, ob ich dasselbe für das Original des Linne'schen *Nautili opaxiparos* halten könne oder nicht? Freylich habe ich an dem bleybergischen keine kiefelförmiggestrichen Gewinde gesehen: aber ich habe auch gar keine Gewinde, (ich verstehe die äußersten, nach dem einen Ende zu, etwa in ein paar Schniefeln umgebogenen, freystehenden Gewinde,) daran gesehen; was ich daran gesehen habe, ist: daß seine Schaafe dick, blättrig oder häutig, daß sie schneckenförmig, vollrund oder walzenförmig und sanft gebogen ist; noch mehr, daß sie einschaalig, aber ohnfehlbar vielsammrig zugleich, und ihre Mundöffnung zirkel- oder tellerförmig rund ist, und eine nicht durch den Mittelpunkt der Kammern und der Querschnittblätter, auch nicht an den innern, sondern an den äußern Rand der Gewinde angeschlossen, und mit demselben parallel fortlaufende Nervenröhre habe. Genug, um mit Zuverlässigkeit zu behaupten, daß dasselbe ein wahres Schiffsboot sey! Uebrigens sehen wir hier seine Schaafe von aussen ganz mit dem oben beschriebenen schwarzblauen Thone überzogen, den inwendigen leeren Raum hingegen mit einem anderthalb Linien dicken vollrunden Ringe von schwarzbraunem gleichförmig dicker Kalkstein incrustirt; auf welchem ein sehr dünner dergleichen Ring (*Cylindrus annularis*) vom weißem halbdurchsichtigem Kalkspat folgt, und dann wieder der Kalkstein statt des Markes, der das Herz und Eingeweide füllt; es sey denn, daß ohngefähr irgendwo ein leerer Zwischenraum zurück geblieben wäre, in welchem sich eine tropfsteinartige Kalkspatrinde lagern, und in drusige Krystallen hat anschließen

kon

können, die überhaupt weiß und halb durchsichtig, aber gemeinlich mit einer rosen oder ziegeltrothen Eisengughe überzogen ist. Das Wertwürdigste hiebei ist ohne Streitig, daß gleichwie der erste *cylindrus annularis calcareus* sich fest an die innere Wand der Schale anschließt, eben so umschließt die mit weißem Kalkspat gefüllte Nervenröhre eine andere dergleichen ringelförmige kalksteinartige dünnere Walze. Zudem müssen wir einen kleinen Unterschied dieses Schiffsbootes von den seither beschriebenen wohl in Acht nehmen. Hart an den äußern kiefelförmigen Rand angeschlossen ist bey denselben die Nervenröhre. Bey dem Gegenwärtigen im Gegentheile schiebt sich dieselbe nur gleichsam zu dem äußern zirkelrunden Rande hinzu; in der That aber läuft sie bloß parallel mit demselben durch alle Kammern, und steht frey, wenigstens auf zwey Linien von demselben weg.

Und nun wäre es, denke ich, Zeit ut manum tandem de tabula — wenn ich mich nicht gleichsam gezwungen sähe noch ein paar Worte von einer mondformig genabelten Kräufelschnecke zu sagen, die der, leider! zu frühzeitig verstorbene Herr Professor Statius Müller den Perenmeister, kinne' aber *Trochum Magum* genennet hat. Etwas größer denn der im vorhergehenden beschriebene *Trochus Varius* L., hat sie mit demselben starke Ähnlichkeit, wiewohl sie wieder in vielen Stücken von demselben wesentlich unterschieden ist. Ihre Ähnlichkeit mit demselben, und der Mangel einer getreuen ächten Abbildung, mögen die Hauptursachen seyn, daß man sie beyde entweder vermengt hat, oder sehr leicht hat verwechseln können. Ihre Mundöffnung, sagt der Herr von Born, soll rundlicht (*subrotunda apertura*) seyn; ich sehe aber nicht, wie sie, so zu reden, mehr viereckig seyn könnte, als sie wirklich ist. Deshalben, und damit man sie mit dem oben beschriebenen *Trocho vario* L. zusammen halten könne, habe ich sie hier bey π nach der Natur malen lassen, und ihre systematische Beschreibung in kinne'scher Sprache ist folgende: *Trochus Magus, Testa univalvi, spirali, conico - subovata, laevi, alba; supra ab apice ad basin fasciis longitudinalibus latis undatis rubris picta; subtus centro oblique lunato - umbilicata; Anfractibus quinis sublenisve convexis, contiguis, nullo margine intermedio se junctis, supra duntaxat ad confinia, laevis, longitudinalibus, rugisque elevatis alternis, disforminatis; caeterum transverse multifstriatis, striis obtuse concatenato - nodulosis. Apertura magna, oblique tetragona, intus margaritacea; labro integro. Columella flexuoso. sinuata. Unico centrali, magno, oblique lunato, ac circa columellam spiralliter inflexo, et dilascente.* Wenn nun kinne' selbst im Museo Ludovicae Ulricaе vorgiebt, daß



daß seine Mündung beynahe rund, nicht viereckig sey; so sehe ich wohl ein, aus welcher Quelle der Herr Hofrath von Born müsse geschöpft haben; aber wenn derselbe zugleich in dem Wahne steckt, der Heptemeter könnte sonst auch unter die Schnirkelschnecken (Helices) verwiesen werden, dann weis ich in der That nicht, was ihn dazu mdge verleitet haben, es müßte denn d'Argenvilles Abbildung der Sorcière Tab. 8. Fig. S. seyn, die freylich mehr einer Schnirkelschnecke, als einem Kräusel gleich sieht, und daher eben nicht die beste ist.



vidi factas ex aequore terras,
et procul a pelago conchae jacuere marinae.

OVID.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

Tabl. I.



Joseph Melling pnx.

Nat. Hist. Schaff. ex.



J. Mellin, a pinx.

Val. Pychoff, ex.

Fig. 4.



J. Melling pinx


V. Bijlchaff ex.

Tab. IV.



J. Melling pinx.

V. Püschke ex.



J. Melling pinx.

Fig. 6

V. & Schott sc.

Tab. VI.



Fig. 7. ex.

J. Melling pinx.

V. Bischoff ex.








Fig. 8.



Tab. X.









Fig. 10. α.



Tab. XIV.

Fig 10. β .



Fig. 11. β .





Tab XVI

Fig. 11. N.




Fig. 12.

Tab. XVII.




Fig. 16. 3.

Tabl. XVIII.



Fig. 16. α.



1. Molling point.

See Tabl. XVIII.



Fig. 13. β .

Tab. XIX.



Fig. 44. c.




Fig. 45. a.




Fig. 14. b.



Fig. 16^{ta} C.




Fig. 13^{ta}






Fig. 18^{va} c.



Tab. XXIII.




Fig. 18^b a.


Fig. 17. α. δ. ζ.



Fig. 17. β. γ.



Fig. 18. α.



A. Helling prae

Fig. 18. (3.)




Fig. 18. d.



J. Melling. pinx.

Tab. XXVI.

Fig. 18. γ





Fig. 18. γ




J. Mulling. pinx.

Fig. 19. α.



J. M. King fecit.

Fig. 43. 12.



Nautilus puzos

Fig. 20. α.



J. Mollay pinn.





Fig. 20.



A. Melling prae.



S. Mollusq. pinx.





Fig. 21



S. Molling. pins.



+Z16823180X

Osterreichische Nationalbibliothek



+Z16823180X







